



مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST



الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية

إعداد

د. دحام بن إسماعيل العاني

أ. خالد بن محمد الطاسان

الرياض

١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م



مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST

الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية

إعداد

د. دحام بن إسماعيل العاني

أ. خالد بن محمد الطاسان

الرياض

١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

ح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ١٤٣٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العاني، دحام بن اسماعيل
الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية. / دحام بن اسماعيل
العاني؛ خالد بن محمد الطاسان. - الرياض، ١٤٣٧هـ

٢٢٣ ص.؛ اسم

ردمك: ٦-٨٤-٨٠٤٩-٦٠٣-٩٧٨

١- الطيور ٢- الجزيرة العربية أ. الطاسان ، خالد بن محمد (مؤلف
مشارك) ب. العنوان

١٤٣٧/٧٠٢٢

ديوي ٢، ٥٩٨

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٧٠٢٢هـ

ردمك: ٦-٨٤-٨٠٤٩-٦٠٣-٩٧٨

جميع الحقوق محفوظة



مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

ص.ب. ٦٠٨٦ الرياض ١١٤٤٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٤٤ ٤٨٨٣ - ٠١١ ٤٨٨٣٥٥٥ فاكس: ٥٦ ٤٨٨٣٧٥٦ ٠١١

الموقع الإلكتروني: www.kacst.edu.sa

إصدارات المدينة: publications.kacst.edu.sa

البريد الإلكتروني: awareness@kacst.edu.sa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جدول المحتويات

| | |
|----|-----------------------|
| ١ | تقديم |
| ٢ | مقدمة |
| ٥ | النعام |
| ٧ | الدجاج الغيني |
| ٧ | الدجاج الغيني أبوخوذة |
| ٩ | طيور الدراج والحجل |
| ٩ | الحجل |
| ١٠ | حجل فيلبي |
| ١٠ | الحجل العربي |
| ١١ | الحجل الرملي |
| ١١ | الدراج الرمادي |
| ١٢ | السمان العادي |
| ١٢ | سمان دليجورجوي |
| ١٣ | البجع والإوز والبط |
| ١٣ | الإوزة المصرية |
| ١٤ | البط أبو فروة |
| ١٤ | الخضاري |
| ١٥ | الكيش أو أبو مجرف |
| ١٥ | حماوي أبيض العين |
| ١٧ | طيور جلم الماء والنوء |
| ١٧ | جلم الماء الفارسي |
| ١٨ | طائر النوء الجواني |
| ١٩ | القطاسيات |

- ١٩..... الغطاس الصغير
- ٢٠..... غطاس متوج كبير
- ٢٠..... غطاس أسود الرقبة
- ٢١..... طيور النحام
- ٢١..... النحام الكبير
- ٢٢..... اللقلق
- ٢٢..... لقلق أديم
- ٢٥..... طيور أبي منجل والطيور الملاعقية
- ٢٥..... أبو منجل المقدس
- ٢٦..... أبو ملعقة
- ٢٧..... طيور البلشون والواق
- ٢٧..... الواق الصغير
- ٢٨..... واق أصفر أو صيني
- ٢٨..... بلشون الليل
- ٢٩..... البلشون الأخضر الظهر أو المخطط
- ٢٩..... واق أبيض صغير
- ٣٠..... أبو قردان أو بلشون البقر
- ٣٠..... بلشون رمادي
- ٣١..... بلشون أسود الرأس
- ٣١..... البلشون الجبار
- ٣٢..... البلشون الأرجواني
- ٣٢..... بلشون الصخر
- ٣٣..... طيور المدار
- ٣٣..... الطائر الاستوائي الأحمر المتقار
- ٣٥..... الطيور المطرقية الرأس

- ٣٥..... مطرقي الرأس
- ٣٧..... طيور البجع
- ٣٧..... البجع الأبيض
- ٣٨..... البجع الوردي
- ٣٩..... طيور الأطيش
- ٣٩..... الأطيش المنقع
- ٤٠..... الأطيش البني
- ٤١..... طيور الغاق
- ٤١..... غراب البحر
- ٤٢..... غراب البحر السوقطري
- ٤٣..... الصقور
- ٤٣..... العوسق
- ٤٤..... صقر الغروب
- ٤٤..... الصقر الحر
- ٤٥..... الشاهين
- ٤٥..... شاهين مغربي
- ٤٧..... طيور العقاب النسارية والحدأة والنسور
- ٤٧..... العقاب النساري
- ٤٨..... الحدأة ذات الجناح الأسود
- ٤٨..... الحدأة السوداء
- ٤٩..... النسر الملتحي
- ٤٩..... الرخمة المصرية
- ٥٠..... نسر جريزون
- ٥٠..... النسر الأوزن
- ٥١..... عقاب صرارة

- ٥١..... العقاب المصفق
- ٥٢..... الباشق الحزين الترتيل
- ٥٢..... باشق قبر
- ٥٢..... الشيكرا أو الباشق الكستائي
- ٥٢..... حوام سقطرى
- ٥٤..... الحوام الطويل الساق
- ٥٤..... عقاب أصحم
- ٥٥..... العقاب الذهبي
- ٥٥..... العقاب الأسود
- ٥٦..... عقاب بونللي
- ٥٧..... الحُبَّارى
- ٥٧..... الحُبَّارى العربية
- ٥٨..... الحُبَّارى الآسيوية (حُبَّارى شرقية)
- ٥٩..... الطيور المائية
- ٥٩..... مرعة الماء
- ٦٠..... المرعة الصغيرة
- ٦٠..... المرعة الرقطاء
- ٦١..... الفرّض الأرجواني
- ٦١..... دجاجة الماء
- ٦٢..... الغرة
- ٦٣..... طيور السمان
- ٦٣..... سمان الشجر الصغير
- ٦٥..... طيور الكروان
- ٦٥..... الكروان الجبلي
- ٦٦..... الكروان الجبلي الأرقط

- ٦٧..... الحنكور
- ٦٧..... الحنكور
- ٦٩..... طيور الطول والنكات
- ٦٩..... أبو المغازل
- ٧٠..... النكات
- ٧١..... طيور الزقراق (رسول الغيث)
- ٧١..... قطقاط شوكي الجناح
- ٧٢..... قطقاط أحمر اللغد
- ٧٢..... قطقاط أبيض الذيل
- ٧٢..... قطقاط مطوق صغير
- ٧٣..... قطقاط اسكندري
- ٧٤..... قطقاط الرمل الكبير
- ٧٥..... طيور اليقنة
- ٧٥..... يقنة متدرجة الذيل
- ٧٧..... الكروان وأبو اليسر
- ٧٧..... كروان عسلي
- ٧٨..... أبو اليسر المطوق
- ٧٩..... طيور النورس والخطاف
- ٧٩..... نورس أبيض العين
- ٨٠..... النورس الفاحم
- ٨٠..... النورس المستدق المنقار
- ٨١..... خطاف بحر نيلى
- ٨١..... خطاف بحر قزويني
- ٨٢..... خطاف البحر المتوج الصغير
- ٨٢..... خطاف البحر ساندوتش

- خطاف البحر السريع ٨٣
- خطاف البحر الوردي ٨٣
- خطاف البحر أبيض الخد ٨٤
- خطاف البحر الصغير ٨٤
- خطاف بحر سوندرز ٨٥
- خطاف البحر الأسحم ٨٥
- خطاف البحر الفاحم ٨٦
- خطاف مستقعات أبيض الجناح ٨٦
- الأبله الاعتيادي ٨٧
- طيور القطاة ٨٩
- قطا عراقي ٨٩
- قطا كستائي البطن ٩٠
- القطا المرقط ٩٠
- قطا متوج ٩١
- قطا ليشتستين ٩١
- طيور الحمام واليمام ٩٢
- حمام جبلي ٩٢
- حمام الغابات ٩٤
- الحمام الزيتوني ٩٤
- القمري ٩٥
- قمري نواح ٩٥
- اليمام المطوق ٩٦
- يمام مطوق إفريقي ٩٦
- يمام أحمر العين أو شبه المطوق ٩٧
- اليمام الضاحك ٩٧

- ٩٨..... يمام طويل الذنب
- ٩٨..... الحمامة الخضراء
- ٩٩..... طيور الببغاء
- ٩٩..... درة نبيلة
- ١٠٠..... درة هندية مطوقة
- ١٠٠..... درة برقوية الرأس
- ١٠١..... الوقواق
- ١٠١..... الوقواق الراهب
- ١٠٢..... وقواق كلاس
- ١٠٢..... وقواق ديدريك
- ١٠٣..... وقواق أو كوكال أبيض الحاجب
- ١٠٥..... طيور بوم الحظيرة
- ١٠٥..... بومة المخازن
- ١٠٧..... طيور البوم
- ١٠٧..... ثبج مخطط
- ١٠٨..... الثبج الإفريقي
- ١٠٨..... ثبج مخطط سوقطري
- ١٠٩..... بومة نسارية صحراوية
- ١٠٩..... بومة نسارية مرقطة
- ١١٠..... بومة بتلر
- ١١٠..... بومة صغيرة
- ١١١..... طيور السبد
- ١١١..... سبد نوبي
- ١١٢..... سبد الجبال
- ١١٢..... سبد السهول

| | |
|----------|--------------------------------|
| ١١٣..... | طيور السمامة |
| ١١٣..... | سمامة النخيل..... |
| ١١٤..... | سمامة الصرود..... |
| ١١٤..... | السمامة الشاحبة..... |
| ١١٥..... | سمامة برليوزي..... |
| ١١٥..... | سمامة صغيرة..... |
| ١١٧..... | طيور الشقراق..... |
| ١١٧..... | غراب زيتوني هندي..... |
| ١١٨..... | غراب زيتوني حبشي..... |
| ١١٨..... | غراب زيتوني أوروبي..... |
| ١١٩..... | صيّاد السمك أبيض الصدر..... |
| ١١٩..... | صيّاد السمك الرمادي الرأس..... |
| ١٢٠..... | صيّاد السمك الأبيض الطوق..... |
| ١٢٠..... | صياد السمك المتوج..... |
| ١٢١..... | طيور الوروار..... |
| ١٢١..... | وروار أبيض الزور..... |
| ١٢٢..... | وروار شرقي صغير..... |
| ١٢٢..... | وروار أزرق الخد..... |
| ١٢٣..... | وروار أوروبي..... |
| ١٢٥..... | الهدهد..... |
| ١٢٥..... | الهدهد..... |
| ١٢٧..... | البوقير..... |
| ١٢٧..... | البوقير الإفريقي الرمادي..... |
| ١٢٩..... | ناقر الخشب..... |
| ١٢٩..... | ناقر الخشب العربي..... |

- ١٣١..... صرد الشجيرات
- ١٣١..... الصرد أسود الرأس
- ١٣٣..... طيور الصرد
- ١٣٣..... الصرد محمر الذنب
- ١٣٤..... الصرد كستنائي الظهر
- ١٣٤..... صرد رمادي شرقي كبير
- ١٣٥..... الصرد محمر القنة
- ١٣٧..... الطيور الصافرة
- ١٣٧..... صفيير ذهبي
- ١٣٩..... خطاف الذباب الفردوسي
- ١٣٩..... خاطف الذباب الإفريقي الفردوسي
- ١٤١..... الغراب
- ١٤١..... العقق
- ١٤٢..... الغراب الدوري
- ١٤٢..... غراب بُني العنق
- ١٤٣..... غراب مروحي الذنب
- ١٤٥..... طيور السنونو والخطاف
- ١٤٥..... خطاف الصخور الشاحب اللون
- ١٤٦..... سنونو أحمر العجز
- ١٤٧..... طيور القبرة
- ١٤٧..... قبرة الشجر المغنية
- ١٤٨..... قبرة هدهدية
- ١٤٨..... قبرة سميكة المنقار
- ١٤٩..... قبرة شرقية صغيرة
- ١٤٩..... قبرة الصحراء الموشمة الذنب

- ١٥٠.....قبرة الصحراء
- ١٥٠.....قبرة قصيرة الأصابع
- ١٥١.....قبرة بلنفورد قصيرة الأصابع
- ١٥١.....قبرة قصيرة الأصابع صغيرة
- ١٥٢.....قبرة دان
- ١٥٢.....قبرة متوجة
- ١٥٣.....قبرة سوداء الرأس
- ١٥٣.....قبرة تمنك القرناء
- ١٥٥.....الهازجات
- ١٥٥.....هازجة مروحية الذنب
- ١٥٦.....مغنية سقطرى
- ١٥٦.....هازجة سقطرى
- ١٥٧.....نمنمة الشجر
- ١٥٧.....هازجة رشيقة
- ١٥٩.....طيور البلب
- ١٥٩.....بلبل أحمر الوجنة
- ١٦٠.....بلبل أبيض الخد
- ١٦٠.....بلبل أحمر العجز
- ١٦١.....بلبل أصفر العجز
- ١٦٣.....هازجات العالم القديم
- ١٦٣.....هازجة سافي
- ١٦٤.....هازجة قصب البصرة
- ١٦٤.....هازجة القصب الكبيرة
- ١٦٥.....هازجة القصب الصياحة
- ١٦٥.....الهازجة ذات الشارب

- ١٦٦..... هازجة القصب الأوروبية.
- ١٦٦..... هازجة قصب البحر الأحمر .
- ١٦٧..... هازجة سايك .
- ١٦٧..... هازجة زيتونية.....
- ١٦٨..... نقشارة الغاب البنية.....
- ١٦٨..... هازجة عربية.....
- ١٦٩..... هازجة اليمن .
- ١٧١..... الثرثارات .
- ١٧١..... ثرثارة عادية .
- ١٧٢..... الثرثارة العربية .
- ١٧٣..... طيور أبيض العين .
- ١٧٣..... أبيض العين الشرقي.
- ١٧٤..... أبيض العين الحبشي .
- ١٧٥..... الزرازير.....
- ١٧٥..... مينة الضفاف .
- ١٧٦..... مينة اعتيادية .
- ١٧٦..... الزرزور المبقّع .
- ١٧٧..... زرزور براهمي.....
- ١٧٧..... الزرزور الشائع.....
- ١٧٨..... زرزور فاتن .
- ١٧٨..... زرزور أبيض البطن.....
- ١٧٩..... زرزور صومالي .
- ١٧٩..... زرزور سقطرى .
- ١٨٠..... زرزور أسود.....
- ١٨١..... طيور السمينة أو الدّج.....

- ١٨١..... سمنة اليمن
- ١٨٢..... طيور الأبلق وصائدي ذباب العالم القديم
- ١٨٣..... أبو حناء الأحراش الأحمر
- ١٨٤..... أبو حناء الأحراش الأسود
- ١٨٤..... القليعي المطوق
- ١٨٥..... أبلق أحمر الصدر
- ١٨٥..... أبلق البادية أو الصحراء
- ١٨٦..... أبلق حزين
- ١٨٦..... أبلق جنوب الجزيرة العربية
- ١٨٧..... أبلق هيوم
- ١٨٧..... أبلق أسود أبيض القنة
- ١٨٨..... أبلق أبو قلنسوة
- ١٨٨..... قليعي أسود الذيل
- ١٨٩..... سمنة الصخور الصغيرة
- ١٨٩..... خاطف الذباب الجامباغي
- ١٩١..... طيور التميز
- ١٩١..... تمير وادي النيل
- ١٩٢..... تمير سقطرى
- ١٩٢..... تمير فلسطيني
- ١٩٣..... التميز اللامع
- ١٩٣..... تمير آسيوي
- ١٩٥..... عصفير العالم القديم
- ١٩٥..... عصفور دوري
- ١٩٦..... عصفور إسباني
- ١٩٦..... عصفور سقطرى

- ١٩٧.....عصفور عبد الكوري
- ١٩٧.....العصفور الذهبي العربي
- ١٩٨.....عصفور الصخر الشاحب اللون
- ١٩٨.....عصفور مسنن المنقار
- ١٩٩.....عصفور أصفر الرقبة
- ٢٠١.....الطيور النسّاجة
- ٢٠١.....نساج روبل
- ٢٠٢.....نساج مقنع صغير
- ٢٠٢.....نساج ذهبي الظهر
- ٢٠٢.....نساج مخطط
- ٢٠٢.....نساج بايا
- ٢٠٤.....فودي أحمر
- ٢٠٥.....الطيور الشمعية المنقار وطيور المونيا
- ٢٠٥.....شمعي المنقار العربي
- ٢٠٦.....شمعي المنقار الأحمر
- ٢٠٦.....شمعي المنقار المخطط
- ٢٠٧.....فضي المنقار الإفريقي
- ٢٠٧.....فضي المنقار الهندي
- ٢٠٨.....مونيا حرشفية الصدر
- ٢٠٩.....عصافير الشوك
- ٢٠٩.....عصفور الشوك العربي
- ٢١١.....الذعرات والجشئات
- ٢١١.....ذعرة صفراء
- ٢١٢.....جشنة إفريقية
- ٢١٢.....جشنة طويلة المنقار

| | |
|----------|-----------------------|
| ٢١٣..... | عصافير الحسون |
| ٢١٣..... | نغار عربي |
| ٢١٤..... | نغار اليمن |
| ٢١٤..... | ضخم المنقار السقطري |
| ٢١٥..... | الحسون |
| ٢١٥..... | حسون اليمن |
| ٢١٦..... | زمير وردي |
| ٢١٦..... | الحسون الصحراوي |
| ٢١٧..... | عصفور سيناء الوردي |
| ٢١٩..... | الدرسات |
| ٢١٩..... | درسة اعتيادية |
| ٢٢٠..... | درسة منزلية |
| ٢٢٠..... | درسة الصخور الإفريقية |
| ٢٢١..... | درسة سقطري |
| ٢٢٢..... | الفهرس الألفبائي |

تقديم

إن الحديث عن «عالم الطيور» يثير في القارئ التأمل في عجائب قدرة الله عزّ وجل، وبيعت في نفسه حب التعرف على أسرار هذه المخلوقات، وظاهرة ترحالها وهجرتها في أسراب وجماعات تجوب أرجاء القارات على مدار الفصول، وعلى ما تتميز به من نشاطات وسلوكيات في بيئتها، وما يواجهها من أخطار وتهديدات تحد من وجودها أو تكاثرها في الأماكن التي تستوطنها أو تحط بها. وقد فطر الله هذه الطيور القدرة على التكيف مع محيطها الذي تقصده للغذاء أو التكاثر. والجدير بالذكر أن بعضاً من هذه الطيور تهاجر لمسافات طويلة، وتقطع البحار والمحيطات دون توقف مثل خطاف المنطقة القطبية الشمالية الذي يتميز بجناحين طويلين رشيقين يساعده على الطيران بانسيابية ليقطع مسافات تصل إلى ٧٠,٠٠٠ كم كل سنة! فهجرة هذا الطائر تعد من أروع الهجرات في مملكة الطيور.

وحرصاً من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على ضرورة إثراء هذا الجانب معرفياً أعد هذا الكتاب المختصر عن كتاب سابق أصدرته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان: «مختصر أطلس الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية» لمايكل جينينغز وترجمة زينا مغريل؛ ليلائم شرائح القراء كافة، ويقدم المعلومة بإيجاز بعيداً عن الإسهاب والتفصيل، وليكون متمماً لإصدارات علمية سابقة أولتها المدينة الدعم والاهتمام لإشباع فضول القارئ نحو المعرفة بعامة، وعن بيئة بلاده الطبيعية بخاصة.

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود

مقدمة

هذا الكتاب موجّه للقارئ العادي المهتم ببيئة الجزيرة العربية بعامة والمملكة العربية السعودية بخاصة، وهو جهد علمي يُعزى إلى المصدر الأصلي "أطلس الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية" الصادر باللغة الإنجليزية والمترجم باختصار للغة العربية. وقد أسهم فيه نحو ٥٠٠ مراقب للطيور لتزويد الأطلس بالمعلومات عن الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية وأرخبيل سقطرى. وتم التعرف من خلال هذا الأطلس على أنواع جديدة من الطيور المتكاثرة وكذلك الدخيلة ناهزت أعدادها ٢٧٣ نوعاً تنتمي إلى نحو ٦٥ عائلة مُعرّفة بالصور والرسومات، وتم اعتماد تسمياتها كما هو متعارف عليها علمياً، وهي تمثل حصيلة الأنواع المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية. كما تم التعرف على عدد كبير من أنواع الطيور المهاجرة والزائرة المتكاثرة، إذ رُصد ٢٣ نوعاً متوطناً تشكل ٨٪ من عدد الأنواع و ٥٪ من المجموعة الكلية للطيور، وتم القيام بـ ٤٠ مسحاً ميدانياً في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية لجمع معلومات هذا الأطلس.

نأمل أن يجد هذا الكتاب حيزاً في المكتبة العربية التي لم يسبق أن نُشر فيها كتاب شامل لجميع الطيور المستوطنة والمهاجرة في شبه الجزيرة العربية.



النعام

Struthio camelus

النعام طائر رحال
ينتقل في فصل
الربيع من سهول
شبه الجزيرة العربية
الشمالية إلى مشارف
دمشق، ثم يعود
أدراجه في فصل
الخريف.

انقرض هذا الطائر بسبب الصيد الجائر في أوائل القرن العشرين بعد أن كان منتشراً على
أطراف الربع الخالي، وحرّة خيبر.

يمتاز النعام بمقاومته للعطش على غرار الجمل العربي ويتناسل في الشتاء، حيث تضع الأنثى
من ٢٠ إلى ٣٠ بيضة، تستغرق مدة حضانتها من ٤٢ إلى ٤٥ يوماً.

الدجاج الغيني

Numididae

الدجاج الغيني من الطيور الطريفة الكبيرة ذات الريش الأرقط، وعادة ما يكون رأسها وعنقها عاريين، لولا خوذة أو غيب يُتوجهما، ويتشابه ذكر وأنثى هذه الطيور في معظم الأحيان. وهناك نوع واحد منها يوجد في البراري العربية وهو الدجاج الغيني أبوخوذة، وإن كان من المرجح وجود أنواع أخرى في المزارع الخاصة التي قد يهرب البعض منها.

الدجاج الغيني أبوخوذة

Numida meleagris



يقطن الدجاج الغيني أبوخوذة براري شبه الجزيرة العربية، حيث يستقر في منطقة تهامة، وفي أقصى المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة.

يقصد هذا الطائر

حقول الذرة الرفيعة والسدود الصغيرة التي تتجمع فيها الأمطار.

يتكاثر في فصل الصيف، وتقوم الأنثى باختيار عشها ومن ثم حضانة البيض، فيما يقوم الذكر برعاية الفراخ وحمايتها.


طيور الدراج والحجل

Phasianidae

تعد عائلة طيور الدراج والحجل من عوائل الطيور التي تتضمن أنواعاً من الطيور البرية المتفاوتة في الحجم، الممتلئة الشكل، ذات المنقار القصير والحاد، والجناحين المستديرين القويين، والساقين القويتين اللتين قد تكون لهما نتوءات. وتكون الأنواع العربية منها في الغالب أحادية اللون ذات ريش أدكن، مع تشابه ذكورها وإناثها، رغم تباين الجنسين في العديد من أنواع هذه الطيور، ولاسيما مع تميز ذكور الطيور بالريش المزخرف. وثمة سبعة أنواع من المئة وثمانين نوعاً من طيور الدراج والحجل، والطيور الطريفة في شبه الجزيرة العربية.

الحجل

Alectoris chukar



الحجل طائر غير رَحَال يعيش في أقصى الشمال الغربي من المملكة، وفي شبه جزيرة مسندم في سلطنة عمان. ويقطن غالباً المناطق الجافة التي عادة ما تنمو فيها

الشجيرات والنباتات غير الدائمة بعد هطول الأمطار.

يتغذى هذا الطائر على ثمار التوت وعلى البذور والأعشاب والحشائش وأوراق الأشجار. أما أسلوب تكاثره فقد شوهدت أعداد من ذكور الحجل في منطقة تبوك مغردة لاجتذاب الإناث في أواخر شهر مارس.



حجل فيلبي

Alectoris philbyi

يقطن هذا الطائر الخجول غير الرحّال المناطق الجبلية في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، من الطائف جنوباً حتى غرب اليمن، وبخاصة قرب قمة جبل السودة في أبها.

بالمملكة. ويتغذى حجل فيلبي على الجراد وبعض الخضار المتنوعة وحبوبها.

تنتشر أزواج الحجل الفيلبي من شهر مارس حتى شهر أغسطس، حيث يمكن سماع تغريدها في موسم التكاثر.



الحجل العربي

Alectoris melanocephala

طائر غير مهاجر ومتوطن بكثرة في شبه الجزيرة العربية، ويقطن المرتفعات الجبلية والأطراف الصخرية في غربها وجنوبها وشمالها.

يمتد انتشاره من غرب المملكة حتى شمال سلطنة عُمان، ويستخلص الماء من غذائه الذي عادة ما يكون من النباتات الخضراء.

يلغو تغريد الذكور فوق الصخور البارزة عند قرب موسم التكاثر ولا سيما وقت الشروق والغروب.



الحجل الرملي

Ammoperdix heyi

طائر يعيش في جنوب سورية وسيناء، وفي غرب شبه الجزيرة العربية وجنوبها ووسطها. ويعد من الطيور غير المهاجرة التي تتردد المناطق الصخرية.

يقتات على أوراق وبراعم نبات اللسان العربي والحشرات. وفي موسم التكاثر في فصل الربيع تُعلن الذكور عن حدود منطقتها مغردة فوق الصخور البارزة فجراً،

ومستعرضة بريشها ومزهوة بأجنحتها لحظة مطاردة الذكور الأخرى.



الدراج الرمادي

Francolinus


pondicerianus

يقطن في منطقة تمتد من شرق الجزيرة العربية وإيران مروراً بالهند وسريلانكا.

ينتشر في المناطق المزروعة والحدائق

مستفيداً من الشجيرات لبناء أعشاشه. ويمتاز بالصمود في الجو الجاف.

يقتات بالحبوب، والبذور، والجراد النطاط، والنمل، والنمل الأبيض، ويرقات الخنفساء، وبالكائنات المضرة بالمحاصيل. ولديه القدرة على التكاثر والاعتناء بفرأخه على مدار العام.



السمان العادي

Coturnix coturnix

يمر هذا الطائر الخجول مهاجراً بشبه الجزيرة العربية في فصلي الربيع والخريف. وقد ساهم تطور الزراعة في المملكة في تكاثره في المحاصيل الزراعية المروية.

تغيره إما موسم التكاثر أو إيداناً بالهجرة ليلاً، إذ يلق على ارتفاع منخفض مما يجعله عرضة للاصطدام بالأسلاك الكهربائية.

يقتات السمان العادي بالحشرات ومحاصيل الحبوب والعلف حول الأشجار المنخفضة بين الحقول. وحصاد المحاصيل عائق رئيس في عدم تكاثره.



سمان دليجورجوي

Coturnix delegorguei

يقطن سمان دليجورجوي المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية في بيئة مماثلة للبيئة التي يعيش فيها السمان

العادي في المنطقة الوسطى والشمالية، وهو كسائر الطيور الطريفة يُصاد كغذاء للبشر. تشير دلائل كثيرة على وجوده في سلطنة عُمان واليمن والمملكة في مناطق زراعة الحبوب وبخاصة في حقول الذرة، والذرة البيضاء.


البجع والإوز والبط

Anatidae

من الطيور التي تجوب العالم ذات الحجم المتوسط أو الكبير، والمنقار العريض الملقوي الشكل، والأقدام ذات الوترات، والعنق الطويل نسبياً. وثمة بقعة ملونة في جناح العديد منها. ويوجد عشرون نوعاً في الجزيرة العربية من أصل مئة وخمسين نوعاً، فضلاً عن أعداد مساوية تقريباً لأنواع أخرى من الطيور الدخيلة، كالتي أدخلت إلى المنطقة لإثراء المجموعات الخاصة من الإوز البري في معظم دول المنطقة. ومعظم طيور البجع والإوز والبط الموجودة بطبيعتها في الجزيرة العربية تحط في الأراضي الرطبة في فصل الشتاء أثناء هجرتها. وثمة ستة أنواع منها تتكاثر في الجزيرة العربية، ثلاثة منها على الأقل تعد من الطيور الغريبة أو الدخيلة.


الإوزة المصرية

Alopochen aegyptiaca



الإوزة المصرية من طيور الزينة المنتشرة على ساحل البحر الأحمر، وتم إدخالها إلى أماكن عديدة بما فيها المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية. تعد من الطيور الضارة بالمحاصيل؛

لذا فإن تنامي أعدادها قد يهدد المناطق الزراعية، فضلاً عن تلويثها لمصادر مياه الشرب. لا يُعرف الكثير عن أسلوب تكاثرها، حيث يبدو أن معدل بقاء فراخ هذا الطائر ضئيل جداً.



البط أبو فروة


Tadorna ferruginea

تتوزع طيور البط
أبوفروة عشوائياً في
الجزيرة العربية،
وهي من الطيور
الزائرة شتاءً وصيفاً،

وتكثر في المنطقة الشرقية من المملكة والإمارات وسلطنة عمان.

يوجد هذا الطائر قرب الموائل المائية، والبحيرات المتاخمة للسواحل.

شوهدت أزواج من البط أبوفروة في المنطقة الشرقية من المملكة، وتستغرق حضانتها لبيضه ما بين ٢٨ إلى ٢٩ يوماً. أما رعايته لفراخه فتستمر نحو ٥٥ يوماً.




الخضاري

Anas platyrhynchos

يعد الخضاري من
الطيور الزائرة شتاءً،
ويفضل الأراضي
الرطبة أيًا كانت،

ويقتات على الأوراق
والحبوب والكائنات

غير الفقارية، ويتكاثر على مدار العام، ويتهاجن مع أنواع أخرى من طيور البط.



الكيش أو أبو مجرف


Anas clypeata

يتردد هذا الطائر زائراً على الجزيرة العربية شتاءً، ويحط مهاجراً في أسراب على الأراضي الرطبة، كما شوهد في المنطقة الشرقية من المملكة.

يفضل الكيش المياه الضحلة الثرية

بالزراعة مثل أحواض القصب، ويلتقط غذاءه من سطح الماء محرّكاً عنقه ومنقاره أفقياً بشكل سريع.

يعد من الطيور الخجلة التي تميل إلى الانزواء في موسم التكاثر، وتضع الأنثى من ٨ إلى ١١ بيضة، وتقوم بحضانتها لوحدها من ٢٢-٢٣ يوماً.



حماوي أبيض العين

Aythya nyroca

طائر زائر للجزيرة العربية شتاءً، ويتكاثر في المنطقة الشرقية بالمملكة، ومنطقة تبوك، ونهر الحائر جنوب الرياض، والدوحة. ويعد من الطيور المهددة بالانقراض.

يفضل هذا الطائر المناطق والأراضي الرطبة ذات الوجود النباتي الكثيف، ويقطن بالكائنات البرمائية وغير الفقارية، والأسماك الصغيرة. وتتفرد الأنثى بحضانة البيض مدة ٢٥-٢٧ يوماً ورعاية الفراخ.

طيور جَلَم الماء والنوء

Procellariidae

طيور بحرية في معظمها موجودة في محيطات العالم كافة، وتتميز بحجمها المتوسط إلى الكبير، وأقدامها ذات الوترات، والمنقار المعقوف، والقرنية ذات الأشواك، والخياشيم الأنبوبية. ويوجد في البحار المحيطة بالجزيرة العربية ثمانية أنواع على الأقل من مجموع ثمانين نوعاً من هذه الطيور في العالم، يتكاثر نوعان منها ويتوطنان في الجزيرة العربية. ومعظمها طيور زائرة للمناطق الساحلية في جنوب الجزيرة العربية.

جلم الماء الفارسي

Puffinus lherminieri



طائر بحري يوجد غالباً في السواحل الجنوبية والشرقية من الجزيرة العربية، ويصعب الحصول على معلومات مؤكدة بشأن تكاثره وتشيشه نظراً لاختياره المنحدرات الصخرية التي يصعب الوصول إليها.

يعيش هذا الطائر حول سواحل الجزيرة العربية، ومعرض لأخطار التلوث السطحي بالنفط كغيره من الطيور البحرية.



طائر النوء الجوانيني

Bulweria fallax

طائر متوطن في منطقة بحر العرب، ويتكاثر في جزيرة سقطرى وعلى الساحل الجنوبي من سلطنة عمان. وهو من الطيور المهددة بالانقراض.

يعد من الطيور التي تبحث عن غذائها ليلاً، حيث يصطاد الحبار النشط، والرأسقدميات، وفراشات البحر، والقشريات، والأسماك الصغيرة. يقوم ببناء عشه في حفر أشبه بالمغارات على ارتفاع لا يقل عن سبعة أمتار عن قاعدة المنحدر الساحلي.


الغطاسيات

Podicipedidae

عائلة متشابهة من الطيور الفواصة التي تتميز بأجنحتها القصيرة وريش ذيلها البدائي، وأرجلها ذات الأصابع المفصصة، والسيقان المضعوفة جانبياً، والمخالب المسطحة. وهناك خمسة أنواع منها معروفة في شبه الجزيرة العربية من إجمالي اثنين وعشرين نوعاً من الغطاسيات في العالم. منها ما هوزائر شتوي في منطقة الخليج العربي، وشرق الجزيرة العربية ويتكاثر فيها، ومنها ما يرد شتاءً إلى الكويت ولفار والمنطقة الشرقية، علماً بأن الغطاس الصغير هو النوع الوحيد الواسع الانتشار الذي يتكاثر في شبه الجزيرة العربية على نحو منتظم.


الغطاس الصغير

Tachybaptus ruficollis



يعد من الطيور الزائرة للجزيرة العربية، ويمكن مشاهدته حول تجمعات المياه التي فيها ما يكفي من المساحات النباتية ما يمكنه من إطعام نفسه وفراخه بعيداً عن الأخطار.

يبني عشه من النباتات العائمة أو أغصان شجيرات مطلة على الماء، وتضع الأنثى من ٣ - ٥ بيضات، وكلا الزوجين يعتنيان بالفراخ.




غطاس متوج كبير

Podiceps cristatus

طائر زائر يرتاد
سواحل الخليج العربي
وسواحل البحر
الأحمر، ويحتاج هذا
الطائر مساحة مائية
مفتوحة ذات عمق
يساعده على الغطس.

يقطن على الأسماك والكائنات غير الفقارية التي يغطس لالتقاطها أو يتناولها من على سطح الماء. يبني عشه على النباتات العائمة المرتكزة على نباتات ناشئة، حيث تضع الأنثى بيضها قبل اكتمال رعايتها لفرأخها، ويتشارك الزوجان في العناية بالفرأخ.



غطاس أسود الرقبة

Podiceps nigricollis

طائر شتوي زائر،
ودائم الانتشار في
الجزيرة العربية.
وتكاثره في المرتفعات
الجنوبية الغربية من
المملكة.

يقطن بالحشرات واليرقات والرخويات والقشريات والأسماك والكائنات البرمائية الصغيرة. يبني عشه على منصة من النباتات العائمة المرتكزة على نبات ناشئ أو أغصان شجرة متدلية نحو الماء.


طيور النحام

Phoenicopteridae

توجد ستة أنواع من طيور النحام، أربعة منها في أمريكا الجنوبية والوسطى، ونوعان منها في العالم القديم، أحدهما يتكاثر في الجزيرة العربية، أما الآخر فلا يزال يحاول التكاثر فيها. وتتميز طيور النحام بطول عنقها وساقها، وذيلها القصير الريش، ومنقارها السميك المعقوف إلى الأسفل عند منتصفه. كما أن لها أقدامًا ذات وترات، ويغطي اللون الوردي على ريش أجنحتها الخارجية، في حين يغطي اللون الأسود على ريش أجنحتها الداخلية. وهي تفضل عادة المناطق المائية المالحة وغير العذبة.

النحام الكبير

Phoenicopterus roseus



طائر زائر يرتاد سواحل الجزيرة العربية وجزيرة سقطرى شتاءً، وهو طائر سربي في سلوكه وتكاثره، ويفضل المياه المالحة وغير العذبة.

يقتات على البذور والمواد النباتية، والأسماك الصغيرة، إذ يقوم بإدخال رأسه ومنقاره لهذا الغرض تحت الماء، والتمايل بهما يمته ويسره بحثًا عن الكائنات غير الفقارية. عشه على شكل ركام من التراب المرتفع ومحاط بحلقة من الرمل على سطح الأرض. وتضع الأنثى بيضة أو بيضتين، ويتشارك الذكر والأنثى في بناء العش ورعاية الفراخ.

القلق


Ciconiidae

طيور كبيرة الحجم، طويلة الساقين والعنق، توجد في موائل الأراضي الرطبة، ومعظمها يوجد في المناطق الاستوائية.

تصل أنواع طيور اللقلق إلى ١٩ نوعاً، ثلاثة منها موجودة في الجزيرة العربية وهي: اللقلق الأسود، والقلق الأبيض اللذان يمران مهاجرين إلى شبه الجزيرة العربية، وبعدان من الزوار الدائمين شتاءً، والثالث لقلق أبديم الذي يزور جنوب غرب المنطقة صيفاً ليتكاثر فيها. شوهدت ثلاثة أنواع أخرى من طيور اللقلق شرق شبه الجزيرة العربية يرجح أنها شاردة وهي: اللقلق الإفريقي الأصل الأصفر المنقار، والقلق المطلي، وأبوسعن الإفريقي.

قلق أبديم

Ciconia abdimii



يحل طائر لقلق أبديم زائراً في فصل الصيف على المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية، ويتردد بشكل غير منتظم على سلطنة عمان في مختلف شهور السنة.

يتجمع لقلق أبديم غالباً في أسراب من الطيور المعششة على مقربة من الماء في الأودية والمناطق المزروعة، حيث تجد غذاءها من الأسماك والضفادع. يبني هذا الطائر عشه قرب المباني المهجورة في تهامة، إلا أنه أصبح يميل إلى الأبراج العالية للتعشيش نظراً لما يجده من أمان على عشه وفراخه.

طيور أبي منجل والطيور الملاعقية

Threskiornithidae

طيور ضخمة طويلة العنق والمتنار، ومناقيرها الملاعقية الشكل منحنية إلى الأسفل، في حين تكون طيور أبي منجل ذات مناقير ملوقية الشكل. هناك أربعة أنواع من طيور أبي منجل، ونوعان من الطيور الملاعقية في الجزيرة العربية، وهما أبو ملعقة وأبو ملعقة الإفريقي.


أبو منجل المقدس

Threskiornis aethiopicus



نادراً ما يحل أبو منجل المقدس زائراً في الكويت شتاءً، وتكاثره في المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي يظل محدوداً.

يقتات في إفريقيا بأي حيوان يتمكن من صيده، بما في ذلك بيوض وفراخ الطيور المتكاثرة. رُصد هذا الطائر وهو يبني عشه بالقرب من حديقة فندق في عدن، حيث يكون العش مشيداً بالأغصان المورقة على ارتفاع ثمانية أمتار عن سطح الأرض.



أبوملعة

Platalea leucorodia

يعد أبوملعة من الطيور الزائرة للخليج العربي وساحل جنوب شبه الجزيرة العربية شتاءً.

يتردد الطائر على المناطق الساحلية مثل الخلجان المحمية والصغيرة، والمساحات الطينية، ومناطق المياه المالحة، والنفايات السائلة، ويقتات بالحشرات واليرقات والرخويات والقشريات والأسماك الصغيرة والضفادع والديدان.

تبني طيور أبي ملعة أعشاشها إما على الصخور أو على حصى المنحدرات أو في الشجيرات، ويتعاون الزوجان على بناء العش وحضانة البيض ورعاية الفراخ.

طيور البلشون والواق


Ardeidae

طيور متوسطة وكبيرة الحجم، طويلة العنق والساق، ذات منقار أشبه بالرمح، والريش الخيطي الذي يغطي رؤوسها وظهورها ومقدمة أعناقها عادة عند التكاثر، وتتوطن المناطق القريبة من المياه.

هناك خمسة وستون نوعاً من هذه الفصيلة في العالم، أحد عشر نوعاً منها متكاثر في الجزيرة العربية، بينما تعبر ٥ - ٦ أنواع منها مهاجرة أو زائرة لها.

الواق الصغير

Ixobrychus minutus




طائر منتشر في أرجاء الجزيرة العربية بأعداد قليلة، ويهاجر بشكل منتظم، وتكاثره قرب الأراضي الرطبة الاصطناعية

والمناطق الوسطى من الجزيرة العربية.

يقطن قرب منابع المياه العذبة كالبحيرات والبرك والخلجان الساحلية وتجمعات الشورة الكثيفة على أطراف أحواض القصب الكثيفة.

يقطن طائر الواق الصغير على الحشرات والضفادع، ولا يضع إلا بيضة واحدة في العش، وترداد حركته ويعلو تغريده في موسم التكاثر.



واق أصفر أو صيني

Ixobrychus sinensis

الواق الأصفر زائر صيفي لسلطنة عمان، ويوحي وجوده طوال السنة بأنه طائر متوطن في المنطقة.

يرتاد الواق الأصفر الأخوار المالحة

الساحلية التي تحفها أحواض القصب وتوفر غطاءً جيداً من الأشجار والشجيرات، ويتغذى بالحشرات والرخويات والقشريات واليرقات والحيوانات البرمائية.

يبني عشه ويخفيه بين النباتات البارزة التي تكون على ارتفاع متر واحد عن سطح الماء.



بلشون الليل

Nycticorax nycticorax


طائر ليلي يرتاد الجزيرة العربية مهاجراً، ويوجد في تهامة وأودية المناطق الجنوبية الغربية، وكذلك في المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي في فصل الصيف.

يفضل هذا الطائر الاجتماع على الأشجار للجثم وبخاصة أشجار النخيل. ويقطن على الزواحف والثدييات الصغيرة والطيور والقشريات والرخويات.

يبني عشه على أشجار أو شجيرات أو أحواض القصب أو جوف الصخور، وتضع الأنثى من ٣ إلى ٥ بيضات في العش وتقوم بحضانتها لمدة ٢١ - ٢٢ يوماً.

البلشون الأخضر الظهر أو المخطط

Butorides striata



طائر ساحلي منتشر على طول ساحل البحر الأحمر، والمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية.

يفضل هذا الطائر جمع غذائه من نبات الشورة الداكن اللون، ويتخذ سبل عدة لجمع طعامه، كالوثب على الأغصان أو الوقوف دون حراك على حافة المياه، أو برشق شيء صغير الحجم في الماء لاجتذاب الأسماك إلى سطح الماء.

يعد من الطيور الليلية، حيث شوهد يطير فجراً بحثاً عن الطعام.

واق أبيض صغير

Ardeola ralloides




من الطيور المهاجرة الشائع انتشارها في الجزيرة العربية وبخاصة المنطقة الشمالية منها، ويلجأ في هجرته إلى المياه العذبة أو المالحة، كما يفضل النباتات الخضراء الكثيفة. يتغذى بالأسماك وحلزونات المياه وبرقات البعوض، ويُسخر شكله المموه لصيد فرائسه، وللجثم والتعشيش.

يبنى عشه بالأعواد والقصب، ويضع ٢-٧ بيضات في العش، ويشترك الزوجان في إقامة العش ورعاية الفراخ، بينما تقوم الأنثى وحدها بحضانة البيض.

أبو قردان أو

بلشون البقر

Bubulcus ibis




طائر متوطن ومهاجر في الجزيرة العربية، وسبب تسميته ببلشون البقر لالتقاطه القراد من على ظهر الأبقار. يرتاد مختلف المناطق الحضرية والزراعية،

وحظائر المواشي، ومرادم القمامة، فضلاً أهوار المياه العذبة والخنادق والمستنقعات، ويندر وجوده في السواحل والمناطق القاحلة، كما يتردد شتاءً على المزارع ومناطق الري. تضع الأنثى في العش ٢-٣ بيضات.

بلشون رمادي

Ardea cinerea




طائر مهاجر منتشر في الجزيرة العربية، ويعد من زوار سواحلها وأراضيها الرطبة.

يتردد هذا الطائر على السواحل المائية بحثاً عن الطعام، ويصطاد فرائسه بمطاردتها، أو بالوقوف في الماء دون حراك حتى اقترب الأسماك. أما في المناطق القاحلة فيلتهم الجراد الحي، ودويبة

أبومقص، وثعابين الأشجار والحربايات، وبعض الطيور.

يبنى البلشون الرمادي عشاً كبيراً من أعواد النباتات المحلية وأنقاض الشواطئ، وتضع الأنثى ٣ - ٤ بيضات في العش.



بلشون أسود الرأس

Ardea melanocephala

سُجل أول وجود لطائر البلشون الأسود الرأس في الجزيرة العربية في اليمن وسلطنة عمان.

يتردد هذا الطائر على سواحل البحر الأحمر ويتكاثر فيها، كما يفضل المناطق

المجاورة لخلجان المياه العذبة، ومواقع الصرف الصحي والمناطق المطورة والمحاصيل المروية، والأراضي الطينية الساحلية.

يعتمد في غذائه في إفريقيا على السمك وبعض الكائنات الفقارية وغير الفقارية.



البلشون الجبار

Ardea goliath

يعد البلشون الجبار أكبر طيور البلشون حجماً، وهو من الأنواع النادرة غير المهاجرة المتكاثرة على ساحل البحر الأحمر.

يتردد هذا الطائر - الذي يفضل الانزواء عند تناول طعامه -

على مجموعات من النباتات الساحلية، وخصوصاً أشجار الشورة التي تعد حاضنة لغذائه الرئيسي وهو الأسماك، حيث يتناول الأسماك الكبيرة والضفادع والزواحف والقوارض والقشريات، وبقايا اللحوم.

شوهيد عش له يأوي فرخاً كبيراً على شجيرات الشورة في جزر فرسان، وعشه غالباً ما يكون مخفياً عن الأنظار بين النباتات.

البلشون الأرجواني

Ardea purpurea

طائر مهاجر منتشر في شبه الجزيرة العربية وأرخبيل سقطرى.

يفضل الأراضي الرطبة والأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف، مثل البرك المحفوفة بالقصب والبحيرات الاصطناعية، والأماكن الأخرى ذات الأشجار والشجيرات التي يستطيع الاختباء فيها للترصد بفرائسه من الأسماك أو البرمائيات أو الزواحف أو الثدييات الصغيرة أو بعض الكائنات غير الفقارية.

يبنى البلشون الأرجواني عشه من القصب والأغصان والعيدان على ارتفاع 1-2م فوق سطح الماء، وتضع الأنثى 2-5 بيضات، ويتعاون الزوجان في رعاية الفراخ.



بلشون الصخر

Egretta gularis

طائر متوطن ومتكاثر، وواسع الانتشار على سواحل الجزيرة العربية وجزرها. يقطن موائل المياه المالحة، ويوجد غالباً على السواحل الطينية والضحلة في أماكن تجمعات نبات الشورة بحثاً عن الأسماك.

يصطاد هذا الطائر فريسته بنفسه أو بصحبة طائر أو أكثر، إذ يتمايل في المياه الضحلة مرفرفاً أحد جناحيه أو كليهما كي يثير الأسماك من حوله.

يبنى بلشون الصخر عشه على الأرض أو على المنحدرات أو على حطام أو في مبنى مهجور. وتضع الأنثى 3-4 بيضات في العش، ويتعاون الزوجان في رعاية الفراخ.




طيور المدار

Phaethontidae Tropicbirds

تنتشر على امتداد المناطق الاستوائية، فهي طيور بحرية طويلة الجناحين، ذات ذبول شريطية متحورة، وأقدام قصيرة ذات وترات، تتشابه فيها الذكور والإناث، وقد تبدو من بعيد أشبه بطيور النورس أو الخرشفنة. وتوجد جميع أنواع هذه الطيور في المحيط الهندي، ولا يظهر منها في الجزيرة العربية سوى الطائر الاستوائي الأحمر المنقار.

الطائر الاستوائي الأحمر المنقار

Phaethon aethereus



يُشاهد الطائر الاستوائي الأحمر المنقار في جُزر البحر الأحمر والخليج العربي، وقلما يوجد بعيدا عن شواطئ الجزيرة العربية.


يقتات بالأسماك الصغيرة والحبار، حيث يلتقط فريسته غاطسا أو ممسكا بالأسماك الطائرة بجناحيه.

لا يحط هذا الطائر البحري على الشواطئ إلا للتكاثر، حيث يتحرى التجاويف والكهوف لإخفاء عشه، فيبني عشه في تجويف يصل طوله إلى مترين ليضع بيضة واحدة.

الطيور المطرقية الرأس

Hamerkop - Scopidae

يوجد نوع واحد من هذه العائلة ذات الرأس العريض المتوج بعرف، والعنق المستقيم القصير، والمنتقار المعقوف الطرف، المنحدر أفقياً الذي يتشابه فيها الذكر مع الأنثى في الشكل. ويوجد هذا الطائر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي معظم أنحاء جزيرة مدغشقر، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية.



مطريقي الرأس

Scopus umbretta

هو طائر متوطن في سفوح ومرتفعات المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية، ويرتاد الموائل المائية، والجداول الجبلية السريعة الانسياب، وخزانات المياه، وخنادق الري، ومنقبا في شقوق الصخور والطين عن غذائه.

يشاهد مطريقي الرأس كثيراً على مشارف القرى إذ يبني عشه بالقرب منها، ويضع عشه على أغصان الشجر أو على حافة صخرة ما أو منحدر قريب من الماء، وتضع الأنثى من ٤-٥ بيضات، ويقوم الزوجان معا ببناء العش ورعاية الفراخ.


طيور البجع

Pelecanidae Pelicans

طيور مائية تقتات بالأسمك، يتشابه فيها الذكر والأنثى، ولها أجسام كبيرة، وذبول وأرجل قصيرة، ذات أوتار في أقدامها، طويلة العنق، وعريضة الجناحين. ولعل أكثر سمة تميزها هي مناقيرها الطويلة المستقيمة المعقوفة الطرف ذات الجعبة العريضة. وتوجد طيور البجع في جميع القارات بالمناطق البحرية المعتدلة والاستوائية. وثمة ثلاثة أنواع منها موجودة في الجزيرة العربية.

البجع الأبيض

Pelecanus onocrotalus



طائر مهاجر نادر الوجود في دول الجزيرة العربية، يأتي زائراً في فصل الشتاء إلى المنطقة الجنوبية الغربية بأعداد قليلة.

يرتاد شتاءً بانتظام منطقة

جنوب البحر الأحمر، ومناطق المياه العذبة في جنوب غرب الجزيرة العربية، ويتعاون في الحصول على غذائه مع أنواع من الطيور الأخرى، مفضلاً المياه الضحلة العذبة أو المالحة. لا يُرجح تكاثره في الجزيرة العربية نظراً لتناقصه عالمياً وخسارة موائله أو تدميرها.



البجع الوردي

Pelecanus rufescens

يتوطن البجع الوردي جنوب البحر الأحمر، ويحصر تكاثره في الجزر الساحلية.

يرتاد هذا الطائر أشجار الشجرة السوداء، ويحتل الموائل البحرية معظم العام، كما يمكن مشاهدته في عرض البحر قريبا من الطحالب

البحرية العائمة لاصطياد الأسماك المختبئة فيها.

يبني عشه من الأعواد فوق الأرض أو على ارتفاع ٥-١٠ أمتار عن سطح البحر، ويضع بيضتين في العش.

طيور الأطيّش

Sulidae- Boobies and Gannets

طيور بحرية كبيرة الحجم قصيرة الساقين، وذات جناحين طويلين مستدقين وريش ذيل إسفيني الشكل، وذات أقدام عريضة وتريّة ومنقار سميك اسطواناني. وغالبا ما تكون طيور الأطيّش زاهية الألوان، مع تشابه بين الذكر والأنثى. وتوجد عشرة أنواع منها تقطن محيطات العالم، سُجل وجود أربعة منها في الجزيرة العربية.



الأطيّش المقنع


Sula dactylatra

ينحصر تكاثر الأطيّش المقنع في الجزر اليمنية في البحر الأحمر، وفي أرخبيل سقطرى، وجزر الحلايبات قرابة ظفار في سلطنة عمان.

يبحث هذا الطائر عن غذائه بعيدا عن اليابسة متجنباً المناطق المحلية المتاخمة للشواطئ، ويصطاد الأسماك الطائرة، وغيرها حيث يغطس ويطاردها تحت سطح الماء. يعيش الأطيّش المقنع في الجزر الصخرية على منخفض صخري أو بين الحصى، ويضع بيضة أو بيضتين في العش.

الأطيش البني

Sula leucogaster



الأطيش البني من الطيور غير المهاجرة المتوطنة والمتكاثرة في جزر البحر الأحمر وخليج عدن وأرخبيل سقطرى، ويتردد بأعداد كبيرة على منطقة جنوب الخليج العربي.

يتغذى هذا الطائر على

الأسماك الطائرة وسمك السردين، إذ يغطس بشكل عمودي تحت الماء لاصطيادها.

يتخذ للتعشيش منصة صخرية مرجانية أحفورية مرتفعة قرب أرخبيل سقطرى أو ركام رملي في جزر فرسان، مفضلاً الأماكن الخالية من البشر ومن الحيوانات المفترسة.

طيور الغاق

Phalacrocoracidae - Cormorants

هي طيور كبيرة الحجم، تتشابه الذكور والإناث فيما بينها، وذات أجسام وأعناق طويلة، وساقين قصيرتين، وأقدام ذات وترات، وذيل طويل الريش متصلب، ومنقار رفيع أسطواني معقوف الطرف، وهناك ستة وثلاثون نوعا من هذه الطيور العالمية، أربعة منها سُجّلت في الجزيرة العربية.



غراب البحر

Phalacrocorax carbo

يأتي غراب البحر إلى الجزيرة العربية زائرا في فصل الشتاء قاصدا المناطق الساحلية في جميع دول الخليج العربي.

يتردد هذا الطائر على خلجان المياه المالحة والعذبة في المناطق المنخفضة من الخليج العربي، ويقضي جزءا من فصل الشتاء في منطقة الرياض، كما شوهد قرب منطقة الخرج عند بحيرات ليلى سابقا، وكذلك في خميس مشيط. يقطن هذا الغراب على الأسماك، ويفضل التعشيش على الأشجار الناشئة أو المتاخمة للمياه.



غراب البحر السوقيطي

Phalacrocorax nigrogularis

صُنِّف غراب البحر السوقيطي ضمن الطيور المهتدة بالانقراض نظراً لتراجع أعداده بشكل مستمر، وقلّة مواطن تكاثره.

يجثم هذا الطائر على الشريط الرمي كالذي في رأس الزور في المنطقة الشرقية من المملكة أو على المنحدرات الصخرية أو المنحدرات البحرية قرب بير علي شرق اليمن. ولا يقرب المياه العذبة أو اليابسة إلا للعثم أو التكاثر.

يتكاثر غراب البحر السوقيطي بشكل غير منتظم على مدار السنين، ويتعاون الزوجان في الحضانة وإطعام الفراخ.


الصقور

Falcons and allies – Falconidae

تتميز الصقور بغيرها العاري، وحلقتها المدارية، ومنقارها القصير المثلم الشديد الانعكاف وعنقها الخفي وأجنحتها الطويلة المستدقة. ويرغم تشابه ذكر وأنثى الصقور، فإن الذكور أصغر حجماً من الإناث. وثمة أحد عشر نوعاً منها في شبه الجزيرة العربية، خمسة أنواع منها تتكاثر فيها. وكثيراً ما تُشاهد صقور الصيد الهاربة، بما فيها الأنواع الدخيلة في الجزيرة العربية.

العوسق

Falco tinnunculus



العوسق من أكثر الطيور الجارحة انتشاراً وعدداً في الجزيرة العربية في الشتاء. ويعد من الطيور المتوطنة المنتشرة في جميع دول الخليج العربي والجزر الكبرى مثل جزر فرسان، وسقطرى، ومصيرة.

يفضل هذا الطائر الجثم والتغذي في الأماكن العالية كالصخور أو المباني أو الأشجار متربصاً مرور الفرائس، ويتغذى على الجراد والجنديب والخنافس واليسروع والثعابين والسحالي وبعض الجردان والطيور.

يتخذ العوسق المباني السكنية للتعيش، وتضع الأنثى ٢ - ٥ بيضات في الحضنة

الواحدة، وتتولى رعاية الفراخ، بينما يتولى الذكر تأمين الطعام.



صقر الغروب

Falco concolor

صقر الغروب طائر زائر صيفا لجزر البحر الأحمر والخليج العربي والمنطقة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية، ويتميز عن سائر الطيور الجارحة بإطعام

فراخه من الطيور المهاجرة التي تمر بالمنطقة خريفاً.

يفضل الصيد عند المغيب تزامناً مع ذروة نشاط الهجرة، وقد يزور اليابسة وقت الغسق لالتقاط الحشرات الطائرة للتغذي وإطعام فراخه.

يبنى صقر الغروب عشه شمالاً، وشمال غرب السواحل الصخرية، حيث الظل الوافر؛ ل يتمتع بإطلالة رائعة يرصد منها الطيور المهاجرة.


الصقر الحر

Falco biarmicus

الصقر الحر من الطيور المهاجرة النادرة في الجزيرة العربية، ويعد من صقور الصيد المألوفة عند العرب. يوجد في المناطق القاحلة من الجزيرة العربية، حيث يعيش في التلال النائية المحاطة بالسهول الصحراوية.

شوهد يصطاد طائر القبرة القصيرة الأصابع، والقبرة القصيرة الإصبع الصغير، والأبلق الطائر، وكذلك الخفافيش، وخفافيش الفاكهة في اليمن.

يبنى عشه على جرف صخري منحدر، محمي بكهف صغير، ويعيد استخدام العش عدة مرات.



الشاهين

Falco peregrinus




يعد الشاهين من الطيور المهاجرة على امتداد ساحل البحر الأحمر حتى إفريقيا، وينتشر شتاءً في الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية.

يرتاد الشاهين المنحدرات الصخرية العالية في المناطق الجبلية، والمواطن الساحلية التي يتبوأ منها مواقع للمراقبة، ويطارد أنواعا مختلفة من الطيور.

يستخدم الصيادون الشاهين لأغراض الصيد، فكثيرا ما يتم إطلاقه لاصطياد الحباري الآسيوية. ويعشش في المنحدرات الوعرة، وأحيانا على الأرض أو على المباني، ولا يجمع مواد لبناء عشه، وإنما يضع بيضه في تجويف ما أو في عش قديم لأحد الطيور.

شاهين مغربي

Falco pelegrinoides



الشاهين المغربي من الطيور النادرة التكاثر في الجزيرة العربية، وخاصة في شرق المملكة والكويت وقطر.

يتكاثر في المناطق الصحراوية البرية والجبلية ومنحدراتها، ويتربص بفرائسه من علو شاهق، ومن الطيور التي يفترسها الحجل العربي،

والكروان العسلي، وغيرها من الطيور الخائضة في الماء.

يفضل القمم العالية لبناء عشه، ويقوم الذكر بصيد الفريسة لإطعام الأنثى أثناء مدة الحضانة.

طيور العقاب النسارية والحدأة والنسور

vultures, hawks and eagles Accipitridae Osprey, Kites,

عائلة كبيرة ومتنوعة من الطيور الكواسر، إذ ثمة ٢٠٠ نوع منها في العالم، تجمعها بعض الخصائص المشتركة مثل المنقار القصير القوي الشديد الانعفاف، والعنق القصير (باستثناء النسور)، والجناحين الكبيرين المستديرين، والساقين الشديديتين، والمخالب القوية. وتكون إناث الكثير من أنواع هذه الطيور أكبر حجما من ذكورها، وإن تشابه ريش الذكر والأنثى منها إلى حد كبير. وقد سُجِّل ٣٥ نوعا منها على الأقل في الجزيرة العربية، حيث يتكاثر فيها عشرون نوعا، أما الأنواع الأخرى فتهاجر إلى الجزيرة العربية، أو تمر بها.

العقاب النساري


Pandion haliaetus



طائر مهاجر إلى الجزيرة العربية أو عابر لها، وتستأثر جُزر فرسان والوجه وتيران وجرز اليمن بالنصيب الأكبر من طيور العقاب النساري المتكاثرة.

يقتات بأسمك صخور الحديد البحري، حيث يصطاد فريسته بالانقضاض المفاجئ على سطح الماء والتقاطها بمخالبه للإمساك بهذا النوع من الفرائس.

يبني هذا الطائر عشه على نتوءات أرضية أو جبلية أو قمم مرجانية أو نباتات محلية أو منصات اصطناعية من صنع الإنسان، ويشترك الزوجان في حضانة الفراخ.



الحدأة ذات الجناح الأسود

Elanus caeruleus

طائر متوطن بأعداد قليلة في تهامة والتلال السفحية، وربما تأتي من إفريقيا بشكل عشوائي لتكاثر.

يلاحظ وجودها في جميع فصول السنة، بدءاً من شمال الجزيرة العربية حتى


جدة والطائف، ومن الجنوب حتى شرق عدن. تقتات بالثدييات والطيور الصغيرة فضلاً عن الكائنات غير الفقارية والزواحف، وتم رصدها وهي تحلق قرب محاصيل الحبوب.

الحدأة السوداء

Milvus migrans

الحدأة السوداء من الطيور المهاجرة الزائرة شتاءً لجميع دول الجزيرة العربية. وهي من الطيور المتوطنة في المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية كتهامة ومرتفعاتها، وكذلك في مصر.

غالباً ما توجد حول المدن والقرى، وتقتصد مكاناً مرتفعاً لبناء عشها مثل أشجار النخيل أو المباني التي يشيدها



الإنسان أو أعمدة الكهرباء أو المباني الكبيرة، ويشترك الزوجان في بناء العش وحضانة البيض.



النسر الملتحي

Gypaetus barbatus

النسر الملتحي من الطيور الكبيرة غير المهاجرة، يوجد في المرتفعات الجنوبية الغربية من اليمن، وأعداده محدودة في الجزيرة العربية، وقد يكون السبب استهدافه بشكل عشوائي للرماية أو تعرضه للمبيدات الحشرية.

يقتات النسر الملتحي بالنفايات، ويعد من أكلة العظام التي يرتفع بها عالياً ثم يسقطها لتتكسر فيتمكن من أكلها. ولا يُعرف الكثير عن كيفية بنائه لأعشاشه ورعايته لفراخه.



الرخمة المصرية

Neophron percnopterus

الرخمة المصرية زائرة شتوية مهاجرة ومتوطنة في الجزيرة العربية، وتعد من الطيور المهددة بالانقراض.

تقطن مختلف الموائل، وتتردد على المناطق البشرية والنفايات والأسواق وحظائر الحيوانات ومزارع الدواجن للحصول على الطعام، وتتوخى الظل لبناء عشها

المكون من الأعواد وبعض النفايات في كهف أو حفرة صغيرة أو على منحدرات صخرية سهلة النفاذ.



نسر جريفون

Gyps fulvus

نسر جريفون طائر متوطن في المنطقة الغربية والوسطى من شبه الجزيرة العربية، ويتكاثر في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة واليمن، وكذلك المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة.

يقصد هذا النسر المنحدرات الصخرية للعثم والتعشيش والحفاظ على درجة حرارته ليحلق عالياً، مما يجعل المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية ملاذاً ملائماً له. يبني عشه على المنحدرات الصخرية، ويتعاون الزوجان في بناء العش والحضانة وإطعام الفراخ.



النسر الأوذن

Torgos tracheliotos

أدرج نسر الأوذن ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، نظراً لما يتعرض إليه في سائر مناطق العالم من أخطار التسمم وفقد الموئل.

يرتاد هذا الطائر السهول التي تتخللها الجبال والأودية في وسط الجزيرة العربية وجنوبها، ويقتات بالجيف، ولا يظهر في صحراء النفوذ الكبير والربع الخالي إلا زائراً، إذ لا تقطنها أعداد كافية من المواشي، لذلك يعده البدو خطراً على مواشيهم. يعيش على الأشجار الكبيرة ذات القمة المسطحة كأشجار السنط، ويرعى الزوج الواحد أكثر من عش، وقد يعيد استخدام العش نفسه على مدار الأعوام.

عقاب صرارة




Circaetus gallicus

يعد من الطيور التي تمر في أثناء هجرتها بالجزيرة العربية أو زيارتها شتاءً، ويرتاد الأودية السحيقة، والنتوءات الصخرية، والتلال والجبال ذات الأشجار المبعثرة، والقمم العالية، وكذلك سهول المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية وتهامة.

يقتات بالثعابين والأفاعي، ويتكاثر في البقاع القاحلة وسط الجزيرة العربية، ويبني عشه بأعواد الخشب، ويضع فيه بيضة واحدة.

العقاب المصفق



Terathopius ecaudatus

من الطيور الزائرة المتكاثرة والنادرة في الجزيرة العربية. ويفضل منطقة تهامة وسفوح الجبال في المنطقة الجنوبية الغربية، حيث الشجيرات وأشجار الطلح. يقضي نهاره محلقاً في السماء، ومتوخياً الظروف المناخية المناسبة للطيران. لا يتناول الجيف مثل بعض الطيور.

الباشق الحزين الترتيل

Melierax metabates




يوجد هذا الطائر في شمال الطائف وسهول تهامة وجنوب غرب المملكة، ويغادر سفوح الجبال لمطاردة فريسته كالسحالي والتقاطها بقدميه.

يعد من الطيور المتحفظة التي تفضل النأي بنفسها وبعشها عن الأنظار. وقد ورد أن ذكور هذا الطائر تكون شجيرة في موسم التكاثر.

باشق قبر

Micronisus gabar




يتوطن هذا الطائر في سهول تهامة، وفي سفوح الجبال جنوب غرب المملكة. ويميل إلى التخفي في الشجيرات وأشجار الطلح المنتشرة في سهول تهامة وفي الأودية وسفوح الجبال، وخاصة قرب المناطق الزراعية.

يتغذى هذا الطائر على الطيور والفراخ والسحالي والحشرات.

وشوهد عشه على ارتفاع ٧ أمتار في غابة حرشية، مبنياً ببعض أعواد الخشب والجذيرات وورق العشب.

الشيكرأ أو الباشق الكستنائي

Accipiter badius



طيور الشيكرأ من الطيور النادرة المتوطنة عند التلال السفحية، ومرتفعات غرب اليمن، والمناطق المتاخمة لجنوب غرب المملكة، وقرب دبي.

يزور هذا الطائر الصغير المنطقة الوسطى أو الشرقية من الجزيرة العربية شتاءً، ويقطن على السحالي. تلو غقفقة الشيكرأ في فصل الربيع (موسم التزاوج)، حيث يغازل أنثاه بالاستعراض في طيرانه.

حوام سقطرى

Buteo buteo ssp



يوجد حوام سقطرى في جزيرة سقطرى، حيث يعد من الطيور العربية النادرة، ويستوطن التلال السفحية والسهول الواسعة المرتفعة ذات الأودية الصغيرة الضيقة الشديدة الانحدار. يعتمد في بناء عشه على الأشجار ويقصد المنحدرات. ويقطن على السحالي والكائنات غير الفقارية، وربما الفراخ وجيف الكائنات الأخرى.

الحوام الطويل الساق

Buteo rufinus




الحوام الطويل الساق طائر متوطن في الجزيرة العربية، ويتكاثر فيها بأعداد قليلة شتاءً. ويقطن الصحاري النائية الفسيحة وجبال وأودية المرتفعات الجنوبية الغربية. لا يحتاج في بناء عشه للارتفاعات بل لشجيرة غرة، وهذا ما يمكنه من التوطن في صحراء الربع الخالي، والنفود الكبير، والكتبان الخالية من الأشجار.

يقتات الحوام الطويل الساق بالجراد وبعض الطيور والزواحف. ويتعاون الزوجان في بناء العش ورعاية الفراخ.

عقاب أصحم

Aquila rapax



يعد من الطيور غير المألوفة التي تقطن في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة وغرب اليمن، كما يوجد في المناطق المزروعة ذات الأشجار القليلة، وعلى التلال القريبة من مصادر المياه، ولاسيما مناطق جمع النفايات.

يتكاثر عقاب أصحم على مدار العام، ويتميز عشه بكونه كبير حجمه، حيث يبنيه من الأعواد على شجرة شاهقة أو على أعمدة الكهرباء، وقد يكرر التعشيش فيه على مدار الأعوام.



العقاب الذهبي


Aquila chrysaetos

يمكن تحديد منطقتين لتجمعات العقاب الذهبي: الجزء الشمالي الغربي والشمالي الأوسط من المملكة، والجزء الشرقي من الربع الخالي والمنطقة الوسطى من سلطنة عُمان.

ترتاد هذه الطيور السهوب المنبسطة من الرمال أو الأحجار، وكذلك المناطق التي تفتقر إلى الأشجار، وهو ما تقصده الفرائس التي يقتات بها هذا الطائر، مثل بعض السحالي من أكلة الأعشاب والزواحف، وشوهد يقتات بجيفة لإحدى المواشي. يبني عشه على النتوءات الصخرية، ويختلف موسم تكاثره باختلاف موئله الطبيعي.

العقاب الأسود

Aquila verreauxii




طائر متوطن في المرتفعات والتلال السفحية في المنطقة الغربية من الجزيرة العربية، ويُعرف بمهارته في صيد الوبر.

يقصد هذا العقاب المنحدرات الصخرية الشاهقة ويجثم

على الصخور البارزة، وتبني أعشاشها من الأعواد قبل أن تبطنها ببعض الأعشاب والمواد الخضراء على منحدر صخري، ويمكن أن يعاد استخدام العش على مدار الأعوام بعد تهيئته مرة أخرى.

عقاب بونللي

Hieraaetus fasciatus



يوجد هذا الطائر غير المألوف في جبال غرب وجنوب الجزيرة العربية، وهو طائر متوطن في المناطق الصخرية والجبلية. يتكاثر بعضها قرب الرياض عند جبل طويق،

ومنها ما يهاجر إلى إفريقيا في فصل الخريف.

يحلق هذا الطائر لمدد طويلة، ويفضل الاقتراب من فريسته متخفياً بين الأشجار ومن فرائسه الحجل العربي والوبر. وقد لوحظت أعشاش هذا الطائر في حُفر المنحدرات الصخرية، ويتعاون الزوجان في بناء العش وإطعام الفراخ.

الْحَبَارَى

Otididae

طيور برية كبيرة الحجم، تتميز بريشها المنقوش المجعد، ومنقارها الصغير القصير المنبسط، وعتقها الفارع، وذيلها القصير الريش، وجناحيها العريضين، وساقبيها الشديدين الطويلتين. ويوجد من طيور الحبارى ٢٦ نوعا معظمها في إفريقيا. أما في الجزيرة العربية، فقد وجدت أربعة أنواع منها، فضلا عن أربعة أخرى غير فطرية تم إكثارها في الأسر، مثل الحبارى الإفريقية. كذلك شوهدت أنواع منها معروضة للبيع في أسواق الطيور المحلية، لذا من المتوقع هروب بعض الأنواع الغريبة من طيور الحبارى.



الْحَبَارَى الْعَرَبِيَّة

Ardeotis arabs

تتوطن الحبارى العربية في شبه الجزيرة العربية، وتراجعت أعدادها بشكل مثير للقلق بسبب فقد موئلها الطبيعي لصالح حيوانات الماشية، وتطور الزراعة، والصيد.

تُقبل الحبارى على الهضاب الصخرية، والأودية الصغيرة المكسوة بأشجار الطلح وسنابل الأعشاب، وحقول الذرة المطوقة، وتحب التخفي بين المحاصيل المرتفعة لتغير على فرائسها من الكائنات غير الفقارية، وللقناد والتعشيش.

تلجأ الحبارى إلى الظل بعيداً عن البشر في سائر أوقات النهار، وتقتن مناطق لا يتوافر فيها الماء، إذ تستمد معظم احتياجاتها المائية من غذائها. ولا تبني الحبارى عشا وإنما تضع بيضها مباشرة على الأرض.

الحُبَارَى الآسِيوِيَّة (حُبَارَى شَرْقِيَّة)

Chlamydotis macqueenii



يبدأ نطاق تكاثر الحُبَارَى الآسِيوِيَّة من الجزيرة العربية شرقاً حتى باكستان، وإلى شمال الصين ومنغوليا. وتقلصت أعدادها وأصبحت في تراجع مستمر بسبب ما تتعرض له من صيد مفرط.

توجد الحُبَارَى الآسِيوِيَّة عادة في السهول الواسعة الرملية والحجرية، بما فيها من السبخات والكثبان الرملية، وتقصد الغطاء النباتي لأنه مصدر للطعام ومأوى تختبئ فيه عن الأنظار حين ترعى فراخها.

تتحمل الحُبَارَى الآسِيوِيَّة الظروف القاحلة، وتضع بيضها مباشرة على الأرض.

الطيور المائية

Rallidae – Rails and coots

طيور المرعة والغرة طيور ذات منقار صغير وقوي في العادة، رغم أن لبعضها منقاراً طويلاً منحنيًا، ومنها أنواع ذات درع جبهي مشوك. وهي ذات عنق طويل نسبياً، وأجساد تبدو وكأنها مضغوطة من الجانبين، وجناحين قصيرين مستديرين، وساقين طويلتين ذات أصابع طويلة. ويتشابه من هذه الطيور الذكر والأنثى. وتوجد من هذه الطيور المائية ١٤٠ نوعاً فأكثر في مختلف بقاع الأرض، وقد سجل ١٣ نوعاً منها في الجزيرة العربية، منها ٥ أنواع تكاثرت فيها.

مرعة الماء

Rallus aquaticus

مرعة الماء من زوار المناطق الشمالية في الجزيرة العربية والخليج العربي في الشتاء، وأعدادها أقل في الجنوب.

يتردد هذا الطائر بانتظام على الأراضي الرطبة قرب تبوك، وبعض المناطق الساحلية على البحر الأحمر.


سُمع تغريد مرعة الماء إيداناً بموسم التكاثر في واحة تيماء، وفي الجزء الشرقي من الربع الخالي. ويخوض هذا الطائر في

الماء والطين بحثاً عن طعامه من الكائنات الحيوانية والنباتية.



المرعة الصغيرة

Porzana parva




تتكاثر المرعة الصغيرة في شمال شبه الجزيرة العربية، وتعد مألوفة إلى حد ما في شمال وجنوب سلطنة عمان.

تفضل المناطق الرطبة في شمال الجزيرة العربية، حيث نبات القصب المرتفع والبيئة النباتية الكثيفة، والموائل الاصطناعية، وتقتات بالكائنات غير الفقارية الصغيرة.

يطلق الذكر والأنثى صيحة مميزة حادة، وعشها الصغير تبنيه من المواد النباتية القريبة من الماء، وتضعه على منصة بارزة.

المرعة الرقطاء

Porzana porzana



تمر المرعة الرقطاء مهاجرة بالجزيرة العربية، وهي من الطيور التي يصعب مشاهدتها، إلا أن تغريدها يكشف عن أماكن وجودها.


توجد المرعة الرقطاء في الأراضي الرطبة المعشبة، وحضر الصرف الصحي

والبرك الصغيرة ذات الأنواع النباتية العشبية المعمرة، وتتغذى على الكائنات الحيوانية غير الفقارية والأسماك الصغيرة والكائنات النباتية.

يعتني الزوجان معاً بالفراخ ويتعاونان على بناء العش والحضانة.

الفرفر الأرجواني

Porphyrio porphyrio



كانت طيور الفرفر الأرجواني تتردد على شرق الجزيرة العربية بشكل غير منتظم، وعلى الطرف الجنوبي من الخليج العربي ثم باتت تتكاثر فيهما.


يقطن هذا الطائر المائي الكبير موائل المياه العذبة والمالحة، ويقطن بالكائنات

غير الفقارية والأسماك والضفادع والزواحف والكائنات النباتية.

يبني هذا الطائر عشه متيناً في نبات القصب فوق مياه يبلغ عمقها قرابة المتر، مستعيناً بجذوع القصب والأوراق النباتية، مع بعض السويقات التي يحنيها لإخفاء عشه عن الأنظار.

دجاجة الماء

Gallinula chloropus



دجاجة الماء من الطيور المهاجرة الزائرة شتاءً للجزيرة العربية، وتتوخى المناطق المائية الدائمة. كانت تقطن بحيرات ليلى وسط المملكة قبل جفافها، وتقتات بالنباتات المائية، والبذور والفاكهة والحبوب، إضافة إلى الحشرات والكائنات غير الفقارية.

عند حلول فصل الربيع تصبح دجاجة الماء غيرة على موطنها ونطاق تعشيشها، وتطارِد كل من يقترب من العش الذي تبنيه متاخماً ومحاطاً بالماء.

الغرة

Fulica atra



الغرة من الطيور المتوطنة المنتشرة في مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية ولكن بأعداد قليلة.

تقصد مواطن المياه المفتوحة التي تستطيع السباحة والغطس فيها بحثاً عن نباتات مائية، وتعد من الفرائس المفضلة لدى القناصين الذين يصطادون المئات منها في فصول الشتاء، ولم يرد أي وصف لأعشاشها في الجزيرة العربية، إلا أنها من الأنواع الأحادية التزاوج.

طيور السمان

Turnicidae Buttonquails

هي طيور صغيرة مكنزة مجعولة الريش، تشبه إلى حد كبير الطيور الطريفة، فهي قصيرة العنق، وذات جناحين صغيرين مستديرين، وساقين صغيرتين قويتين. وتعد ذكور الطيور السمانية أربد وأصغر حجماً من إناثها، ويوجد نوع واحد فقط في الجزيرة العربية من الـ ١٦ نوعاً التي تقطن الموائل الاستوائية من العالم القديم.

سمان الشجر الصغير

Turnix sylvaticus



طائر صغير خجول، متوطن بأعداد محدودة في المناطق الجنوبية الغربية المنخفضة. وربما يكون زائراً متكاثراً في الجزيرة العربية قادماً من إفريقيا.

شاهد في الحقول المزروعة والمحاصيل في جزيرة مسندم، وكذلك قرب تهامة. ويقطن بالبدور والأعشاب وبعض الحشرات.

أنثى سمان الشجر أكبر حجماً من الذكر، وتتولى بناء العش ومن ثم يقوم الذكر بحضانة البيض، وتذهب لتختار ذكراً آخر وتعشش من جديد.


طيور الكروان

Burhinidae - Thick - Knees

تتميز طيور الكروان بسيقانها الطويلة ومفصل طنبوبي رسغي سميك (لذا تعرف أحياناً بالطيور السميكة الركب)، وريش بني أو أصفر - برتقالي مجعول، ورأس كبير، وعينين واسعتين. أما الجناحان فطويلان تظهر عليهما بقع بيضاء واضحة عند الطيران، وتتشابه ذكور هذه الطيور مع إناثها. وهي طيور مخوضة كبيرة تتردد إلى الموائل الجافة عموماً، كما تعد طيوراً ليلية. ومنها تسعة أنواع، توجد معظمها في العالم القديم، وسُجّلت أربعة منها في الجزيرة العربية.

الكروان الجبلي

Burhinus oedienemus



الكروان الجبلي طائر يمر بالجزيرة العربية مهاجراً ويزورها شتاءً، وله وجود في جميع دول الخليج العربي في فصلي الربيع والخريف.

يقصد هذا الطائر الموائل القاحلة المنبسطة المفتوحة ذات الشجيرات المتناثرة البعيدة عن الماء، وهو طائر غسقي السلوك يميل إلى الرقود نهاراً، إذ يفضل الاسترخاء في الظل أو بين أغصان الشجيرات دون حراك، ويقنت بالحشرات، ويُعرف عنه بأنه طائر أحادي التزاوج خارج الجزيرة العربية.



الكروان الجبلي الأرقط

Burhinus capensis

يوجد الكروان الجبلي الأرقط في النصف الجنوبي من الجزيرة العربية، ويتردد على المناطق الجافة ذات الشجيرات الصغيرة، مثل الطلح والأعشاب التي تتخللها الرمال والحجارة.

يعد من الطيور الجاثمة التي تتوخى الظل، ويقتات بالحشرات والرخويات والضفادع، وبعض بذور الأعشاب في إفريقيا.

يُسمع غناء الكروان الجبلي الأرقط ليلاً وخاصة في أواخر فصل الشتاء أو عند حلول الربيع لاجتذاب الأنثى أو الإعلان عن نطاق وجوده. وعشه الظليل مكون من بعض الأعشاب والعشبات.

الحنكور

Dromadidae

يُعد طائر الحنكور هو الطائر الوحيد من عائلة طيور *Dromadidae* الموجودة في شبه الجزيرة العربية، وهو طائر ساحلي يتميز بلونه الأبيض والأسود، وحجمه المتوسط، ومنقاره العريض المضغوط من الجانبين.

الحنكور

Dromas ardeola



طائر إقليمي يقطن الجزر المحيطة بشبه الجزيرة العربية في المائل الخالية من الحيوانات المفترسة. يقات بعض الأسماك والكائنات التي تعيش على الشطآن المائية.

يطوف بحثاً عن طعامه ليلاً أو وقت الغسق في الأمواج، ويتكاثر في ذروة الصيف، حيث يقوم بحفر جحر مقوس

أو سيني الشكل في الأرض ليضع فيها بيضة كبيرة الحجم.

طيور الطُّول والنكات

Recurvirostridae

تتكون هذه العائلة من طيور مخوضه أنيقة ذات لونين (أبيض وأسود) في معظم الأحيان، تتوزع في شتى أنحاء العالم. وتتميز هذه الطيور بساقها الرفيعة اللتين تكونا إما طويلة، أو فارعتا الطول، وعنقها الطويل، ورأسها الصغير، ومنقارها الممتد الرفيع الذي إما أن يكون مستقيماً، أو مقلوباً. وتختص الجزيرة العربية بنوعين يتكاثران فيها، أحدهما من طيور الطول والآخر من النكات، يستغل كلاهما الظروف المواتية للتكاثر، وهما من الطيور المهاجرة.

أبو المغازل

Himantopus himantopus



يُقبل أبو المغازل على الأراضي الطينية المفتوحة والجزر، ومناطق المياه، ويؤثر أهوار مياه الصرف الصحي. ويعد الطائر الوحيد الذي يقتات بالكائنات غير الفقارية الموجودة على سطح الماء.

يتكاثر في جزر صغيرة هادئة، ويختلف طراز العش الذي يقيمه من حيث الصلابة باختلاف ما تقتضيه ركيزة العش (على الأرض أو صخرة ما أو نباتات عائمة).

ويتقاسم الزوجان مهام تشييد العش والحضانة ورعاية الفراخ.

النكات


Recurvirostra avosetta

من الطيور المهاجرة والزائرة الأكثر انتشارا وشيوعا في الجزيرة العربية، المتكاثرة بشكل عشوائي في شرقها.

يُعرف بأنه طائر السواحل، إلا أنه يرد المناطق البرية مثل تبوك وسكاكا والمدينة المنورة وخميس مشيط، وكذلك وسط الجزيرة العربية، ويتردد

للتكاثر على سبخة الفيصل والمنطقة الشرقية.

يقتات بالكائنات غير الفقارية المائية كالحشرات ويرقاتها والديدان والقشريات والأسماك. ويتقاسم الزوجان بناء العش والحضانة ورعاية الفراخ.




طيور الزقزاق (رسول الغيث)

Charadriidae

عائلة كبيرة من الطيور العالمية الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، وهي طيور مخوضة توجد عادة بجوار المياه المالحة أو العذبة، وتتضمن أكثر من ستين نوعاً في العالم، ووجد ستة عشر نوعاً منها في الجزيرة العربية، منها ستة أنواع متكاثرة.

قطقاط شوكي الجناح

Vanellus spinosus



انتشر القطقاط الشوكي الجناح تدريجياً في الجزيرة العربية مستفيداً من الموائل الملائمة له مثل المياه العذبة والموائل الاصطناعية بما فيها من بحيرات النفايات السائلة ومقالب النفايات.

رُصدت أسراب له في ينبع على طول ساحل البحر الأحمر في فصل الشتاء، وغذائه ربما يكون على مختلف الكائنات غير الفقارية المائية.

يتشارك الزوجان في بناء العش والحضانة ورعاية الفراخ. حيث يرعى الذكر الفقس الأولى، بينما تضع الأنثى للمرة الثانية.




قطقاط أحمر اللغد

Vanellus indicus

طائر متوطن وشبه مهاجر إلى شبه الجزيرة العربية، ويفضل الأراضي الداخلية المفتوحة ذات برك المياه العذبة أو الراكدة.

يقتات هذا الطائر بشتى أنواع الكائنات غير الفقارية كالخنافس والرخويات والقشريات. ويعلو تغريده أثناء تشييد العش، وشهدت أزواج منه تبلل جناحها أثناء الجو الحار لتبريد أجسامها قبل أن تعود مرة أخرى لحضانة البيض.



قطقاط أبيض الذيل

Vanellus leucurus

من الطيور النادرة المهاجرة إلى جميع دول شبه الجزيرة العربية، وتتزايد مواطن تكاثره في الأجزاء الشرقية منها.

يفضل هذا الطائر الأراضي الرطبة، أما الطيور الزائرة شتاءً فتفضل الخلجان الساحلية الضحلة. ويقتات بشتى أنواع الكائنات غير الفقارية، وقد عُثر له على عش مكون من قشر الحلزون وبعض الأحجار الصغيرة وسويقات الأعشاب.



قطقاط مطوق صغير


Charadrius dubius

طائر مهاجر منتشر في شبه الجزيرة العربية، ويُقبل على مواطن المياه العذبة، في حين توجد الطيور المهاجرة منه في برك الأمطار المؤقتة في الصحراء.

يفضل هذا الطائر الموائل المفتوحة للتعشيش ذات الركام الرملي أو الحصى القريبة من جداول وأهوار المياه. ويقتات بالحشرات والكائنات غير الفقارية.

يقوم هذا الطائر باستعراض تمويهه لـصرف انتباه أي دخيل عن عشه، كالتظاهر بانكسار أحد جناحيه.


قطقاط اسكندري



Charadrius alexandrinus

يعد القطقاط الاسكندري من أشهر الطيور الساحلية المخوضة في شبه الجزيرة العربية، ويأتي مهاجراً لزيارتها شتاءً. ويحط ويعشش على الشواطئ الرملية وفي المناطق الطينية الساحلية والسبخات، وعند خزانات مياه المرتفعات الجنوبية الغربية.

يقتات على الكائنات غير الفقارية. السائد في سلوك هذا الطائر هو إخلاص الزوجين لبعضهما من عام لآخر وولائهما لمقر التعشيش ذاته.



قطقاط الرمل الكبير

Charadrius leschenaultii

يأتي قطقاط الرمل الكبير إلى الجزيرة العربية مهاجراً وزائراً شتوياً، أما في أشهر الصيف فيأتي بأعداد قليلة،

ونادراً ما يتكاثر فيها، فيحل في مناطق مثل تبوك وحائل والرياض والمرتفعات الجنوبية. يقصد هذا الطائر الأراضي المنبسطة الخالية من الأشجار ذات البيئة النباتية الملحية أو الصحراوية والمناطق المجاورة للمياه. ويقتات بالقشريات والرخويات.

طيور اليقنة

Jacanidae

تتميز هذه الطيور بساقها الطويلتين، وأصابع أقدامها، ومخالبها الطويلة، التي تمكنها من التحرك فوق النباتات العائمة في موائل المياه العذبة. وهي طيور ممتدة العنق، ذات منقار كبير إلى متوسط الحجم، وجبهة عارية في العادة وغيب، فضلاً عن جناحين عريضين، وشوكة سنعية في بعض الأنواع، وبثرة مسمارية في بعضها الآخر.



يقنة متدرجة الذيل

Hydrophasianus chirurgus

تتكاثر اليقنة المتدرجة الذيل في الجزيرة العربية في منتصف فصل الصيف، وتعد من الطيور الشائعة في جنوب سلطنة عمان شتاءً.

تتخذ إناث هذا الطائر أزواجاً عدة، إذ شوهدت الأنثى وهي تقوم بحماية

ذكرين أو أكثر. فتضع الإناث بيضها لأزواجهن الذين يتولون وحدهم بناء العش وحضانة الفراخ ورعايتها. وقد تضع الأنثى أكثر من قفصة واحدة من البيض في الفصل الواحد ومع الزوج الواحد.

الكروان وأبو اليسر

Glareolidae

طيور مخوضة متوسطة الحجم من العالم القديم، منها فصيلتان: الكروان وأبو اليسر، تشتركان في بعض السمات الخارجية. فطيور الكروان تعد من طيور البراري القاحلة ذات المنقار الممتد، والجناح والذيل العريضين القصيرين، والساقين الطويلتين، وأصابع الأقدام الثلاثة. أما طيور أبي اليسر، فطيور آكلة هوائية، غالبا ما توجد في المناطق المتاخمة للمياه، وبمنقار قصير، وأجنحة طويلة دقيقة الأطراف، وريش ذيل متفرع، ولدى معظمها ساقان طويلتان ذات أربعة أصابع.

كروان عسلي

Cursorius cursor



من الطيور الصحراوية المخوضة التي تتكاثر في السهول الرملية والحجرية في المناطق الشمالية والشرقية من شبه الجزيرة العربية. ويعد من الطيور المتوطنة والشائعة في جزيرة سقطرى. يلازم الطائر السهول التي تتخلها الكثبان الرملية، وشجيرات السهوب التي يتغذى بها، ومناطق الحصى

المجردة التي يعيش فيها، وكذلك المزارع المروية ذات محاصيل العلف، ومواطن القمامة، وحظائر الحيوان.

يقطن هذا الطائر بالكائنات غير الفقارية، ويتعاون الزوجان في حضانة البيض ورعاية الفراخ.



أبو اليسر المطوق

Glareola pratincola

من الطيور المهاجرة العابرة لشبه الجزيرة العربية، والمنتشرة دائماً في جبال تهامة والمرتفعات.

يفضل هذا الطائر السربي مواطن المياه بأنواعها، وعادة ما يستظل بالنباتات فراراً من لهب الشمس.

ويتغذى بمختلف أنواع الحشرات التي يصطادها أثناء الطيران.

يتكاثر أبو اليسر المطوق في أواخر فصل الربيع وتتميز أفراخه بتموهها الهائل، ويتردد الزوجان لإطعامها من الحشرات.

طيور النورس والخطاف

Laridae

هناك ثلاث فصائل من هذه الطيور ذات الريش - الأبيض - الرمادي في الغالب - والملامح السوداء (أنماط وغطاء الجناحين) والأقدام ذات الوترات. أما طيور النورس، فطيور ساحلية يتفاوت حجمها بين الصغير والكبير، ثقيلة الجسد، وذات منقار معقوف الطرف. ويوجد ١٤ - ١٥ نوعا من الخمسين نوعا المنتشرة في العالم في الجزيرة العربية، حيث يتكاثر ثلاثة منها. أما طيور الخطاف فتكون صغيرة الحجم والبنية، كما تبدو أكثر أناقة من طيور النورس بجناحيها الطويلين الدقيقين، وريش ذيها المتفرع الأكثر طولاً في الغالب، والمنقار الدقيق، فضلا عن ألوانها الزاهية. وهي طيور مائية ذات حجم صغير إلى متوسط، معظمها طيور ساحلية، والبعض منها أوقيانوسي، في حين يقطن البعض الآخر موائل المياه العذبة. ويوجد ١٨ من أصل ٤٠ نوعا (أو أكثر) منها في الجزيرة العربية، حيث يتكاثر ١٣ نوعا. أما النوع الثالث (طيور أبوالمقص) فيتميز بفكه السفلي المتناول، وأسلوبه الفريد في التغذية، ولا يرد الجزيرة العربية إلا شاردًا.

نورس أبيض العين


Larus leucophthalmus



من الطيور المتوطنة في جميع مناطق البحر الأحمر، وسُجِّل تكاثره في عشرين جزيرة سعودية، وصنّف من الأنواع المهددة بالانقراض.

غذاء هذا الطائر من الأسماك والكائنات غير الفقارية البحرية التي

يلتقطها من سطح الماء، ويقصد الجزر الرملية القاحلة الهادئة للتعشيش، ولوحظ قيامه بإعداد عشه قبل أيام عديدة من طرح البيض، ربما من باب الإعلان عن مقر تعشيشه أو المغازلة أو توطيد علاقة التزاوج.



النورس الفاحم


Larus hemprichii

من الطيور المهاجرة المنتشرة في المنطقة الجنوبية والوسطى من البحر الأحمر، على امتداد الساحل الجنوبي، وجنوب الخليج العربي.

يقتات هذا الطائر بالأسمك،

ويلاحق قوارب الصيد لالتقاط ما يسقط منها. كما يُعرف بسرقة بيض الطيور الأخرى وسلبه لطعام غيره لإطعام فراخه.

يقصد النورس الفاحم عند التكاثر الجُزر، ويبنى عشاً يكاد يكون حفرةً مجردة، مزيناً ببعض أعواد القش أو فتات العظام أو بقايا المواد العضوية أو غير العضوية.



النورس المستدق المنقار

Larus genei


زائر شتوي يحط في جميع سواحل الجزيرة العربية. ويتكاثر في جزر وره وبوبيان في الكويت.

يتغذى في المياه الضحلة

القريبة من الشواطئ، فتارة يهبط غاطساً في الماء لمباغثة الأسماك الصغيرة، وتارة يخوض في الماء بحثاً عن طعام. أما أعشاشه فعادة ما تكون متسخة بالروث، ويقوم الزوجان بحضانة البيض ورعاية الفراخ.

خطاف بحر نيلي

Sterna nilotica




خطاف البحر النيلي طائر ساحلي مهاجر يرد أنحاء شبه الجزيرة العربية، وطرائر الأقاليم والموائل الساحلية وغيرها من المواطن التي تعج بالنباتات.

يتناول مختلف أنواع الأطعمة التي يلتقطها من سطح الماء أو الأرض أو من بين النباتات. ويقصد لإقامة عشه مواطن هادئة ذات شجيرات صغيرة تحيط به أو تكون بجواره، وعشه يتراوح بين الحفرة المجردة والعش المزين المبطن، وتتفاوت ألوان الفراخ بتفاوت أشكال الأعشاش.

خطاف بحر قزويني

Sterna caspia



تشاهد طيور خطاف البحر القزويني في جميع سواحل شبه الجزيرة العربية على مدار العام، فمنها ما يعد متوطناً فيها، ومنها ما يعد مهاجراً أو زائراً لها. ويتكاثر في جزر البحر الأحمر، وجزر الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

يقتات بالأسمك والجراد المهاجر، والكائنات غير الفقارية البحرية، وبيض وفراخ الطيور. ويبني عشه في حفرة على أرض رملية أو جيباً رملياً على قاعدة صخرية معززة بمنصة من الحصى.

خطاف البحر المتوج الصغير

Sterna bengalensis



طائر زائر ومتكاثر صيفاً في الجزيرة العربية، كالجزر السعودية وشمال البحرين، وفي خليج سلوى، وجزر الإمارات العربية المتحدة.

يهوى هذا الطائر التغذي والتكاثر والجثم بشكل جماعي، ويتكون عشه من حفرة سرعان ما تزداد عمقا في مدة الحضانه، ويكون على

طرفها نتوءات من ذرق الطائر نتيجة جلوس أو وقوف الزوجين فوق البيض.

خطاف البحر ساندوتش

Sterna sandvicensis




يأتي هذا الخطاف مهاجراً وزائراً في فصل الشتاء إلى سواحل الجزيرة العربية، وينتشر بأعداد كبيرة في الخليج العربي.

يُعرف بطائر المناطق

الساحلية والجزر، ويلتقط طعامه غاطساً لصيد الأسماك أو على الديدان والقشريات. أما عشه فحفرة عارية سرعان ما تمتلئ بالبراز.

خطاف البحر السريع

Sterna bergii




يوجد خطاف البحر السريع حول شواطئ شبه الجزيرة العربية على مدار العام، وفي جزر البحر الأحمر والخليج العربي صيفا.

يبحث عن الأسماك في عرض البحر وفي الجزر الساحلية، إما غطساً بشكل مفاجئ أو خطفاً من سطح الماء. يعيش هذا الطائر بالقرب من تجمعات أنواع أخرى من طيور الخطاف، وتضع هذه الطيور بيضها بالتزامن مع بعضها.

خطاف البحر الوردي

Sterna dougallii



يعد خطاف البحر الوردي من الطيور الخجلة التي تزور جنوب شرق الجزيرة العربية صيفا، ويتكاثر في الجزر المنخفضة والرملية ذات الغطاء النباتي الجيد.

يتغذى هذا الطائر بالأسماك والكائنات اللافقارية التي عادة ما يصيدها أو ينتزعها من الطيور الأخرى، ويُعرف بتزاوجه مع أنواع أخرى من طيور الخطاف. وتتجمع هذه الطيور عند ارتفاع الموجة المزبدة أو قرب الصخور.

خطاف البحر أبيض الخد

Sterna repressa



خطاف البحر أبيض الخد طائر ساحلي شبه مستوطن في البحار المحيطة بالجزيرة العربية، ويزور المنطقة صيفا ليتكاثر في جزرها.

يتقب عن غذائه في المياه الضحلة، وفوق الشعاب والأمواج المتكسرة على الشاطئ، وفي الموانئ وقرب الأرصفة، ويعرف بمنقاره سطح الماء أو يهبط غاطساً أو يلتقط ما يجده من غذاء على الأرض. يعيش في الجزر الرملية أو الرقع الرملية المغطاة بالنباتات.

خطاف البحر الصغير

Sterna albifrons




تمر طيور خطاف البحر الصغير مهاجرة بالمناطق الساحلية، وفي قلب الجزيرة العربية عند الرياض وتبوك. يتكاثر هذا الطائر في العديد

من موائل المياه العذبة الجديدة بعد انتشار هذه الموائل في المنطقة الشرقية والوسطى. يتغذى على الأسماك ويتتبع أماكن تجمع المياه، وتكاثره وسط تجمع طيور أبي المغازل لتوفير الحماية لعشه من الحيوانات المفترسة.

خطاف بحر سوندرز

Sterna saundersi



خطاف بحر سوندرز يحط
ضيفاً على جنوب الجزيرة
العربية، وهو من الطيور


المتكاثرة في الخليج العربي والبحر الأحمر.

يقتات على الأسماك الصغيرة، فضلاً عن القشريات والحشرات والرخويات. ويعشش في
المناطق المنبسطة الخالية من البيئة النباتية ومن الحيوانات المفترسة.

يتعاون الزوجان في حضانه ورعاية الفراخ، ويقوم أحدهما بجلب الطعام للآخر عند حضانه
البيض.

خطاف البحر الأسحم

Sterna anaethetus



زائر صيفي متكاثر في الجزيرة
العربية، وجزر البحر الأحمر والخليج
العربي. ويستغل أي حطام سفينة يطفو
على الماء للعثم.

يقتات بأسمك السردين والأنشوجة
ويرقات الجمبري والجراد الصغير
التي يطعمها لفراخه. ويتحرى للتكاثر
الجزر الظليلة.



خطاف البحر الفاحم


Sterna fuscata

يزور خطاف البحر الفاحم الجزيرة العربية صيفا بأعداد محدودة، وهو طائر بحري أوقيانوسي لا يقرب اليابسة إلا للجنم أو التعشيش.

يتناول الأسماك والحبار فضلاً عن الأحشاء والحشرات، كما يخطف الأسماك الطائرة أثناء طيرانه، ويصطاد ليلاً أحياناً وقت صعود الحبار إلى السطح. يعيش في المناطق المفتوحة، رغم ما ورد بأنه يفضل الغطاء النباتي.

خطاف مستنقعات أبيض الجناح


Chlidonias leucopterus



يُعبّر هذا الطائر المهاجر الجزيرة العربية في فصلي الربيع والخريف، ويمضي شتاءه في المنطقة الشرقية، وفي جنوب شبه الجزيرة العربية.

كثيراً ما يشاهد وهو يصطاد الحشرات، إلا أنه خارج الجزيرة العربية يتناول الكائنات غير الفقارية المتوافرة في الموائل البرية والمائية، فضلاً عن بعض الأسماك الصغيرة.

يبنى أعشاشه فوق مستوى سطح الماء على النباتات العائمة.



الأبله الاعتيادي

Anous stolidus

زائر صيفي واسع الانتشار في جنوب البحر الأحمر وجزيرة سقطرى، وتعد الجزر المجاورة للقنفذة في المملكة مقر تكاثره في البحر الأحمر.

غالباً ما يحط على رؤوس السباحين أو على الأيدي الممتدة إليه. ويتغذى على الأسماك، ويقصد الجزر ذات التصدعات الصخرية أو البيئة النباتية للتكاثر.


طيور القطاة

Pteroclididae

طيور برية متوسطة الحجم، توجد في المناطق القاحلة، وهي ذات منقار قصير مخروطي الشكل، قصيرة الساق، مريشة الأرجل، وذات جناحين طويلين مستدقي الطرف، وريش ذيل قد يكون طويلاً ومستدقاً. أما ريش هذه الطيور فمجموع في الأعلى في الغالب. وهي طيور فاعلة لا تجثم أبداً، أشبه ما تكون بالحمائم والطيور الطريفة. وتستأثر الجزيرة العربية بستة أنواع من ستة عشر نوعاً من طيور العالم القديم هذه.

قطا عراقي

Pterocles alchata




تأتي طيور القطا العراقية إلى شمال شبه الجزيرة العربية شتاءً، وتنتشر في أقصى جنوب المملكة، وتؤثر السهول الرملية وسهول الحصى، والمناطق المنبسطة الصخرية أو ذات الصخور المتناثرة أو الحرات التي تتخللها بيئة نباتية خفيفة.

يتردد هذا الطائر على خنادق

الري والمزارع شمال تبوك، ويتغذى بالحشرات. ويتخذ لعشه رقعة نائية يحضر فيها حضرة صغيرة في ظل شجرة ما.

قطا كستنائي البطن

Pterocles exustus



تقيم طيور القطا الكستنائية البطن في المناطق المنخفضة في الجزء الشرقي والغربي والجنوبي من شبه الجزيرة العربية.

يوجد هذا الطائر في تهامة حتى شمال جدة. وهو طائر السهول الصحراوية الرملية ذات الشجيرات القريبة من الشاطئ، وسهول الحصى ذات الشجيرات. يقات بأنواع البذور وبعض المواد النباتية، ويتعاون الزوجان في حضانة الفراخ ورعايتها.

القطا المرقط

Pterocles senegallus



يوجد طائر القطا المرقط بأعداد قليلة في شبه الجزيرة العربية، ويُرجح أن يكون طائراً رحّالاً، ويتكاثر في حرض والهضوف ومزارع الحبوب المروية، وهو بحاجة لشرب الماء ولا سيما عند لهيب الصيف وموسم التكاثر.

يقات القطا المرقط بمختلف أنواع الحبوب والمواد النباتية، وهو من الطيور السريعة التي تستفيد من تجمعها للتصدي للحيوانات المفترسة.

قطا متوج



Pterocles coronatus

القطا المتوج من الطيور المتوطنة حصرياً في سلطنة عمان، وهو طائر سربي رحال كثير التنقل وسريع الطيران.

يقطن صحاري الرمال أو الحصى لكنه لا يقرب الكثبان الرملية ذات الشجيرات الصغيرة، وتتألف أعشاشه من حفر صغيرة في الرمل أو بين الحصى، تطوقها حلقة من الأحجار الصغيرة، ويتعاون الزوجان في حضانة الفراخ ورعايتها.

قطا ليشتنستين

Pterocles lichtensteinii



طائر متكاثر متوطن وغير مهاجر، ويقطن التلال والسهول الصخرية عند الأطراف الشرقية والجنوبية والغربية من شبه الجزيرة العربية.

تقطن طيور قطا ليشتنستين منحدرات التلال الصخرية القاحلة والأودية والتلال الحجرية، وبخاصة أشجار السنط (الأكاسيا). أما في تهامة فتقطن سفوح التلال والحدود الشرقية الجافة من المرتفعات. تقنت بالبذور وبعض الحشرات. ويتعاون الزوجان في الحضانة ورعاية الفراخ.


طيور الحمام واليمام

Columbidae

طيور متوسطة الحجم، صغيرة الرأس، قصيرة العنق، يتشابه منها الذكر والأنثى. ريشها الأملس الكثيف كثيرا ما يكون بُنياً أو أسود اللون، أما الأنواع الاستوائية منها، فذات ريش زاهي الألوان، كما أن لبعضها علامات بارزة في أعناقها تكون متقزحة اللون. وتتمتع هذه الطيور بقدرة كبيرة على الطيران، ومن الأنواع الثلاث مائة المنتشرة عالمياً، ثمة أربعة عشر نوعاً منها في الجزيرة العربية، فضلاً عن نوعين آخرين يشردان إلى المنطقة الجنوبية الغربية.

حمام جبلي

Columba livia



الحمام الجبلي من أكثر الطيور انتشاراً في معظم أرجاء الجزيرة العربية باستثناء صحراء الربع الخالي والنفود الكبير، والمنطقة الشمالية من المملكة. هو طائر الجبال والأودية

الصخرية، حيث يعيش ويجمع، ويبحث في الحقول ومواطن الحبوب وحظائر الحيوانات عن غذائه. وغالبا ما يلجأ للمباني والهياكل المعمارية للتعشيش.

يسمع هديل الحمام الجبلي في المدن وفي أرجاء الصحراء، حيث يسجع الذكور وهم يدورون حول الإناث متميلين ومطرقى الرؤوس.

حمام الغابات

Columba Palumbus



طائر مهاجر في شمال المملكة وشرقها، ويُعتقد أنه يتكاثر في الخليج العربي. ويفضل منحدرات التلال المكسوة بالأشجار والأودية الهادئة المرتفعة. ويلجأ للشجر للاحتماء والجنم والتعشيش. يشتهر حمام الغابات بهديله الذي يختلف باختلاف المناطق الجغرافية، ويزداد هديله في فصل الربيع وأوائل موسم التكاثر، خاصة قبل المغيب وبعده.

الحمام الزيتوني

Columba arquatrix



الحمام الزيتوني طائر منزو إلى حد كبير، وشوهد لأول مرة في الجزيرة العربية في قمة جبل السود جنوب غرب المملكة، ثم توالت مشاهدته عدة مرات في المكان نفسه.

يقصد هذا الطائر الأماكن النائية الهادئة في الجزيرة العربية، ويصعب الاقتراب منه لهروبه بعيداً عن أي كائن يدنومه. ويوجد غالباً في غابات العرعر والزيتون جنوب غرب المملكة.

القمرى



Streptopelia turtur


القمرى من الطيور المهاجرة الشائعة في الجزيرة العربية، ويزورها صيفا للتكاثر، وبأعداد قليلة في دول الخليج العربي.

يحبذ هذا الطائر مناطق الأشجار المنخفضة أو الأدغال الصغيرة أو الحدائق أو المشاتل التي تتوافر فيها الحماية، فضلاً عن الأراضي الزراعية المروية.

يتغذى بالمواد النباتية والحبوب، فضلاً عن الكائنات اللافقارية أحياناً. ويتجمع عدد من أزواج هذا الطائر للتكاثر.

قمرى نواح

Streptopelia lugens



القمرى النواح طائر المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة، وطائر غابات أشجار العرعر المتاخمة للأراضي الزراعية المرتفعة.

يتشارك في موئله مع الحمام الزيتوني، ويبدأ موسم تكاثره في الجزيرة العربية خلال عودة الطيور من هجرتها نظراً لتضاعف أعدادها مقارنة بأشهر الشتاء.

يبني عشه من بعض الأعواد الملتقطة من أغصان الأشجار.

اليمام المطوق



Streptopelia decaocto

اليمام المطوق طائر متوطن وشائع في الجزيرة العربية، وما زالت أعداده في تزايد مستمر، ويفضل المزارع والحدائق ومعظم المواطن التي يقطنها الإنسان.

يتغذى هذا الطائر بشتى أنواع البذور إضافة إلى مخلفات طعام الإنسان مثل فتات الخبز وبقايا الأرز، وكذلك الكائنات غير الفقارية والأعشاب. يرتاد وسط الجزيرة العربية الأودية النائية ذات شجيرات السنت (الأكاسيا) الكثيفة ويتكاثر فيها.

يمام مطوق إفريقي

Streptopelia roseogrisea



اليمام المطوق الإفريقي يتكاثر في الأجزاء الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية، إذ تأتي أعداد كبيرة منه من إفريقيا في فصل الصيف للتكاثر في الجزيرة العربية.

يقصد هذا الطائر مختلف الموائل بما في ذلك شجيرات السنت (الأكاسيا) الجافة، وجوار القرى والأراضي الزراعية، والأودية النائية. ويقتات بالشعير وحبوب الدخن وبعض أنواع الفاكهة.

يعيش في أشجار المنغروف، وعشه هزيل يضعه على الأشجار بارتفاع من متر إلى ثلاثة أمتار.

يمام أحمر العين أو شبه المطوق

Streptopelia semitorquata



يقطن اليمام الأحمر العين جنوب غرب المملكة، ويعد من الطيور الشائعة والأكثر انتشاراً. ويرتاد المناطق المشجرة وخاصة منحدرات التلال الخضراء، والحدائق ومواطن الأشجار والشجيرات

التي تكون في معظمها ماءً جارياً مثل منحدرات التلال الدنيا المتاخمة لتهامة.

يتكاثر هذا الطائر على مدار العام، ويتغذى بالفاكهة والبذور وأنواع التوت وغيرها من المواد النباتية.

اليمام الضاحك

Streptopelia senegalensis



اليمام الضاحك طائر ضواحي القرى ومزارع النخيل، يرتاد المناطق المأهولة والمزروعة بحثاً عن طعامه.

يفضل اليمام الضاحك الأشجار والشجيرات الكثيفة، وينقب عن البذور على الأرض، ويتناول مخلفات

طعام الإنسان، لذا كثيراً ما يحوم حول أماكن النفايات.

يتكاثر على مدار العام، ويبيد مرونة عند اختيار موطن تعيشه من مختلف أنواع الأشجار والشجيرات أو المباني وحواف النوافذ.



يمام طويل الذنب

Oena capensis


اليمام الطويل طائر أدغال السنط (الأكاسيا) الجافة في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية، حيث يتردد على المناطق الزراعية وحظائر الحيوانات وجوار القرى. أما

وسط الجزيرة العربية فيعد طائر المزارع ومباني الماشية والأعلاف.

يقطن بالحبوب والحشرات. ويتعاون الزوجان في مهام التعشيش، ويعشش على سعف نخل أو نبات حولي أو جذور شجرة مقلوبة.

الحمامة الخضراء

Treron waalia



توجد الحمامة الخضراء في المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية، وقد ورد قدوم هذا الطائر السربي على متن سفن البحر الأحمر وخليج عدن.

يفضل هذا الطائر الأشجار المثمرة بالفاكهة مثل الأودية الخضراء ومنحدرات التلال ذات الأشجار والحدائق والمشاتل، ويهوى التين والتمر الأخضر والبذور الصغيرة، ولا يقرب الأرض إلا للشرب.

تبني الحمامة الخضراء عشها على الشجرة، ويتعاون الزوجان في حضنة الفراخ.

طيور الببغاء

Psittacidae

أبداع الخالق عز وجل ما يزيد على ثلاثمئة وخمسين نوعاً من طيور الببغاء في العالم. توجد معظمها في المناطق المدارية، أو في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ولا يوجد منها ما يعد من الطيور العربية. وتتميز طيور الببغاء بعنقها الصغير، ورأسها العريض نسبياً ذي المنقار القصير القوي المعقوف، وهي متراصة الجسد، قوية الجناحين، قصيرة الساق، زوجية المخالب. وغالباً ما يتشابه الذكر والأنثى. وهي طيور ذكية لعوبة، ولدى العديد منها ريش زاهي اللون، مما يجعلها أكثر الحيوانات الأليفة شعبية. كما أن التجارة بها وشعبية الطيور الأليفة على نطاق عالمي، ساهما في هروب العديد منها من الجزيرة العربية، ولم يتكاثر فيها إلا القليل.

درة نبيلة

Psittacula eupatria

تعد من الطيور الغربية على الجزيرة العربية، وتمثل سوقاً رائجة للبيع في عدد من دول الخليج العربي.

تقصد الدرة النبيلة المناطق المنخفضة ذات الأشجار والنباتات، مثل حدائق الضواحي وملاعب الغولف والمناطق الزراعية. وغالباً ما تتغذى على الأشجار (السدر). وتعرف في الهند بتناولها لمختلف أنواع الفواكه والأوراق والبذور والنباتات.

يعشش هذا الطائر في فجوات الأشجار التي لا يمكنه توسيعها رغم كبر حجمه، مما قد يحد من فرص تكاثره في الجزيرة العربية.





درة هندية مطوقة

Psittacula krameri


الدرّة الهنديّة المطوقة من طيور القفص المحبّة، وساهم استيراد هذا الطائر بأعداد هائلة من الهند إلى الجزيرة العربيّة إلى تزايد أعداده في المناطق الساحليّة من الخليج العربيّ.

تفضل الدرّة الهنديّة المطوقة المناطق الحضريّة ذات الحدائق والمنتزهات، وبساتين النخيل، والمزارع المروية. وقد ساعدها إهمال محاصيل النخل في الأونة الأخيرة على تكاثرها في المنطقة الشرقيّة.

يمثل هذا الطائر آفة تهدد المحاصيل الزراعيّة، وقد يعيش في مختلف الشقوق الطبيعيّة أو الاصطناعيّة.

درة برقوية الرأس

Psittacula cyanocephala



شوهت الدرّة البرقويّة الرأس أول مرة في شبه الجزيرة العربيّة قرب صحار في سلطنة عمان ومن ثم في دبيّ.

تتحرى الموائل ذات الأشجار الناضجة لتعيش فيها، وتقتات بفاكهتها مثل الحدائق والمنتزهات وملاعب الفولف.

تحتاج الدرّة البرقويّة الرأس إلى وجود بُع مائيّة، بالإضافة إلى اعتمادها على

الإنسان، ولا تستطيع العيش بعيداً عن المدن والحدائق.

الوقواق

Cuculidae

طيور متوسطة الحجم، طويلة الساق، ذات ذيل طويل الريش، تميل إلى الانزواء بالرغم من تغريدها العالي. وتستأثر الجزيرة العربية بتسعة أنواع منها، ثلاثة منها متكاثرة، فضلا عن احتمال تكاثر نوعين آخرين. وتعد جميع أنواع طيور الوقواق في الجزيرة العربية من الطيور التي تمارس التطفل في الحضنة، باستثناء الكوكال.

الوقواق الراهب

Clamator jacobinus



طائر مهاجر نادر الوجود في جنوب الجزيرة العربية، ويقصد الموائل الجافة في الجنوب الغربي منها، وأشجار السنط (الأكاسيا) وسفوح الجبال، والأودية الشديدة الانحدار ذات الأشجار والشجيرات المبعثرة.

يقتات بالخنافس والكائنات غير الفقارية، وكذلك بالمواد النباتية واليسروع.

وقواق كلاس



Chrysococcyx klaas

طائر نادر يتكاثر بأعداد محدودة صيفاً في المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية وقبالة شرق عدن.

يُقبل هذا الطائر على الغابات والمناطق ذات البيئة النباتية الكثيفة، من سفوح الجبال وتهيمة، ويقتات في إفريقيا باليسروع والفرشات والبق والخنافس.

يتطفل وقواق كلاس على الأنواع الأخرى من الطيور عند حضانه بيضه، فيضع بيضة واحدة في كل عش مضيف، وعندما يفقس بيضه يطرد بيض وفراخ الطائر المضيف خارج العش.

وقواق ديدريك




Chrysococcyx caprius

يزور وقواق ديدريك منطقتين في جنوب شبه الجزيرة العربية صيفاً: سفوح ومرتفعات الجبال في المملكة في أقصى جنوبها وغرب اليمن، ومنطقة المهرة في أقصى شرق اليمن وظفار.

يرد قرب الأودية المشجرة، ويعد طائراً طفيلياً في حضانه فراخه، إذ سُجل تطفله على نساج روبل، وشوهدت طيور النساج تطعم فراخ وقواق ديدريك بل إن طيور النساج البالغة بقيت ترعى فراخ وقواق ديدريك حتى بعد مغادرتها عش المضيف.

وقواق أو كوكال أبيض الحاجب

Centropus superciliosus



يعد من الطيور غير المهاجرة النادرة في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية، سُجل وجوده في جُزر فرسان، والكبير، وسقطرى.

يؤثر الموطن القريبة من الماء أو الرطبة ذات البيئة النباتية

الكثيفة، كأحواض القصب والشجيرات الكثيفة قرب الجداول والمحاصيل المزروعة المرتفعة مثل مزارع الموز وبساتين النخيل.

يقتات هذا الطائر بالجنادب والصراصير والخنافس وغيرها من الحشرات. ويتولى الذكر حضانة البيض وإطعام الفراخ.


طيور بوم الحظيرة

Tytonidae

تتميز طيور بوم الحظيرة برأسها العريض الذي على شكل قلب، وهي طيور طويلة الساق، قوية القدمين، منها خمسة عشر نوعا في معظم أرجاء النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وشمال أمريكا، وأوروبا، إلا أنها غائبة عن معظم القارة الآسيوية. عدا نوعا واحدا منها يوجد في الجزيرة العربية.

بومة المخازن

Tyto alba



بومة المخازن متوطنة بأعداد قليلة في جميع دول الجزيرة العربية، وتعد نذير شؤم عند العرب. تفضل مجاورة المناطق السكانية التي تتوافر فيها فرائسها من الثدييات، كما تقطن المناطق المجاورة للقرى، حيث تجد طعامها بين المحاصيل والنفايات.

توجد في جميع الارتفاعات، ولا ينافسها أي طائر ليلي. تقتات بشتى أنواع الحيوانات بما في ذلك القوارض، وتخدم الزراعة، إذ تقوم بالقضاء على القوارض في المناطق الزراعية، وتفضل التعشيش في مختلف المواطن المتوارية كشقوق المباني القديمة أو المهجورة.


طيور البوم

Strigidae

البومة النموذجية طائر عريض الرأس، قصير العنق، واسع العينين الموجهتين إلى الأمام، والمطوقتين بحلقات من الريش، فضلا عن جناحين قصيرين واسعين، ومستديرين في الغالب، وذيل قصير الريش، ومنقار قوي معقوف رغم قصره. كما أن طيور البوم طيور ليلية مفترسة متميزة في تمويهها، يصل تعدادها إلى ١٨٠ نوعا، عشرة أنواع منها معروفة في الجزيرة العربية، والمتكاثر منها سبعة أنواع.

ثبج مخطط

Otus brucei



تتوزع طيور الثبج المخطط في النطاق الممتد من سيناء وشبه الجزيرة العربية، ومنها ما يعد من الطيور المهاجرة، التي تحط في الجزء الغربي والشرقي من الجزيرة العربية.

يمتاز هذا الطائر بصيحاته المميزة التي يطلقها بعد حلول الظلام، والشبيهة بصوت مضخة بئر بعيدة، ولاسيما في فصل الربيع.

يقطن الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ويقطن بالخفافس والعتث وغيرها من الحشرات. ويقترن الزوجان مدى العمر.



الثبج الإفريقي

Otus senegalensis

يتوطن الثبج الإفريقي في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية في المرتفعات الغربية من المملكة، مروراً باليمن، وشرقاً في ظفار.

يتفاوت موثله بين أشجار السَّنط (الأكاسيا) الجافة شرق اليمن وفي ظفار، والمنحدرات المشجرة في سفوح الجبال الغربية، وغابات العرعر في جبل السواء.

سُجل وجوده قرب الماء العذب، ويُعرف في إفريقيا بأكله الثدييات الصغيرة التي يصيدها بالإغارة عليها من مجثمه أو بالبحث عنها على الأرض.

ثبج مخطط سوقطري

Otus socotranus

يُعرف بثبج جزيرة سقطرى، وهو طائر غير منتشر، وتجتمع منه أعداد كبيرة في بضعة مواطن محدودة. يفضل المناطق والأودية المحفوفة بالأشجار، ولا سيما الكثيفة بأشجار النخيل. ويقتات بالخنافس والسحالي والجنادب وزيز الحصاد والحريش. ولا تتوافر معلومات عن مقر تعشيشه وحجم حضنته وعددها أو دور الزوجين في الحضانة ورعاية الفراخ.



بومة نسارية صحراوية

Bubo ascalaphus



البومة النسارية الصحراوية طائر مهاجر لمسافات قصيرة، وتوطن سهول ومنخفضات الجزيرة العربية، وتشكل المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة أعداداً كثيرة منها.

تنتشر في ساحل الخليج العربي من المنطقة الشرقية، وتقصد المناطق الصخرية القاحلة، وتجذب للتنوءات الصخرية والتلال النائية المحاطة بالأشجار.

تقتات بالقوارض والسحالي والكائنات غير الفقارية، متخذة فجوة بين الصخور ذات تنوء يسبقها لحماية العش من الظروف المناخية.

بومة نسارية مرقطة

Bubo africanus



توطن البومة النسارية المرقطة الأودية المشجرة في تهامة، وفي المرتفعات الجنوبية الغربية، وكثيراً ما تحوم حول مناطق التجمعات السكانية.

تقتات هذه البومة على الكائنات غير الفقارية كالخنافس والجنادب، وتقضي نهارها جائمة على الصخور أو الشجيرات وأشجار النخيل. وتبدو علاقة أزواج هذا الطائر مستقرة ودائمة مدى الحياة.



بومة بتلر


Strix butleri

تنتشر طيور بومة بتلر في تلال البحر الأحمر جنوب مصر، وفي سيناء وفلسطين والأردن ومعظم الأجزاء الغربية والوسطى والجنوبية من الجزيرة العربية.

تفضل هذه البومة المواطن ذات الصخور والأودية والمنحدرات والكهوف، وتقتات بمختلف أنواع القوارض، وعُثر على أعشاش لها في التجاويف المتأكلة في تلال الحجر الجيري وفي بعض القمم المهجورة في الجبال الجنوبية الغربية.

بومة صغيرة

Athene noctua



تقطن البومة الصغيرة أرجاء البوادي العربية، وتعد من الطيور غير المهاجرة المتوطنة في جميع دول الجزيرة العربية باستثناء البحرين. ترد أعداد متواضعة منها المرتفعات الجنوبية الغربية، ويوجد بعض منها في جزيرة فرسان، كما تقصد المناطق الصخرية والمساحات المشجرة الواسعة، وتقضي يومها في تجاويف الصخور والأشجار، وتتخذ أطلال المباني والسيارات المهجورة، والمعدات التي لم تعد صالحة للاستخدام مجتماً لها، ولا تقوم بالصيد نهاراً.

طيور السبد

Caprimulgidae

طيور ليلية آكلة للحشرات أثناء طيرانها، واسعة العينين، ذات منقار عريض الشق رغم صغره، وكثيرا ما يكون محاطا بالهَلْب. ومن خلال ريشها المجهول تستطيع المكوث على الأرض، أو على أي غصن دون حراك، ويمكن ملاحظة اللون الأبيض في جناحيها وريش ذيلها أثناء طيرانها. وتمتاز برأس عريض، وعنق وساق قصيرين، وانتشارها يشمل العالم أجمع، ما عدا المناطق القطبية. ويصل تعدادها إلى تسعة وثمانين نوعا، ستة أنواع منها تجوب الجزيرة العربية، وثلاثة أنواع أخرى متكاثرة في الجزء الجنوبي الغربي ذات موائل متباينة.

سبد نوبي


Caprimulgus nubicus



يوجد السبد النوبي في تهامة، حيث الرمال ذات الأعشاب والشجيرات المتفرقة. وتقبل هذه الطيور على بر الجزيرة العربية في مختلف الموائل الرملية والحجرية الصحراوية في المنخفضات،

وسفوح الجبال التي تتخللها بعض النباتات.

وهو من الطيور الليلية التي تطير مع حلول الظلام بدلاً من الغسق كطيور السبد الأخرى. ويقنط على الجراد. ولا يضع إلا بيضة أو بيضتين على التربة مباشرة دون عش.



سبد الجبال

Caprimulgus poliocephalus

رُصد سبد الجبال في سفوح الجبال والمرتفعات الجنوبية الغربية من جبل بورا في اليمن، وشمالاً حتى الشفاء قرب الطائف بالمملكة.

يقطن هذا الطائر جرف الريدة في اليمن، حيث غابات العرعر ذات المنحدرات الصخرية، أما شمال نطاقه فيسكن المناطق المفتوحة ذات المنحدرات الصخرية، والبيئة النباتية المتناثرة، وبقايا أشجار العرعر.

يقتات بالخنافس والجنادب والبعث، فضلاً عن قيامه بالتقاط الحشرات التي تتجمع عند الأنوار والمصابيح، ويتعاون الزوجان في حضانة الفراخ.



سبد السهول

Caprimulgus inornatus

يحل سبد السهول ضيفاً على الجزيرة العربية ليتكاثر فيها. وهو من الطيور الرملية الرمادية اللون، المائلة

للحمرة، ومن الطيور الليلية التي تحط صيفاً في المنطقة الجنوبية الغربية.

يفضل التلال الصخرية وقممها التي تتناثر فيها بعض أشجار السَّنَط (الأكاسيا) وغيرها. كما يُقبل على المدرجات الزراعية، وشجيرات العرعر في عسير، ويقتات بمختلف الحشرات. ويُسمع طنين سبد السهول لحظة وصوله إلى المنطقة من بعد غروب الشمس، ولوهلة قصيرة قبل الفجر.

طيور السمامة

Apodidae

طيور ذات ريش يتعذر وصفها، ومظهر جانبي مميز أثناء تحليقها، يبرز فيه جناحان طويلان رشيقان نحيلان، وريش ذيل، ورأس، وعنق قصير. تمتاز بالسرعة والقدرة على الطيران باستمرار، ولها ساق وقدمان قويتان رغم صغرهما، ومناقير صغيرة عريضة الفرجة. ويوجد في الجزيرة العربية عشرة من إجمالي أربعة وتسعين نوعاً من طيور السمامة في العالم، منها خمسة أنواع متكاثرة.



سمامة النخيل

Cypsiurus parvus

سمامة النخيل من الطيور المتوطنة في جنوب غرب الجزيرة العربية، وتتوزع في الجزيرة العربية بتوزيع نخيل الدوم المتوافرة في تهامة وفي بعض الأودية الواسعة، إذ يرجح أنها مواطن ملائمة لتعشيش هذا الطائر العربي وربما جثمه أيضاً.

يتغذى هذا الطائر بشتى أنواع الحشرات الطائرة، وعُثر له على عش في أبي عريش محتويًا على

بطانة من الريش والنباتات اللصقة بمادة لعابية بسعف أفقي، وحافة صغيرة حملت بيضتين ملتصقتين باللعاب.

سمامة الصرود

Tachymarptis melba


سمامة الصرود طائر مهاجر من زوار الجزيرة العربية المتكاثرة في المرتفعات الجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى منها، ويتوزع كذلك في سائر أرجائها.

يلتقط هذا الطائر البارع فرائسه أثناء طيرانه، وله نمط غريب في الطيران أثناء صيده ليلاً، ويقتات بالكائنات غير الفقارية الطائرة، وكثيراً ما يعيش في المباني والمنازل القديمة.

السمامة الشاحبة

Apus pallidus

تتكاثر معظم طيور السمامة الشاحبة الموجودة في الأجزاء الوسطى والغربية والشمالية من الجزيرة العربية صيفاً، كما ثبت تكاثرها بأعداد محدودة في بعض مناطق الخليج العربي.



يمضي هذا الطائر نهاره طائراً، ويقتات بالكائنات غير الفقارية الصغيرة الطائرة، ويقصد البرك وأهوار الصرف الصحي، ومحاصيل الري المحوري، والسبخات الساحلية، وفوق البحر. يعيش هذا الطائر في التجاويف الصخرية الطبيعية، والمواطن الاصطناعية، ويقوم الزوجان بحضانة البيض.



سمامة برليوزي

Apus berliozi

تفضل سمامة برليوزي السواحل الصخرية جنوب الجزيرة العربية، وتقتات بمختلف أنواع الكائنات غير الفقارية كالخنافس الصغيرة السوداء والحشرات الخضراء.

تعشش سمامة برليوزي في صدوع المنحدرات وشقوقها، وتبدو الأعشاش التي وجدت لها أشبه ما تكون بطبق أو بطانة ذات كوب داخلي وحيد وركام من الأعشاب البحرية الجافة.

سمامة صغيرة

Apus affinis

تتكاثر السمامة الصغيرة في الجزيرة العربية، وتقل أعدادها في الجزء الجنوبي الغربي منها.



تتكاثر في سفوح الجبال

والمرتفعات في تهامة، وتصل أعدادها إلى الذروة في منطقة الخليج العربي في شهر مارس.

تبني السمامة الصغيرة عشها في تجاويف الصخور والمباني. ويتعاون الزوجان في بناء العش وحضانة الفراخ ورعايتها.

طيور الشقراق

Coraciidae

من طيور العالم القديم الملونة، تغطي على ريشها درجات متفاوتة من اللون الأزرق، وتتشابه الذكور والإناث فيما بينهم. قصيرة العنق والساق، ذات جناحين طويلين، ولدى بعضها ذيل طويل الريش متحور، ومنقار قوي معقوف الطيرف. تتكاثر ثلاثة أنواع منها في الجزيرة العربية، فضلا عن نوع أو نوعين آخرين يزوران أحيانا الجزء الجنوبي الغربي قادمين من إفريقيا.



غراب زيتوني هندي

Coracias benghalensis

الغراب الزيتوني الهندي من الطيور المتوطنة في شرق الجزيرة العربية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

يصيد هذا الطائر العربي فريسته كالجراد أو يرقات العث بالانقضاض عليها من مرصده، ويتوخى للتعشيش تجويفا في شجرة أو نتوءات صخرية أو مبنى.



غراب زيتوني حبشي

Coracias abyssinicus

يعد من الطيور الجميلة الشائعة المتوطنة في المنخفضات الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية.

يقصد الأراضي الخصبة المزروعة والحدائق المجاورة لقرى تهامة ذات الأشجار والشجيرات. وفرائسه من الجراد ومختلف الحشرات الكبيرة الأخرى.

لا توجد معلومات عن تكاثره في الجزيرة العربية، إلا أنه يُعرف في إفريقيا بأنه أحادي الزوج.

غراب زيتوني أوروبي

Coracias garrulus




طائر مهاجر يمر بالجزيرة العربية بانتظام في فصلي الربيع والخريف، وسُجل أول تكاثر له في الإمارات العربية المتحدة. ويعد من الطيور المهددة بالانقراض.

يقصد هذا الطائر المناطق المشجرة التي تميل إلى الجفاف، والأراضي الزراعية والحدائق.

ويتوقع تنامي أعداده مع اتساع نطاق الزراعة في الأجزاء الوسطى والشمالية والغربية من الجزيرة العربية.

صيّاد السمك أبيض الصدر

Halcyon smyrnensis



صيّاد السمك الأبيض الصدر زائر شتوي نادر للمناطق الشمالية والشرقية بالجزيرة العربية، وتتوطن أعداد قليلة منه في مزارع النخيل بالكويت.

يتردد هذا الطائر صيفاً على المنطقة الشرقية حتى تزايدت أعداده في مناطق ساحل الخليج العربي. يقات بالكائنات غير الفقارية الصغيرة التي يباغتها على الأرض أو من فوقها.

معظم جحور هذا الطائر حفرت بعمق متر واحد إلى مترين في ركام من التربة تكاد تكون رأسية.

صيّاد السمك الرمادي الرأس

Halcyon leucocephala



ينتشر صيّد السمك الرمادي الرأس في سفوح الجبال والمرتفعات الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية.

يعد من طيور الشجيرات الكثيفة، وشجيرات السَّنَط (الأكاسيا)، وأطراف الغابات، والمناطق الزراعية. وكثيراً ما يتردد على الجداول الدائمة والسبخات.

يقات هذا الطائر على الجنادب وغيرها من الحشرات والسمك، أما تعشيشه ففي الجحور المألوفة له.

صياد السمك الأبيض الطوق

Todiramphus chloris



توجد أعداد قليلة من طيور صياد السمك الأبيض الطوق في الإمارات العربية المتحدة، والساحل الشرقي من البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، ويعد من الطيور المهدة بالانقراض في الجزيرة العربية.

يقصد هذا الطائر أشجار المنغروف السوداء الساحلية الناضجة للتعشيش ووفرة الطعام. ويقتات بالسلطعون. ورُصد له عش مرتفع عن سطح الأرض في تجويف شجري، وأعشاشه في معظمها شبه أفقية وغير مبطنة.

صياد السمك المتوج

Alcedo cristata



يعد صياد السمك المتوج متوطناً في إفريقيا وربما في شبه الجزيرة العربية. وهو طائر مترحل يقصد جنوب الجزيرة العربية ليتكاثر فيها. وُجد هذا الطائر في وادي

هاجر الواسع الذي تحفه أشجار المسكيت، وعند أحواض القصب، وأشجار نخيل التمر القريبة من جداول المياه العذبة شبه الدائمة ذات النباتات العائمة. يحفر نفقاً في ركام الأرض أو في الضفاف أو في جحر أرضي للتعشيش على مقربة من الماء.


طيور الوروار

Meropidae

من طيور العالم القديم ذات الألوان الخلابية التي تطفئ عليها درجات اللون الأخضر، وتتميز بمنقارها الطويل الرفيع، المضغوط من الجانبين، المستدق، السفلي الانحناء، فضلاً عن جناحين، وذيل مستدق طويل الريش. ويتشابه كل من الذكر والأنثى. وكثيراً ما يقبع هذا الطائر على مجثم بارز، ويتقدم لمباغثة الحشرات الطائرة، مثل النحل. وتتكاثر العديد من طيور الوروار بشكل جماعي. وقد وُجد في الجزيرة العربية خمسة أنواع من إجمالي خمسة وعشرين نوعاً من الوروار في العالم، أربعة منها متكاثرة.

وروار أبيض الزور

Merops albicollis



يحط طائر الوروار الأبيض الزور في المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية صيفاً للتكاثر.

يقطن هذا الطائر في موائل شتى من مساحات شجيرات السنت (الأكاسيا) الجافة إلى الأودية والمناطق المزروعة ذات الأشجار المنفرقة حتى ضواحي القرى.

يقتات الوروار الأبيض الزور بالعديد من الحشرات الطائرة والجنادب والفراشات. ويمارس أسلوباً تعاونياً عند التكاثر، إذ يجتمع خمسة مساعدين عند العش الواحد.



وروار شرقي صغير

Merops orientalis

يعد الطائر العربي الوحيد من طيور الوروار المتوطن في الجزيرة العربية، ويقصد الأودية الصخرية حيث تنمو شجيرات السَّنَط (الأكاسيا) المتفرقة، والسهول الساحلية والحدائق والجبال الخضراء.

يتغذى هذا الوروار أثناء جولاته الهوائية القصيرة التي يطبق فيها على فريسته. ويحفر لعشه نفقاً

أفقياً في ضفاف أو ركام الرمل أو الطين أو التربة المتماسكة، ولا يعيد استخدام العش ذاته.


وروار أزرق الخد

Merops persicus

تمر طيور الوروار ذات الخدود الزرقاء بمختلف أرجاء شبه الجزيرة العربية أثناء هجرتها ليلاً.

يجوب هذا الطائر شرق الجزيرة العربية عدة أسابيع قبل الهجرة، ويتردد على جُزر داس في الخليج العربي. ويتناول كمّاً من الفرائس الطائرة وحشرات النباتات والخنافس.

جحور أعشاشه تكون على أسطح منبسطة ذات ركيزة رملية متماسكة، وعلى بعض الشجيرات المتفرقة أو على المنحدرات السطحية.



وروار أوروبي

Merops apiaster



يمر طائر الوروار الأوروبي بجميع الدول العربية، وهو طائر مهاجر ومنتشر في الخليج العربي، وكثيرا ما يعيش في وئام مع طائر الوروار الأزرق الخد.

يتكاثر هذا الطائر في مناطق جافة، وجميع أعشاشه على شكل أسطح رأسية من الرمل أو التربة، ويمكن له استخدام موطن التعشيش والحجر

ذاته عاما بعد عام. ويستغرق في تجهيز عشه من ١٠ إلى ٢٠ يوماً!

الهدهد

Upupidae

ينتمي الهدهد لعائلة من نوع واحد من الطيور، ويتميز بعرفه الرائع المنتصب، البرتقالي اللون، المهذب باللون الأسود، وريشه الأبيض والأصفر والبرتقالي، ومنقاره الطويل الرفيع، المنحني سفليا، وجناحيه العريضين المستديرين، وساقيه القصيرتين القويتين. ويتعذر تمييز الذكر عن الأنثى.

الهدهد

Upupa epops



يتمتع الهدهد بمكانة خاصة في الثقافة العربية نظرا لذكوره في القرآن الكريم، وهو طائر مهاجر يمر بالجزيرة العربية صيفا للتكاثر في الأجزاء الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتعد المرتفعات الغربية القريبة من الطائف مركزا لتكاثره.

يتقرب من طعامه على الأرض مستخدما منقاره لإخراج الكائنات غير الفقارية ويرقاتها من تحت التربة. ويتخذ أي تجويف مناسب للتعشيش، وتقوم الأنثى وحدها بحضانة البيض بينما يتولى الذكر جمع الطعام.

البوقير

Bucerotidae

من طيور العالم القديم التي تقطن المناطق المدارية الإفريقية والهندية والإندونيسية. ولم يرد في الجزيرة العربية سوى نوع واحد من الخمسين نوعاً التي خلقها الله عز وجل. معظم طيور البوقير ذات منقار عريض منحن، وخوذة تتوج قبتها في أغلب الأحيان، وجناحين مستديرين قويين، وذيل طويل الريش، وساق قصيرة، وقدمين عريضتين.

البوقير الإفريقي الرمادي

Tockus nasutus



يوجد البوقير الإفريقي الرمادي في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ويعد طائر المناطق المشجرة، وخاصة الأودية ومنحدرات التلال الخضراء ذات الشجيرات والنباتات الثرية بالأوراق.

يقتات بالمواد النباتية والحيوانية معاً، ويفضل التعشيش في الأشجار القديمة ذات التجاويف. ويُعرف عن ذكر البوقير قيامه ببناء جدار من الطين ذي نافذة

صغيرة يمرر من خلالها الطعام لزوجته التي تحتضن البيض، ومن ثم لفراخه القابعين وراء الجدار.

ناقر الخشب

Picidae

تتوزع طيور ناقر الخشب في أنحاء العالم، ما عدا استراليا ومدغشقر، وقد فطرها الله عز وجل على التكيف مع طبيعة الأشجار، فأبدع لها أربعة مخالب، وريش ذيل قويا، يُمكنه من التحرك بشكل رأسي على الأشجار، ومنقارا قويا مستقيما لنحت الخشب، ولسانا طويلا لاستخراج الطعام من الحفر والتجاويف. وهي طيور عريضة الرأس، قوية العنق، مستديرة الجناحين. وثمة مئتا نوع من هذه الطيور، يوجد نوعان منها في الجزيرة العربية، أحدهما متوطن، والآخر مهاجر.

ناقر الخشب العربي

Dendrocopos dorae



يعد ناقر الخشب العربي أكثر الطيور العربية المستوطنة انتشارا. وصُنّف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض نظرا لأعداده المحدودة.

يقطن هذا الطائر في مختلف الموائل المشجرة، وشجيرات منطقة تهامة. ويقتات

بالدويدات التي تعيش على خشب الأشجار، وقد يتغذى جاثماً أو مُعلّقاً رأساً على عقب.

يقوم الذكر وحده بحفر العش، فيحفر في الخشب الحي والمقطع للتعشيش والجنثم.

صرد الشجيرات

Malaconotidae

من الطيور المفترسة المتسللة ذات المنقار المعقوف التي تقطن بالكائنات غير الفقارية والزواحف الصغيرة، وثمة نوع واحد فقط منها في جنوب الجزيرة العربية.

الصرد أسود الرأس

Thagra senegala



الصرد الأسود الرأس طائر متوطن أينما وجد في الجزيرة العربية، يقصد المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، والأشجار المتشابكة، والمنحدرات والأودية المدغلة.

يمضي وقته على الأرض بحثاً عن فريسة يلتهمها بين أوراق الشجر أو في شقوق الصخور والشجيرات. ويبني عشه على

شكل اسطواني ضيق منسوج من الأعشاب وبعض الغصينات الرفيعة وأنسجة العناكب المبطننة بألياف نباتية رفيعة. ويشترك الزوجان في بناء العش وحضانة البيض ورعاية الفراخ.

طيور الصرد

Laniidae


عائلة من الطيور المغردة المتوسطة الحجم، ذات رأس عريض نسبياً، ومنتقار معقوف مسنن، وريش أدكن اللون، وسلوك ضار. وتعد من طيور العالم القديم التي تقطن المساحات المفتوحة. ظهر عشرة أنواع منها في الجزيرة العربية (من أصل ٢٦ نوعاً)، المتكاثر منها أربعة أنواع فقط.

الصرد محمر الذنب

Lanius isabellinus

طائر مهاجر ومنتشر في ربيع وخريف الجزيرة العربية، ويأتي إليها بأعداد قليلة شتاءً وخصوصاً في النصف الجنوبي منها.

يفضل هذا الطائر الجثم على الأغصان الطرفية من الشجيرات، والانتقاض على فريسته أرضاً، كما ينقب عن طعامه بين النباتات أو قد يلتقطها في الهواء. ويتميز موسم التكاثر بتغريد هذه الطيور، وإطعام الذكور للإناث.





الصرد كستنائي الظهر

Lanius vittatus

ينحصر وجود هذا الطائر بأعداد قليلة في شمال الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وغرب قطر، ويتغذى ويصطاد طعامه كطائر الصرد المحمر الذنب.

يتعاون الذكر والأنثى في بناء العش، وقد يرقد الذكر مدداً وجيزة على العش، علماً أن الأنثى هي من يتولى الحضانة، بينما يؤمن الذكر لها الطعام.

صرد رمادي شرقي كبير

Lanius meridionalis



يتكاثر طائر الصرد الرمادي الشرقي الكبير في معظم أجزاء المملكة باستثناء شمالها والربع الخالي، ويعد من الأنواع المتكاثرة الشائعة في جزيرة سقطرى.

لوحظ ارتباط نطاق تكاثر هذا الطائر بمناطق وجود أشجار السنط (الأكاسيا) وتفريده في أوائل الربيع يكون مميزاً.

عشه هيكل مبعر من الأعواد والغصينات والأعشاب المبطنة بمواد أكثر نعومة. وتتولى الأنثى بناء العش والحضانة.

الصدر محمر القنة

Lanius senator




الصدر المحمر القنة طائر مهاجر يمر بالجزيرة العربية، ويتردد على الرياض وتبوك وجدة، وينتشر في دول الخليج العربية التي يزورها.

يحط هذا الطائر عند أي شجيرة ما، مفضلاً مواطن النفايات المفتوحة والحدائق. ويقبل للتكاثر على الغابات والبساطين والحدائق المجاورة للمروج. ويتغذى على الكائنات غير فقارية، فينقض عليها أو يتسلل إليها أرضاً أو يتناولها أثناء طيرانه، ويعد من الطيور المنزوية.

الطيور الصافرة

Orioles

طيور زاهية الألوان، يطفئ اللون الأصفر عليها غالباً، ويميل الجناحان وريش الذيل إلى السواد. وهي طيور عريضة مستدقة المنقار، ذات ساق قصيرة مكنزة، يتشابه في معظم أنواعها الذكر والأنثى. وهي طيور شجرية، ورد نوع واحد منها مهاجراً إلى الجزيرة العربية، من أصل تسعة وعشرين نوعاً من طيور العالم القديم هذه.



صفير ذهبي

Oriolus oriolus

الصفير الذهبي طائر مهاجر نادر، وتزايد أعداده في فصل الربيع في وسط وشمال الجزيرة العربية والخليج العربي.

يقصد هذا الطائر المناطق ذات النباتات الكثيفة والأشجار الباسقة، ويبحث عن طعامه في الأغصان العالية أو من مختلف الحشرات الأرضية.

يبنى الصفير الذهبي عشه على الفروع العالية، ويتميز بشكله الأقرب إلى الأرجوحة الشبكية المعلقة بين غصنين متفرعين، ويتعاون الزوجان على بناء العش ورعاية الفراخ.

خطاف الذباب الفردوسي

Monarchidae

تضم عائلة طيور العالم القديم هذه ما يناهز الثمانين نوعاً، ينحصر العديد منها في جزر أو مجموعات من الجزر في المحيط الهادي، وقد ميزها الخالق عز وجل بمتقارها المنبسط ذي القاعدة العريضة، والشعيرات النامية عند فتحة فمها، يتوطن نوع واحد منها في الجزيرة العربية.

خاطف الذباب الإفريقي الفردوسي

Terpsiphone viridis



خاطف الذباب الإفريقي الفردوسي طائر مهاجر وشائع جنوب غرب المملكة، وفي سفوح الجبال والمرتفعات الغربية اليمنية.

يقصد الطائر مواطن الشجيرات الكثيفة، والغابات المتنوعة على التلال، والأودية العميقة المفعمة بالحياة النباتية. كما يقطن المواطن المحمية الزراعية مثل مزارع القهوة والحدائق والمنتزهات.

يتغذى على مختلف أنواع الحشرات، ويشترك الزوجان في بناء العش وحضانة الفراخ وإطعامها.

الغراب

Corvidae

من طيور الجواثم الكبيرة التي تمتد إلى جميع القارات، معظمها سوداء اللون، أو ذات ريش يطفى عليه اللون الأسود، يتشابه منها الذكور والإناث. تمتاز بمناقيرها القوية، والسيقان العريضة، وتتغذى بالذكاء والجرأة والفضول، وتقتات على النفايات.

العقّق

Pica pica



العقّق طائرٌ خَجَلٌ غير مهاجر يوجد بأعداد قليلة في مرتفعات عسير بالمملكة. ويتكاثر في جبل قها وفي مناطق يتعذر الوصول إليها. يُعرف بأنه طائر غابات العرعر في منحدرات جبال عسير الجنوبية، وكذلك قرب المناطق الزراعية.

يقتات بشتى أنواع الحيوانات غير الفقارية وبالجيف وبالحبوب المنفلقة وبذور اللبية والفضلات المنزلية، وينعق هذا الطائر باستمرار وهو يطوف بحثًا عن طعامه، ويبني عشا متينا مقببا.



الغراب الدوري

Corvus splendens

دخلت طيور الغراب الدوري إلى منطقة الخليج العربي عبر السفن، وتوطن أعداد كبيرة منه ساحل البحر الأحمر.

يقتات الطائر بالنباتات وفضلات الطعام البشري، ونهب أعشاش الطيور وبالمحاصيل، وتنامت أعداده بصورة حدت ببعض الدول إلى محاربهته والحد من تكاثره الضار. يعيش بالقرب من بعض الأنواع الأخرى من الطيور، وتبقى أزواج هذا الطائر معاً مدى الحياة.

غراب بني العنق

Corvus ruficollis




يعد الغراب البني العنق من الأنواع المنتشرة المتوطنة في مختلف الموائل في الجزيرة العربية.

يقتات على الجيف والكائنات غير الفقارية فضلاً عن

سرقته لبيض الطيور الأخرى وصغارها.

يلازم هذا الغراب حيوانات الماشية للتنقيب عن الطفيليات. ويتخذ الهياكل المعمارية القريبة من الطرقات مواطن لبناء عشه أو على قمم الأشجار.



غراب مروحي الذنب

Corvus rhipidurus

يتوطن الغراب المروحي الذنب المرتفعات والمناطق الصخرية في غرب الجزيرة العربية، ويحوم قرب المناطق الحضرية، ولا يطيق الابتعاد كثيراً عن المنحدرات.

يقتات هذا الغراب على المواد النباتية والحيوانية والقمامة. ويضع عشه على المنحدرات أو الحفر والتجاويف الصخرية.


طيور السنونو والخطاف

Hirundinidae

يوجد ما يناهز الثمانين نوعاً من طيور السنونو في العالم، التي عادة ما تكون طيوراً ذات منقار قصير منبسط، عريض الفجوة، وعنق قصير، وساق قصيرة وصغيرة، وأقدام ضعيفة. وهي طيور كثيراً ما تكون مبهجة، رشيقة في طيرانها، ذات جناحين طويلين مستدقين، وريش ذيل مشقوق. وهي طيور سربية في الكثير من الأحيان، تقتات أسراباً بالحشرات الطائرة. كما تجثم وتحط على الأرض لتستريح، أو تجمع مواد لبناء أعشاشها. وقد ورد في الجزيرة العربية أربعة عشر نوعاً منها، ثبت تكاثر نوعين منها، كما يتكاثر نوعان آخران منها بين الحين والآخر.

خطاف الصخور الشاحب اللون

Ptyonoprogne obsoleta



يقطن خطاف الصخور الشاحب اللون معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، ويتكاثر قرب الصخور والكهوف والمنحدرات.


يرتاد هذا الطائر المواطن المليئة بالحشرات الطائرة كالأراضي الرطبة، ومسالك

مياه الصرف الصحي. ويبني أعشاشاً مقعرة معلقة بأسطح رأسيه عند أحد الجانبين، من الأسمت أو الحديد، مثل الدعائم والحواف.

يتقاسم الزوجان بناء العش والحضانة ورعاية الفراخ.

سنونو أحمر العجز

Cecropis daurica



طائر زائر منتشر بأعداد كثيرة في المرتفعات الجنوبية الغربية جنوب الطائف، ويعبر مهاجرا جميع دول الجزيرة العربية.

يقصد المناطق الصخرية قرب الماء، ويتغذى بالحشرات، ويعيش في ارتفاعات تهامة أو تحت الصخور أو على الأسطح الاسمنتية والمنشآت القديمة، حيث يبني من كتل الطين عشا على شكل قارورة ذات عنق طويل تخفي محتواها.


طيور القبرة

Larks Alaudidae

تضم هذه العائلة تسعين نوعاً من طيور العالم القديم، يستوطن نوع واحد منها في أمريكا وأستراليا. وتعد من آكلات البذور التي تلتقطها من الأرض، كما تفضل المناطق القاحلة المفتوحة. وقد عُرف عنها أنها من الطيور المغردة أثناء طيرانها، كما يكثر انتشارها في البادية، وهناك أكثر من نوع يتكاثر في أنحاء شبه الجزيرة العربية، حيث رُصد سبعة عشر نوعاً منها في الجزيرة العربية، منها ثلاثة عشر نوعاً يتكاثر في المنطقة.

قبرة الشجر المغنية

Mirafra cantillans




توجد قبرة الشجر المغنية على مدار العام في سهول تهامة في أقصى جنوب غرب المملكة، وتقتصد حقول العلف المروية وبخاصة المجاورة لمنطقة صلالة، فضلاً عن المرتفعات المعشبة وقمم التلال والمناطق الصخرية ذات البيئة النباتية المحدودة أحياناً.

تقتات قبرة الشجر المغنية على الكائنات غير الفقارية

والبذور، وتصدح بتغريدها طوال أيام الربيع، وتبني عشها على الأرض.

قبرة هدهدية




Alaemon alaudipes

تنتشر القبرة الهدهدية في السهول الصحراوية في جميع دول الجزيرة العربية، ويرجع أنها الطائر الوحيد المنتشر في أرجاء الربع الخالي.

تسخر هذه القبرة منقارها الطويل لنبش التربة أو الرمال بحثاً عن الغذاء، وتبني أعشاشها مرتفعة عن الأرض، في ظل شجرة أو نبتة مجاورة لها، ويتعاون الزوجان في حضانة البيض ورعاية الفراخ.

قبرة سميكة المنقار

Ramphocoris clotbey




طائر نادر وحذر يقطن السهول المكشوفة من الأجزاء الوسطى والشمالية من الجزيرة العربية شتاءً.

وجدت هذه القبرة عند مزارع حرص في المنطقة الشرقية من المملكة، وكثيراً ما تتراد المزارع ومرايع الخيام في الصحراء بحثاً عن الحبوب والبدور.

تبني عشاً مقعراً ومبطناً بالعشب أو الريش، وصفاً من الحصى في أطراف العش. ويتعاون الزوجان في حضانة الفراخ.

قبرة شرقية صغيرة




Melanocorypha bimaculata

تعد طيور القبرة الشرقية الصغيرة من الطيور الزائرة المنتشرة أحيانا بأعداد كبيرة في فصل الشتاء في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية. وتوطن السهوب الصحراوية، والمناطق الزراعية التي تلجأ إليها شتاءً.

تقصد المزارع، وتقتات على مختلف الكائنات غير الفقارية وبذور الأعشاب. وتكاثرها يكون في مواسم الأمطار الغزيرة حين تخضّر الصحاري.

قبرة الصحراء الموشمة الذنب



Ammomanes cinctura

توجد قبرة الصحراء الموشمة الذنب في السهول الممتدة من جنوب سلطنة عمان حتى شمال المملكة. وتعد أكثر انتشارا في الربع الخالي وفي المنخفضات الساحلية المتاخمة للخليج العربي، وبأعداد محدودة في تهامة.

تملأ قبرة الصحراء الموشمة الذنب أرجاء سهول الجزيرة العربية تفريداً في فصل الربيع. وتضع عشها على الجانب الشمالي أو الشرقي من نبتة أو صخرة ما، مما يوفر الظل لها ولفراخها.



قبرة الصحراء


Ammomanes deserti

تنتشر قبرة الصحراء في مختلف أجزاء شبه الجزيرة العربية، وتوجد بأعداد محدودة في المناطق الصخرية من سهول شمال الجزيرة العربية وتهامة.

تعمل أزواج أو مجموعات منها على التنقيب بين الصخور والنباتات عن البذور والكائنات غير الفقارية التي تقنتت بها. وتبني أعشاشها في ظلال الصخور أو النباتات المرصوفة بالحصى.

قبرة قصيرة الأصابع

Calandrella brachydactyla




تمر القبرة القصيرة الأصابع مهاجرة بالجزيرة العربية، وتمضي شتاءها في مختلف أرجائها. وتعد من طيور السهول الصحراوية.

تقنتت على الحبوب والبذور، وترتاد برك مياه الأمطار

لتروي عطشها، وتشارك طيور القبرة الأخرى عند الغذاء.

قبرة بلنفوردي قصيرة الأصابع

Calandrella blanfordi




تعد قبرة بلنفوردي قصيرة الأصابع من طيور جبال الجزيرة العربية، وتستوطن المرتفعات الجنوبية الغربية منها.

تقطن المناطق المنبسطة ذات البيئة النباتية القليلة مثل الأراضي الزراعية المفتوحة والحقول المحروثة، فضلاً عن الهضاب الصخرية التي تتناثر فيها أشجار العرعر. وتقتات بالبذور والكائنات غير الفقارية بكثرة. وتتولى الأنثى بناء العش المكون من التربة والحصى.

قبرة قصيرة الأصابع صغيرة

Calandrella rufescens




طائر سربي زائر ومهاجر شتاءً في شمال شبه الجزيرة العربية ووسطها وشرقها. وتقطن السهول الرملية وسهول الحصى المفتوحة الخالية من الأشجار والشجيرات، كما تكثر في المناطق المزروعة، وفي

السبخات المالحة المزروعة تجاه ساحل الخليج العربي.

شوهدت هذه القبرة وهي تلتقط اليسروع لإطعام فراخها متردةً على مخازن الشعير بالقرب من ينبع بالملكة. وتبنى عشها في ظلال النباتات.

قبرة دان

Eremalauda dunni




قبرة دان من الطيور المرتحلة المتكاثرة على نطاق واسع في سهول الجزيرة العربية، وكذلك في عدد من المناطق الساحلية المتاخمة للبحر الأحمر وخليج عدن.

تفضل سهول الحصى والرمال المتماسكة المكسوة بالشجيرات والأعشاب، والنباتات السريعة الزوال. وتقتات بمختلف أنواع البذور والحشرات، وتحرض هذه القبرة عند بناء عشها على تبطينه ببعض الحصى متوخية مواقع الشجيرات الظليلة.

قبرة متوجة

Galerida cristata



القبرة المتوجة طائر متميز ومستوطن، يكاد يكون متكاثرا في المناطق السكانية من شبه الجزيرة العربية. ويعد من طيور الحدائق والمنتزهات، وأوساط المدن والقرى

والصحراء، والمزارع والمناطق المزروعة، والنفايات.

تفضل هذه القبرة محاصيل العلف عند التكاثر، وعشها حضرة صغيرة مبطنّة بالأعشاب والأعواد والجذور الصغيرة، وبعض قصاصات البلاستيك أو بعض المواد الناعمة كالصوف أو الشعر أو الريش.



قبرة سوداء الرأس


Eremopterix nigriceps

توجد طيور القبرة السوداء الرأس في الجزيرة العربية، وعلى ساحل الخليج العربي وسهول المنطقة الوسطى.

تتكيف مع الظروف البيئية المختلفة، مفضلة التربة اللينة والصلبة المغطاة بالنباتات والأعشاب، وتقتات على الحشرات واليسروع وحبوب الأرز النيّ. أما عشها فتبنيه على الأرض في قاعدة نباتية بعيدا عن حرارة الشمس المباشرة.

قبرة تمنك القرناء

Eremophila bilopha



تستوطن قبرة تمنك القرناء سهول صحراء الشمال في أقصى شمال المملكة، وتعد أكثر انتشارا في وسط الجزيرة العربية.

تقتات على البذور الصغيرة والكائنات غير الفقارية.

وعشها يكون على الجانب الشمالي من صخرة أو نبات ما في حفرة عميقة يتم تبطينه بالجذور والأعشاب الجافة وقصاصات من الورق والصوف والريش. ويتعاون الزوجان في بناء العش ورعاية الفراخ.


الهازجات

Cisticolidae – Cisticolas and allies

عائلة تضم أكثر من مئة نوع من العصافير التي تقتات بالحشرات، وتكاد تكون محصورة في القارة الإفريقية وجنوب آسيا، ومعظمها طيور صغيرة ومغردة تتوارى عن الأنظار وتميل إلى الاستيطان في البقاع ذات الشجيرات المتدنية. وتستوطن ثلاثة أنواع منها في براري الجزيرة العربية، فضلا عن وجود نوعين آخرين في جزيرة سقطرى. وكانت تعرف هذه العائلة في الماضي بهازجات العالم القديم.

هازجة مروحية الذنب

Cisticola juncidis



تستوطن الهازجة مروحية الذنب جنوب غرب المملكة، وتظهر بأعداد كبيرة في المناطق المحدودة التي تقطنها على يابسة الجزيرة العربية. تقصد المراعي والأراضي العشبية ومناطق زراعة

المحاصيل مثل السرغوم في تهامة. وتقتات بشتى أنواع الحشرات والجراد واليرقات والديدان التي تلتهمها من الأرض أو من النباتات القريبة. تتولى الأنثى بناء العش وحضانة البيض وإطعام الفراخ.



مغنية سقطرى

Cisticola haesitatus

ينحصر وجود مغنية سقطرى في جزيرة سقطرى، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض نظرا لانحصار وجودها في جزيرة سقطرى.

تُفضل مغنية سقطرى السهول الساحلية والرملية والمنخفضة

وسهول الحصى البرية ذات النباتات الملحبة.

تبنى عشها على شجيرة صغيرة قريبة من الأرض من المواد الناعمة كخيوط العنكبوت والأعشاب.



هازجة سقطرى


Incana incana

تستوطن هذه الهازجة جزيرة سقطرى، وتنتشر في المناطق الجبلية، وتقتصد المناطق المرتفعة عند التكاثر، وتتقرب عن الحشرات في الأوراق وغيرها.

لا تتوافر معلومات عن تكاثرها لكن رُصد تغريدها بين شهري أكتوبر وأبريل مما يرجح أن يكون هذا التوقيت هو موسم اختيار موئل التكاثر والأزواج.

نمنمة الشجر

Scotocerca inquieta




تعد نمنمة الشجر من أكثر الطيور المنتشرة في الجزيرة العربية، وتقصد المناطق الجبلية والصخرية، والأودية وسفوح التلال التي تتخللها شجيرات الطلح وغيرها.

تفتش عن الحشرات بين أوراق النباتات أو على الأرض أو في الصخور المتصدعة.

تحط في الحدائق والمناطق المزروعة، وكتبان النفود الكبير وحررة الحررة. ويتولى الذكر بناء العش في شكل مظلة مقببة ومدخل جانبي مكون من أعشاب ومواد نباتية هشة.

هازجة رشيقة

Prinia gracilis




الهازجة الرشيقة من الطيور غير المهاجرة المنتشرة في المرتفعات الغربية والمناطق المنخفضة من الخليج العربي. تعد من طيور الموائل الثرية بالبيئة النباتية والرطبة مثل قنوات الري وأحواض القصب، ومزارع النخيل والمحاصيل، ومناطق مياه الصرف الزراعي، والمدرجات الزراعية وحدائق الضواحي.

تتقب هذه الهازجة بين النباتات عن التمل. ويتعاون الزوجان في بناء العش وإطعام الفراخ.

طيور البلبل

Pycnonotidae – Bulbuls

تتسم البلبل بهيئة رؤوسها المميزة، وعنقها القصير وريشها الملون الذي يغطي ذيلها السفلي، ومنقارها القصير أو المتوسط في طوله، أما الجناحان فقصيران أو متوسطان في الطول كذلك ومستديران. وثمة مئة وعشرون نوعا من البلبل الموزعة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، منها نوع أو نوعان يوجدان في الجزيرة العربية، ونوعان آخران تم إدخالهما لها من شبه القارة الهندية فتكاثرا فيها.



بلبل أحمر الوجنة

Pycnonotus jocosus

يعد البلبل الأحمر الوجنة من الطيور الدخيلة على منطقة الخليج العربي التي تكاثرت بعد هروبها من أقصاها. يحل هذا الطائر بالمنتزهات وحدائق المدن ذات الغطاء النباتي الكثيف، وعدم تكاثره يوحي بأن منطقة الخليج العربي لا تلائمه بيئياً.


لا تتوافر معلومات عن غذائه أو تكاثره، إلا أنه يقتات في الهند على الفاكهة والورود والكائنات غير الفقارية.

بلبل أبيض الخد

Pycnonotus leucogenys

يقطن البلبل الأبيض الخد سواحل الخليج العربي، ويعد من طيور الأقباص المفضلة في منطقة الخليج العربي.

يجد حاجته من الطعام بين المحاصيل والحدائق من التمر والفاكهة، ومخلفات طعام الإنسان، ويشكل آفة تهدد زراعة التمور.




يبنى هذا البلبل عشاً مبعثراً على أغصان متفرعة من شجيرة أو شجرة ما أو على المباني، ويتقاسم الزوجان مسؤولية بناء العش ورعاية الفراخ.

بلبل أحمر العجز

Pycnonotus cafer

البلبل الأحمر العجز من طيور الأقباص الهاربة أو التي تم إطلاقها. يقطن ويتكاثر على ساحل الخليج العربي، وشرق الجزيرة العربية.

يقصد المناطق الحضرية، حيث الأماكن المشجرة المفتوحة، والأشجار التي تحف بالطرقات، ويقتات على الفاكهة والبراعم المتساقطة، وعلى الحشرات.



يقوم الزوجان بحضانة البيض في عش أشبه ما يكون بالكأس المنسوج من الأعواد الصغيرة وأوراق الأشجار الميتة.

بلبل أصفر العجز

Pycnonotus xanthopygos



البلبل الأصفر العجز من طيور أودية الجزيرة العربية وشجيرات الطلح، وثمة أعداد قليلة منه منتشرة من غرب الجزيرة العربية حتى حائل والرياض، وكذلك في جزر فرسان، ويشكل آفة تهدد محاصيل التمر.

يقتات هذا الطائر بالمواد النباتية والحشرات ومخلفات طعام الإنسان، ويتقاسم الزوجان مسؤولية بناء العش ورعاية الفراخ، ويبنيان عشهما على شجرة مرتفعة أو في ظلها أو على المباني.

هازجات العالم القديم

Sylviidae – Old World Warblers

هي عصافير صغيرة يقتات معظمها بالحشرات، ويكسوريشها ألوان من البني والرمادي والأخضر الزيتوني، وغالبا ما يكون باللون الأبيض والأصفر اللذين قد يتخللها بعض الخطوط، وهي ذات زي في رأسها وعنقها متناقضين. أما الذكر والأنثى فيتشابهان في معظم أنواع هازجات العالم القديم اللاتي غالبا ما تكون من الطيور المهاجرة. وقد سُجل في شبه الجزيرة العربية ٤٩ نوعا من ما يناهز ٢٦٠ نوعا من هذه الجواثم في العالم، تكاثر منها ثلاثة عشر، أو أربعة عشر نوعا. علما أن معظم الأنواع التي لا تتكاثر في الجزيرة العربية تمر بها بانتظام في موسم الهجرة.

هازجة سافي

Locustella luscinioides

هازجة سافي طائر نادر يمر بالجزيرة العربية مهاجرا، ورُصد وجوده بكثرة في النصف الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وربما في المرتفعات كما في المواطن الساحلية. شوهدت هذه الهازجة عند أحواض القصب وأحواض مياه الصرف الصحي، والموائل الرطبة. وتعتمد على ما تجده من طعام في النباتات الكثيفة من الكائنات غير الفقارية.





هازجة قصب البصرة

Acrocephalus griseldis

هازجة قصب البصرة طائر مهاجر وغير منتشر في شبه الجزيرة العربية، وتعد من الطيور المهددة بالانقراض، وتكاثرها ينحصر في جنوب دجلة والفرات ومستنقعات بلاد الرافدين الجنوبية.

شوهدت في عدة مواطن من المنطقة الشرقية بالمملكة، وقرب الرياض والطائف وجدة، وجنوب ساحل البحر الأحمر حتى جازان.

يقصد هذا العصفور الشادي موائل القصب المائية، وبخاصة مناطق نمو الأثل. ويقطن على الكائنات الفقارية وغير الفقارية.

هازجة القصب الكبيرة

Acrocephalus arundinaceus

تمر هازجة القصب الكبيرة مهاجرة بشبه الجزيرة العربية، وتنتشر في بعض الأعوام في المنطقة الوسطى منها.

تكاثرت منذ عام ١٩٨٧م أثناء مرورها على الأراضي الرطبة جنوب الرياض صيفا، فتارة تحط على شجيرة قاحلة في الصحراء، وتارة تقصد النباتات الكثيفة الرطبة التي تهواها. وتتكاثر أيضا في أحواض القصب الطويلة الكثيفة.

ذكور هذا الطائر عاصفير صاخبة شادية باستمرار.



هاجرة القصب الصيّاحة

Acrocephalus stentoreus

استوطنت هاجرة القصب الصيّاحة المناطق الساحلية من الخليج العربي وشرق الجزيرة العربية، وتقتطن أحواض القصب قرب تبوك وحرّة خيبر في شمال الحجاز والمنطقة الشرقية بالمملكة.

تكاثرها لم يُرصد إلا في أحواض القصب وأشجار الشورة. وكثيراً ما تتناول غذاءها من سطح الماء على الكائنات غير الفقارية.

تفضل هذه الهاجرة الشدو متخفية، وتبني عشها من العشب والمواد اللبضية الأخرى مثل غصينات الشورة المتحللة.




الهاجرة ذات الشارب


Acrocephalus melanopogon

طائر مستوطن في المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة، كما يمر بعض منها بالجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية مهاجراً وزائراً شتوياً.

تتخذ هذه الهاجرة أحواض القصب والنباتات الكثيفة النامية قرب المياه أو الناشئة فيها موئلاً للتكاثر. وقد عُرف عنها تناولها الطعام من فوق

سطح الماء أو تحته مباشرة وهي متعلقة بنبات مائي لصيد الكائنات غير الفقارية. ولهذه الهاجرة موسم تكاثر طويل إذ يسمع تغريدها لعدة أشهر.





هاجرة القصب الأوروبية

Acrocephalus scirpaceus

هاجرة القصب الأوروبية من الطيور المهاجرة التي تحط في جميع دول الجزيرة العربية، وتعد أكثر ظهوراً في منطقة الخليج العربي ووسط الجزيرة العربية.

تقصد هذه الهاجرة أحواض القصب ذات التربة الرطبة القريبة من الماء أو المترسبة منه. وتقتات بالحشرات والعناكب فضلاً عن بعض المواد النباتية. عُثر لها على عش مرتفع عن نهر الرياض ومعلق بين جذوع القصب.



هاجرة قصب البحر الأحمر

Acrocephalus avicenniae

رُصدت هاجرة قصب البحر الأحمر في ينبع، ثم انتشرت بعد ذلك في جميع المناطق التي تنمو فيها أشجار الشورة مثل جزر فرسان في جنوب المملكة.

تتوطن هذه الهاجرة في الجزيرة العربية على مدار العام، وتحط في الجزر الساحلية المكسوة ببساتين الشورة، وتتغذى بالكائنات غير الفقارية الصغيرة. وعادة ما تغرد متوارية بين أشجار الشورة الكثيفة.

هازجة سايك

Hippolais rama

يعتقد أن العصافير المتكاثرة في خور كلبا بالإمارات العربية المتحدة هي من هازجات سايك، ورُصد وجودها في معظم فصول الشتاء في ساحل الباطنة العُماني.

تقطن هازجة سايك أشجار الشورة الساحلية، وتقتات بالكائنات غير الفقارية. وتبني عشها على غصن من الشجيرات القريبة المحاطة بالمياه متماسكاً ومجوّفاً ومبطناً بالجذور والأعشاب والريش والنباتات.

هازجة زيتونية

Hippolais pallida

طائر مهاجر يمر بالجزيرة العربية ويزورها في أسراب قليلة في فصل الشتاء.

تتردد الهازجة الزيتونية عند تكاثرها في فصل الصيف على أشجار الأثل التي تحف المياه، وظلال الأشجار، وبساتين التمر والمسكيت والطلح.



تقضي هذه الهازجة معظم وقتها فوق الأغصان العليا من الأشجار لتخرج الحشرات أو تصطادها بعد مطاردة قصيرة.

نقشارة الغاب البنية



Phylloscopus umbrovirens


تقطن نقشارة الغاب البنية غابات المرتفعات في المملكة، ويمتد وجودها من الطائف في شمال الحجاز إلى جبل صبر في اليمن.

تجد غذاءها عند قمم الأشجار وأغصانها الخارجية، إذ تتقب عنه في أوراق الأشجار والأغصان الصغيرة، ويرجح أنها تقتات بالحشرات.

عُثر على عش لها في المملكة على ركام مخفي في قعر نبات أو تحت جذور شجيرة مقببة ذات مولج داخلي.

هازجة عربية

Sylvia leucomelaena



تقطن الهازجة العربية المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية، وكذلك في المنطقة الغربية من المملكة. وتفضل شجيرات الطلح الكثيفة في المناطق شبه الجافة وبخاصة سفوح التلال التي تغطيها الشجيرات.

تقوم بالبحث عن طعامها في الشجيرات بين أوراق النباتات والأشجار أو على الأرض. ويمكن مشاهدة الأزواج على مدار العام، ويشترك الزوجان في بناء العش والحضانة وإطعام الفراخ.



هازجة اليمن

Parisoma buryi

هازجة اليمن طائر متوطن في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وأدرجت ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، نظرا لأعدادها القليلة إثر إزالة الغابات وتغيير موائلها الجبلية.

تقوم هذه الهازجة بالبحث عن غذائها بين الأوراق وأغصان الأشجار والنباتات. ويحافظ هذا النوع من الطيور على علاقة زوجية متينة على مدار العام، ويتعاون الزوجان في إطعام الفراخ.

الثرثارات

Timaliidae – Babblers and allies

عائلة كبيرة تضم مئتين وسبعين نوعاً أو أكثر، ونحو خمسين جنساً، ثبت تكاثر نوعين منها في الجزيرة العربية. أما العديد من هذه الأنواع فطيور متوطنة غير مهاجرة ذات جناحين مستديرين، طويلة ريش الذيل، قوية الساقين والقدمين، وتمضي جُل وقتها على الأرض.



ثرثارة عادية

Turdoides caudate

توجد الثرثارة العادية في الكويت، وتقتن موثلاً قريباً من موثل الثرثارة العربية في الحدائق والمناطق المزروعة، ومناطق الشجيرات القاحلة أو شبه القاحلة، وتلزم الغطاء النباتي الذي من المفترض أنها تجد غذاءها فيه.

تفضل الثرثارة العادية التعشيش في شجيرات الأثل، ويتعاون الزوجان في الحضانة وبناء العش ورعاية الفراخ.

الثرثارة العربية

Turdoides squamiceps



الثرثارة العربية طائر عربي أصيل ينحصر نطاقه في الجزيرة العربية، وتتجمع في الشمال الغربي من المملكة، وفي وسط الجزيرة العربية.

تعد من طيور بساتين الطلح

وغيرها من نباتات السفناء والحدائق والأحزمة الواقية من الرياح، ومحيط المزارع ذات الغطاء النباتي، فتعشش وتجنم وتطوف بحثاً عن الطعام بين الشجيرات.

تقنت بشكل رئيس على الكائنات غير الفقارية، وعلى بذور الحبوب، وعادة ما تخفي أعشاشها في تفرع قريب من شجيرات الطلح أو غيرها.

طيور أبيض العين

Zosteropidae – White – eyes

أبداع الخالق عز وجل في ١٠٠ نوع تنتمي إلى ١٤ جنساً من الطيور تسمى بطيور «أبيض العين»، وهي طيور صغيرة، تسكن الشجر، وذات منقار حاد، وريش أصفر أو أخضر، ودائرة بيضاء بارزة من الريش المحيط بأعين الكثير من أنواعها. تكاثر منها نوعان في الجزيرة العربية، هما أبيض العين الشرقي، وأبيض العين الحبشي.

أبيض العين الشرقي

Zosterops palpebrosus

ثبت تكاثر أبيض العين الشرقي في شبه الجزيرة العربية في جزيرة محوت في سلطنة عمان، وأُغلب الظن أن هذا الطائر أدخل إلى جزيرة محوت بطريقة ما أو بسبب الظروف المناخية التي وجهتها إليها.

عُرف عنه أنه طائر قارت خارج هذه الجزيرة، ويتناول البذور والتوت والرقيق ولقاح النبات والحشرات الصغيرة.

وانحصار طيور أبيض العين الشرقي في نطاق صغير جداً من أشجار الشورة يجعل بقاءها في الجزيرة العربية عرضة للخطر.





أبيض العين الحبشي

Zosterops abyssinicus

يمتد نطاق وجود أبيض العين الحبشي من جبال الطائف إلى تعز، ويفضل المناطق المشجرة من سفوح التلال وقيعان الأودية، والمزارع والحدائق، كما ينتشر بين غابات العرعر في مرتفعات المملكة.

طعام هذا الطائر من المواد النباتية والكائنات غير الفقارية وقد تردد على الزهور للغذاء. يبني عشاً على أشجار العرعر مقعراً ومعلقاً بين غصنين أو ثلاثة تكسوه الأعشاب الناعمة والخيوط.

الزهور للغذاء. يبني عشاً على أشجار العرعر مقعراً ومعلقاً بين غصنين أو ثلاثة تكسوه الأعشاب الناعمة والخيوط.

الزرزير

Sturnidae – Starlings and allies

جواثم متوسطة الحجم ذات منقار مستقيم، طويل ونحيل، وساقين وقدمين قويتين، كما أن لدى العديد منها بقعا عارياة، أو غيبا، أو عُرفا على رؤوسها، وريشا أدكن اللون، تتفاوت بين البنفسجي، والأخضر، والأزرق، واللون البرونزي. وهي طيور فضولية وجريئة، غالبا ما تكون قارته. والزرزير عائلة تضم ما يناهز المئة نوع، منها ستة عشر نوعا وجدت في الجزيرة العربية، بما في ذلك من أعداد من الأنواع الشاردة والغريبة. وثمة عشرة أنواع من خمسة أجناس تكاثرت فيها.

مينة الضفاف

Acridotheres ginginianus



مينة الضفاف طيور هاربة من أقباصها، تباع في أسواق الطيور في الخليج العربي، ويعد طائرا سرييا يمارس نشاطه ضمن سربه بما في ذلك الأكل والتعشيش والجنم.

تفضل هذه المينة الحدائق والمنتزهات والأراضي الزراعية والحقول المروية وخنادق الري والمشاتل، وحظائر الحيوانات وركام

السماد. وكثيرا ما تجثم فوق أجساد المواشي لالتقاط الكائنات الطفيلية العالقة بها.

عند التعشيش تستولي مينة الضفاف على جحور سابقة أو تبني جحورها في موطن لين التربة.



مينة اعتيادية

Acridotheres tristis

نجحت طيور المينة الاعتيادية في التكاثر في الجزيرة العربية، وهي طيور شائعة ومتوطنة في العديد من دول الخليج وما حولها.

تقصد المناطق الحضرية،

حيث تجثم على الأشجار الشاهقة وأشجار الشورة مع أنواع أخرى من الطيور، وتقتات على مخلفات الطعام البشرية في الحدائق والمنتزهات والطرقات.

تمارس سلوكاً عدوانياً في موسم التكاثر، وتنافس الأنواع الأخرى من الطيور التي تعيش في الثقوب والجحور.

الزرزور المبقع

Sturnus contra

طائر دخيل على شبه الجزيرة العربية، ويرجع أن يكون من طيور الأقفاص الهاربة.

يجثم هذا الطائر على الأشجار العالية، ويقصد الموائل المتاخمة لمواطن المياه العذبة القريبة من الأشجار والمسكن البشرية مثل الحدائق والمنتزهات وغيرها. يقتات بالحشرات، وكثيراً ما يحضر في التربة الرطبة بحثاً عن الفرائس.



زرزور براهمي

Sturnus pagodarum

يقطن الزرزور البراهمي حدائق ومنتزهات الإمارات العربية المتحدة، ويجاور الإنسان ويعشش في مبانيه.

يتغذى على الأرض، وكثيراً ما يكون في مجموعات تتضمن أنواعاً أخرى من الطيور عند وفرة الغذاء والمجثم.

يتخذ هذا الطائر شقوقاً وجحوراً للتعشيش، ويتعاون الزوجان في بناء العش والحضانة ورعاية الفراخ.



الزرزور الشائع

Sturnus vulgaris

زائر شتوي منتشر في الجزيرة العربية، وقابل للانتشار في العديد من المناطق الزراعية في شرق الجزيرة العربية ووسطها.

يتخذ هذا الطائر شقوق الأشجار وجحور المباني موطناً له ليبنى فيها عشا من الأعشاب والأوراق مبطناً بالريش والشعر والألياف. ويتعاون الزوجان في بناء العش وحضانة البيض ورعاية الفراخ.



زرزور فاتن



Lamprotornis superbus

شوهدت طيور الزرزور الفاتنة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد من طيور الأقفاص الهاربة. ويتردد هذا الطائر على ضواحي المدن كالمنتزهات والحدائق ذات الأشجار والمروج والمياه العذبة.

يقطن على اليسروع والحشرات التي يلتقطها من الأرض وبعض أنواع الفاكهة والتوت والورود والبذور ومخلفات طعام الإنسان.

زرزور أبيض البطن



Cinnycinclus leucogaster

يقصد الزرزور الأبيض البطن مرتفعات وسفوح تلال المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية صيفا.

يقصد مناطق المنتزهات والغابات وسفوح التلال ذات الشجيرات والحدائق، وبخاصة الغابات المنوعة الأشجار مثل الطلح والعرعر والتين.

يتخذ شقوق الأشجار للتعشيش، ويعمد أحيانا إلى طرد ناقر الخشب العربي للاستيلاء على عشه.



زرزور صومالي

Onychognathus blythii

طائر مرتحل يوجد في جزيرة سقطرى، وجزيرة عبد الكوري، وجزيرة سمحة. يقصد للتعشيش الشقوق والتصدعات في المنحدرات المرتفعة والكهوف، ويققات على الفاكهة والأسماك الميتة عند السواحل، ويلتزم المواشي لالتقاط القراد والطفيليات التي على أجسادها. ويشترك الذكر والأنثى في بناء العش.

زرزور سقطرى

Onychognathus frater



يعد هذا الطائر من طيور جزيرة سقطرى، وينتشر فيها، إلا أنه من الطيور المهددة بالانقراض.

يبحث عن طعامه على أغصان الأشجار والشجيرات، وعلى الأرض أحياناً، حيث يققات بالفاكهة كالتين وثمار السدر الجبلي والبلح. ويتوقف موعد تكاثره على الظروف الملائمة ولاسيما وفرة الغذاء.

زرزور أسود

Onychognathus tristramii

يتوطن الزرزور الأسود في المرتفعات الغربية من الجزيرة العربية، ويقصد المناطق السكانية منها. ويتغذى على الأرض أو بين الشجيرات بالمواد النباتية والكائنات غير الفقارية ومخلفات طعام البشر.

يعشش في صدوع الصخور العالية. ويقوم الزوجان ببناء العش ورعاية الفراخ.



طيور السمنة أو الدج

Turdidae

تعد من عائلة الجواثم المتوسطة الحجم، والمنقار الصلب، مكينة الساق، وريش الذيل المتوسط الطول، وذات ريش رتيب متجانس من اللون البني، وأجزاء سفلية مرقطة، وإن كان منها ما هو مبهج اللون. وتضم هذه العائلة أكثر من مئة وستين نوعاً في العالم، وأكثر عدداً في العالم القديم. وقد ورد ذكر عشرة أو اثنا عشر نوعاً منها في شبه الجزيرة العربية، معظمها زائر شتوي نادر أو شارد، ما عدا نوعاً واحداً يستوطن شبه الجزيرة العربية ويتكاثر فيها.

سمنة اليمن

Turdus menachensis



سمنة اليمن من الطيور المهددة بالانقراض، وتقتن المرتفعات الجنوبية الغربية، ولا تعد من الطيور المهاجرة لطبيعة جناحها اللذين لا يساعدها على الهجرة الطويلة.

تقتن سمنة اليمن البقاع ذات الكثافة النباتية، كالغابات

والحدائق، وتقتن على الكائنات غير الفقارية والبذور.

تبنى أنثى سمنة اليمن وحدها عشاً متيناً من العشب والفصينات الحرشية، ويتعاون الزوجان على إطعام الفراخ.


طيور الأبلق وصائدي ذباب العالم القديم

Muscicapidae

عائلة كبيرة تضم أكثر من ٣٠٠ صنف، معظمها جاثم ومتوسط الحجم، وأكل للحشرات، وذات ريش ملون ومتناسق. وتعد طيور الأبلق قوية المنقار والساق، أما طيور صائد الذباب فذات منقار عريض وهلب شقافي بائن، ويوجد ٢٤ نوعاً من طيور الأبلق في الجزيرة العربية، فضلاً عن ثمانية من طيور صائد الذباب.

أبو حناء الأحراش الأحمر

Cercotrichas galactotes



طائر مهاجر يتردد بانتظام على شبه الجزيرة العربية، ويوجد بالقرب من الرياض والخرج وحرص، وأحياناً في تبوك.

يثب هذا الطائر من مجثمه مفرداً وجناحاه يرتعشان، ويمضي وقته منقباً عن طعامه على الأرض بين أوراق الشجر أو في قواعد النباتات

في الأحراش، ويقتات على الديدان واليرقات.

يبنى عشاً مقعراً مهلهلاً من الغصينات والأعشاب، ويتعاون الزوجان على إطعام الفراخ.

أبو حناء الأحرش الأسود

Cercotrichas podobe

موئل هذا الطائر الأصلي في تهامة وسفوح التلال الغربية والجنوبية من الأدغال وأحراش السنط ذات الأشجار المتشابكة والأودية المعشبة.

يتكاثر في المزارع المروية وسط الجزيرة العربية التي لا تحظى بغطاء نباتي جيد. ويقطن على الحشرات كالنحل والخنافس واليرقات وبعض ثمار الأشجار. يبني عشاً متيناً مقعراً من العُصينات مخفياً بين الأشجار، ومبطناً ببعض الصوف والشعر أحياناً.



القليعي المطوق

Saxicola torquatus


من الطيور المعروفة في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، فهو إما مهاجر أو زائر في فصل الشتاء. يفضل هذا الطائر غابات العرعر، والمناطق الرحيبة ذات الغطاء النباتي المنخفض، والحقول الزراعية المحاطة بالتربة الوعرة، والشجيرات والأراضي الصخرية.

يصطاد الكائنات غير الفقارية. ويتعاون الزوجان في رعاية الفراخ.



أبلق أحمر الصدر

Oenanthe bottae




الأبلق الأحمر الصدر يُعرف بطائر المرتفعات، ويقطن جبال الطائف، ويقطن بالحشرات التي عادة ما يتقضم عليها من مرصده.

يقصد هذا الطائر جُحراً أو حفرة للتعشيش، مفضلاً جحور القوارض القديمة والحفر التي تتخلل جدران الحقول. ويتعاون الزوجان

على إقامة العش وإطعام الفراخ، إلا أن الأنثى تقوم وحدها بحضانة البيض.

أبلق البادية أو الصحراء

Oenanthe deserti




يعد أبلق الصحراء مهاجراً وزائراً شتوياً، وينتشر في مختلف أرجاء الجزيرة العربية، ويتوافد على السهول والمناطق المزروعة، ويقصد المساحات ذات الشجيرات المنخفضة والأعشاب المعمرة.

يُعرف بشدوه من مجثمه على صخرة أو شجيرة أو تغريده

أثناء طيرانه بشكل دائري فوق حدود مسكنه، خافقاً بجناحيه، ويكاد يسقط نفسه بين الحين والآخر على الأرض.

أبلق حزين

Oenanthe lugens



يصنف الأبلق الحزين في ثلاثة أنواع موزعة من شمال غرب إفريقيا إلى إيران، ومن ثم جنوباً إلى جزيرة العرب، ومن شرق إفريقيا إلى تنزانيا.

تقصد طيور الأبلق الحزين التي تحل في شبه الجزيرة العربية شتاءً موثلاً من البروز الصخري والجرف وبادية الرمال، ووجودها يكون قرب المزارع والمناطق السكانية. ولا تزال المعلومات عن هذا الطائر المقتات على الحشرات محدودة.

أبلق جنوب الجزيرة العربية

Oenanthe lugentoides




طائر جبلي غير مهاجر يقطن الموائل الصخرية المكتظة بالشجيرات، وغابات العرعر جنوب غرب المملكة في موسم التكاثر.

يقتات هذا الطائر العربي على اليسروع والنمل والخنافس، ويتناول بعض أنواع الثمار كالتوت الأحمر، ويعيش قرب

المنحدرات والمناطق الصخرية في فجوة صخرية أو جدار مدرج أو ركام من الحصى.

أبلق هيوم




Oenanthe albonigra

طائر منتشر في جبال الإمارات العربية المتحدة وأوديتها، وشمال سلطنة عمان، والمنطقة الشرقية من المملكة.

يفضل هذا الطائر الجبال الصخرية القاحلة وسفوح التلال الصخرية المقفرة، ويتغذى على الذباب والجنذب وبعض الحشرات الأخرى والنفايات. رُصدت أعشاش له في الصخور المتصدعة، وفي حفر تحت الصخور، وفي شق مرتفع أو قرب الطرق.

أبلق أسود أبيض القنة




Oenanthe leucopyga

يعد من طيور البوادي، وأكثر أنواع طيور الأبلق المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية عدداً، ويستوطن القسم الغربي من المملكة.

ينتشر هذا الطائر في المرتفعات الشمالية الغربية، ويتكاثر في حقول الحمم البركانية قرب الحرات، ويوجد على طول جبل طويق وطرفه الجنوبي في منطقة العارض، وفي المنطقة الشرقية، وكذلك الجانب الشرقي من هضبة الصمان. يبني هذا الطائر عشه في شقوق صخرية ضيقة أو في الجرف أو دون صخور الجلمود.

أبلق أبو قلنسوة

Oenanthe monacha



من الطيور المنتشرة والمتكاثرة بانتظام في شبه الجزيرة العربية. وشوهد في منتصف فصل الصيف في المنطقة الشرقية، وكذلك شتاءً في

الخليج العربي، ويوجد بأعداد كثيرة في جرف طويق قرب الرياض.

يتكيف هذا الطائر مع بيئة المناطق الصخرية المجربة، ويتميز بتغريده العذب وبطيرانه ورفرفة جناحيه على نحو صاحب كالفراشات.

يقتاب بالحشرات الطائرة، ويتعاون الزوجان في بناء العش والحضانة ورعاية الفراخ.

قلبي أسود الذيل

Cercomela melanura



القلبي الأسود الذيل من طيور الأودية والمناطق الصخرية القاحلة المتوطنة في تلال المنطقة الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة العربية.

يقصد هذا الطائر المناطق الأكثر جفافاً، وبخاصة الأودية الصخرية ذات الأشجار السنطية (الأكاسيا) ويقتاب بالكائنات غير الفقارية مثل الخنافس والنحل والنمل والذباب، وبعض الثمار كالتين والتوت.

يتردد كثيراً على الترى ويعشش قرب المباني، وتُشاهد أزواج هذه الطيور في معظم العام.



سمنة الصخور الصغيرة

Monticola rufocinereus

تقطن سمنة الصخور الصغيرة المرتفعات الجنوبية الغربية، من جبل صير قرب تعز إلى الطائف شمالاً.

تفضل هذه السمنة النباتات الكثيفة، وغابات العرعر وشجيرات السنط (الأكاسيا) المنخفضة، وأطراف المناطق

الزراعية، وسفوح التلال الخضراء. وتقتات بالكائنات غير الفقارية من الخنافس والجنادب واليسروع.

كثيراً ما تجاور سمنة الصخور المنازل والحدائق، وتبني عشها على الأرض في صدع مرتفع.



خاطف الذباب الجامباغي

Muscicapa gambagae

زائر صيفي متكاثر يحط في المرتفعات الجنوبية الغربية، ومن الطيور المنتشرة في بعض الموائل كالأودية المفعمة بأشجار السنط (الأكاسيا) في وادي عسير.

سُجل وجود هذا الطائر في غابة عرعر في المملكة، ويتردد صيفاً على أودية الحجاز. ويبني عشه على الأغصان، ويتعاون الزوجان معاً في إطعام الفراخ.

طيور التميز

Nectariniidae

جوائيم صغيرة زاهية الألوان، ذوات مناقير سفلية منحنية، وأجنحة قصيرة مستديرة، وريش مقزح الألوان. وهي طيور حيوية تقتات في الغالب من الزهور بالرحيق والحشرات. وتعد من طيور العالم القديم، وبخاصة خطوط المدار الاستوائية، كما أنها غير مهاجرة. ويوجد منها خمسة أنواع من مئة وسبعة وعشرين نوعا متكاثرة في الجزيرة العربية، بما في ذلك نوع واحد يستوطن جزيرة سقطرى.

تمير وادي النيل

Hedydipna metallica



ينتشر تمير وادي النيل من وادي النيل في مصر جنوبا إلى السودان، وشرقا إلى الصومال وكذلك جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. رُصد وصوله إلى محازة الصيد وسط المملكة ليققات بزهور العشار الطويلة المنتشرة فيها، وبالكائنات غير الفقارية التي تحوم حولها.

يتعاون الذكور والإناث في بناء العش وحمايته من المنافسين. ويُعلق العش على قمة شجرة ما أو على غصنها الخارجي.



تمير سقطرى


Chalcomitra balfouri

تمير سقطرى طائر عربي مستوطن ومنتشر في جزيرة سقطرى، ويقطن على الكائنات غير الفقارية فضلاً عن ترده على مختلف الأزهار المثمرة.

عُثر على أعشاش له في المناطق المنخفضة الساحلية على منحدرات تلال مخفية بين أغصان الفربيون الشجيري وأوراقه، وذات قبب منسوجة من الأعشاب وخيوط العناكب الرخوة.

تمير فلسطيني

Cinnyris osea



التمير الفلسطيني من الطيور المتوطنة في شبه الجزيرة العربية، ويوجد في المنطقة الممتدة من أقصى جنوب المملكة مروراً بالحجاز وعسير، والمرتفعات الغربية من اليمن.

يُعرف بطائر الأودية الخضراء ذات الأشجار والشجيرات المزهرة، وأشجار

العرعر، ومنتزهات وحدائق المدن. وتلازم ذكور التميز الفلسطيني إناثها عند التعشيش، وتبنى الإناث الأعشاش منفردات في الغالب.

التمير اللامع

Cinnyris habessinicus

يستوطن التميز اللامع جنوب غرب المملكة، ويقطن مختلف الموائل من المناطق ذات النباتات الكثيفة إلى مواطن الشجيرات المنخفضة الجافة.

يقتات هذا الطائر بالرحيق والكائنات غير الفقارية، والحشرات الطائرة، ومن الزهور التي يفضلها: نبات الرنف، والمرو، والعشار الطويل، والسنتط (الأكاسيا) والصبر.



تبني الأنثى عشاً معلقاً ذا مدخل جانبي علوي، يميل إلى اللون الأبيض نظراً لكثرة مكوناته من خيوط العناكب والشرايق والمواد القطنية.

تمير آسيوي

Cinnyris asiaticus

يقطن التميز الآسيوي شمال سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ويقصر وجوده على المناطق الزراعية الممتدة جنوباً إلى حدود المملكة. يقتات بلقاح الزهور والكائنات غير الفقارية، علماً أن العشار أو البرنخ من أكثر النباتات التي يفضلها.

عش هذا الطائر الأحادي الزوج زجاجي الشكل، بحجم كرة المضرب، يعلقه على غصن شجرة صغير ومتدل.




عصافير العالم القديم

Passeridae

أكلة للبذور، تمتاز باللون الأسمر الفاتح، مخروطية المنقار، صغيرة الجسد، عريضة الرأس، ذات ساقين وجناحين قصيرين قويين، وذيل قصير الريش مربع الطرف. توجد في الجزيرة العربية عشرة أنواع من إجمالي ٤٠ نوعا من هذه الطيور المنتشرة في العالم القديم، يستوطن نوعان منها في أرخبيل سقطرى.

عصفور دوري

Passer domesticus



العصفور الدوري من الطيور السربية التي تكاد تقطن جميع المناطق السكانية في شبه الجزيرة العربية، وربما يكون دخيلا قادمًا من الهند.

يقطن هذا العصفور الموائل المحيطة بالمناطق السكانية،

والهضاب المزروعة والمروية، والكهوف والمنحدرات. يقطن على بذور النباتات والبراعم، ومخلفات الأطعمة البشرية والحيوانية، والكائنات غير الفقارية، ويفضل التعشيش ضمن مجموعات من العصافير.



عصفور إسباني

Passer hispaniolensis

العصفور الإسباني طائر يلج بأعداد محدودة إلى مختلف أرجاء الجزء الشمالي والشرقي من شبه الجزيرة العربية شتاءً، وثبت تكاثره قرب تبوك والرياض والمنطقة الشرقية، والمناطق الساحلية في الخليج العربي.

يفضل هذا الطائر الحقول المحيطة بالقرى والمزارع وبساتين التمر، وأحواض القصب، ومزارع أشجار الكينا، وغيرها من الأشجار الشاهقة.

يقوم كل زوج ببناء عشه ووضع بيضه بالتزامن مع الأزواج الأخرى، ويتعاون الزوجان في رعاية الفراخ.



عصفور سقطرى

Passer insularis

يستوطن عصفور سقطرى أرجاء جزيرة سقطرى، ويتردد على القرى وبساتين التمر والأودية، والبقاع الفسيحة.

يفضل المواطن السكانية والأودية الخضراء، ويتغذى على البذور التي يلتقطها من الأرض، كما شوهد يقات بجيف من لحوم الحيوانات.

يتكاثر هذا العصفور بشكل جماعي، ويبني عشه على الشجيرات والأشجار، وفي تجاويف المباني والصخور. ويتعاون الزوجان في بناء العش.


عصفور عبد الكوري

Passer hemileucus

تعود تسمية هذا العصفور إلى جزيرة عبد الكوري التي يقطنها في أقصى غرب جزيرة سقطرى، ويعد من الطيور المهددة بالانقراض نظرا لأعداده القليلة في هذه الجزيرة.

يتجنب هذا الطائر المتبرد المناطق السكانية، ويفضل المنحدرات ذات الشجيرات

القريبة من الأخاديد الصخرية البعيدة عن القرى. ويقتات بالبذور والسويقات والأوراق الخضراء وبقايا الأطعمة البشرية.



العصفور الذهبي العربي

Passer euchlorus

ينحصر نطاق وجود هذا العصفور السربي في جنوب غرب الجزيرة العربية في المناطق المزروعة في تهامة، حيث حقول حبوب الدخن التي يقتات بها وبالبذور الأخرى.

تعاون هذه العصافير فيما بينها عند التعشيش، وتساعد الإناث في إكمال بنائه لتنتهي بعش مقبب ذي مدخل جانبي علوي أو سفلي. وتتولى الأنثى حضانة البيض ومساعدة الذكر في إطعام الفراخ داخل العش وخارجه.



عصفور الصخر الشاحب اللون

Carpopsiza brachydactyla



عصفور الصخر طائر كثير الترحال، يتكاثر في عدة مواطن في شمال الجزيرة العربية وشرقها، ويقتات بالبذور والبقايا النباتية وبخاصة بذور العشب.

يتوخى هذا العصفور في تكاثره غير الثابت التلال الصخرية المنخفضة، وأودية السنط (الأكاسيا) وغيرها من الشجيرات المنخفضة التي تتخللها المناطق الرملية. وعشه مبعثر وخشن.

عصفور مسنن المنقار

Gymnoris dentata



هو عصفور نادر وغير مشهور في شبه الجزيرة العربية، وشوهد في مناطق المحاصيل اليمينية، بما في ذلك المدرجات الزراعية المنخفضة للموز والقهوة والسرغوم، وبين أشجار السنط (الأكاسيا) في تهامة.

لا تتوفر معلومات عن غذائه في الجزيرة العربية، إلا أنه في إفريقيا يقتات حصريا ببذر الشعب، وحوراء الجراد.



عصفور أصفر الرقبة

Gymnoris xanthocollis

طائر مهاجر ومتكاثر في شبه الجزيرة العربية، ويقطع الخليج العربي سنويا بأعداد قليلة في فصلي الربيع والخريف، مع استراحة وجيزة في الجزر الإماراتية. يقطن قرب المناطق السكانية،

ووجوده مقصور على أشجار الغاف الناضجة التي يقات ببيورها، وبالحشرات.

يبني هذا العصفور عشه في جحر أو شق شجرة أو شجيرة منخفضة أو على عمود إنارة ما أو برج مضيء أو مبنى مهجور، وتنفرد الأنثى بحضانة البيض.

الطيور النسّاجة

Ploceida

يتميّز النسّاج بمنقاره المخروطي الذي يساعده على أكل البذور، ورأسه الكبير، وجناحيه القصيرين المستديرين، وريش ذيله إما أن يكون قصيرا ذا طرف مربع، أو ممتدا متوهج اللون. ومعظم هذه الطيور أليفة جدا. فهي عائلة تنطوي على أكثر من ١٠٠ نوع من طيور العالم القديم، منها نوع واحد من الطيور العربية الفطرية، فضلا عن بضعة أنواع أخرى أدخلت إلى المنطقة وياتت تتكاثر فيها.

نسّاج روبل

Ploceus galbula



يوجد نسّاج روبل بكثرة في تهامة وفي سفوح تلال المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية. ويعد من أكلة البذور، إذ يحوم قرب مزارع الحبوب.

يتميز بنزعه لبناء الأعشاش التي تبدو كسلال معلقة، إذ

يتعلق الذكر متدلي الرأس بجناحين يهتزان لاجتذاب الأنثى التي تساعده في إكمال بناء العش المكون من المواد الخضراء اللينة واليابسة.

تقوم الأنثى بحضانة البيض، ويتولى الذكر إطعام الفراخ بعد فقس البيض.

نساج مقنع صغير

Ploceus intermedius

النساج المقنع الصغير طائر ينحدر من المنطقة البيئية الإفريقية الاستوائية، ويعد غربيا على الجزيرة العربية.

تم إطلاق نحو ١٠٠ نساج مقنع صغير عام ١٩٨٤م في الشارقة، فتمكنت من الاستقرار والتكاثر مع نهاية الثمانينيات.

أعشاشه مماثلة لأعشاش نساج روبل من أوراق أشجار النخيل، وسنابل الأعشاب التي شوهدت الإناث تقتلعها لتبطين العش.



نساج ذهبي الظهر

Ploceus jacksoni

عُرف النساج الذهبي الظهر في الإمارات العربية المتحدة، ويُرجح أن أصله يعود لطائر قفص هارب.

وجد هذا الطائر في المدن والضواحي، وخاصة في المنتزهات والمناطق الخضراء المورقة القريبة من الماء، وأحواض القصب.

تبدأ مجموعات هذا الطائر في بناء الأعشاش بدءاً من شهر مارس حتى شهر يوليو وكذلك في شهر أكتوبر.



نساج مخطط

Ploceus manyar



النساج المخطط من أكثر أنواع طيور النساج الغربية انتشاراً في شبه الجزيرة العربية، ويقصد المزارع والأراضي الزراعية المجاورة للأراضي الرطبة.

يتكاثر هذا الطائر في شبه الجزيرة العربية، وتبني الذكور الأعشاش في أحواض القفص وتعريدها لا يكاد ينقطع لاجتذاب الإناث.

يقيم النساج المخطط ما يشبه السلال المعكوسة من شرائط أوراق القصب الخضراء، ويغلف عشه أحياناً بالطين.

نساج بايا

Ploceus philippinus




ظهرت طيور نساج بايا في وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها، ويُرجح أنها طيور قفص هاربة.

عُثر على هذا الطائر في البحرين مع مجموعة من الطيور المعششة عام ١٩٨٧م، ومنذ ذلك الحين لم يشاهد في المنطقة. وفي الرياض لم يرصد هذا الطائر بعد انتهاء موسم تكاثره فيها.

يقطن في الهند قرب المناطق المزروعة والمعشبة، ويقتات بالحبوب والبذور.

فودي أحمر

Foudia madagascariensis



تم إطلاق أكثر من ٣٠٠ طائر من طيور الفودي الأحمر في بساتين التمر الغربية في البحرين عام ١٩٨٤م، فأصبح يقطن فيها منذ ذلك الحين.

يعد في البحرين من طيور الحدائق والمنتزهات وبساتين التمر، وكثيراً ما يحوم حول

المناطق السكنية، ويقطن بالبذور، وبالأشجار الضارة بزراعة الأرز.

عُثر على أعشاش معلقة بأشجار الليمون الكثيفة يُعتقد أنها لطائر الفودي الأحمر.

الطيور الشمعية المنقار وطيور المونيا

Estrildidae

عصافير صغيرة آكلة للبدور وغير مهاجرة، معظمها يقطن مناطق المدارات الاستوائية، ذات منقار مخروطي الشكل، وجناحين مستديرين وطيوران له أزيز. قسط كبير من هذه الطيور سربي نابض بالألوان. ويمكن تمييز ١٣٠ نوعاً من هذه الطيور، ثلاثة أنواع منها فطرية عربية، أحدها متوطن في شبه الجزيرة العربية، فضلاً عن نوعين على الأقل يعدان من الأنواع الغربية التي أدخلت إلى المنطقة وتمكنت من التكاثر فيها بشكل فطري. الجدير بالذكر أن هذه العائلة من الطيور تعد من الأنواع المفضلة في سياق تربية الطيور والمتاجرة بها. كما يوجد العديد من الأنواع الأخرى الهاربة التي رصدت طليقة في شبه الجزيرة العربية.

شمعي المنقار العربي

Estrilda rufibarba



يستوطن العصفور الشمعي المنقار العربي في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ويقطن مختلف الموائل المكتظة بالحياة النباتية، وهو من الطيور الاجتماعية، حيث تجلس هذه العصافير متراسة، وتغذى في مجموعات.

يُعرف في إفريقيا بإقامته عشاً من الأعشاب بين النباتات المنخفضة ذا مدخل أشبه بنفق منحدر إلى أسفل، وكثيراً ما يتضمن عشاً كاذباً إضافياً.

شمعي المنقار الأحمر

Amandava amandava

سُجِّل وجود العصفور الشمعي المنقار الأحمر لأول مرة في الرياض عام ١٩٧٥م، ويُرجح أن يكون من العصافير الهاربة أو التي أطلقت من أسرها، إذ تعد من الطيور المنتشرة في أسواق بيع الطيور.

يتوخى هذا العصفور الصغير أحواض القصب، فضلاً عن الأعشاب الباسقة والمحاصيل، وبقاع النباتات الكثيفة والمرتفعة. ويبني عشاً مقبباً من الأعشاب والقصب قرب الماء أو فوقه.



شمعي المنقار المخطط

Amandava subflava

ينتشر شمعي المنقار المخطط في معظم أرجاء غرب اليمن، فهو من طيور القفص التي أدخلت للمنطقة ربما في منتصف القرن العشرين.


يعد طائراً غير مرتحل، وكثيراً ما يوجد قرب الماء وأحواض القصب، وبين محاصيل الدخن والذرة بحثاً عن البذور.

لا يُعرف الكثير عن تكاثره وتعيشه في شبه الجزيرة العربية.



فضي المنقار الإفريقي

Lonchura cantans



يعد من الطيور التي تقطن جنوب وغرب شبه الجزيرة العربية بأعداد كبيرة، ويقصد شجيرات السنط (الأكاسيا)، والمناطق المزروعة من تهامة والمناطق الأكثر جفافاً من المرتفعات.

قلما يقرب هذا الطائر المدن رغم بلوغه الضواحي

الحضرية من مدينة جدة. ويقطن على النباتات المنخفضة كالأعشاب لتناول بذورها. يبني هذا العصفور عشاً غير متماسك، وتقوم الأنثى وحدها بحضانة البيض.

فضي المنقار الهندي

Lonchura malabarica



أدخل هذا الطائر إلى الجزيرة العربية بعد إطلاق عصفير منه كانت حبيسة الأقاليم فأصبح رائجاً في منطقة الخليج والمنطقتين الشمالية والغربية من الجزيرة العربية.

يعد هذا العصفور أكثر تحملاً

للحط، ويتناول طعامه من رؤوس الأعشاب التي تنمو في ظل أشجار التمر، حيث يزرع النعناع. ويعيش شرق شبه الجزيرة العربية وفي منطقة الخليج العربي، وعُشّه كروي الشكل ذو مدخل جانبي فوق شجرة أو شجيرة ما.



مونيا حرشفية الصدر

Lonchura punctulata

يعد هذا العصفور الفلّيتن من طيور القفص التي أدخلت إلى شبه الجزيرة العربية، فهو طائر المنتزهات والمناطق الزراعية. ويقتات على بذور

الأعشاب والأوراق الخضراء وبعض ثمار التوت والحشرات أحياناً.

يفضل التعشيش ضمن مجموعات كبيرة من الطيور، ويبني عشاً مستديراً ومتميناً من الأعشاب الخضراء، ويخفيه في صدع مبنى أو شجيرة ما.

عصافير الشوك

Prunellidae

عصافير غير متطفلة، ذات لون أسمر فاتح، مخططة الظهر. يستوطن نوع واحد منها الجزيرة العربية، أما الأنواع الأخرى فنطاق وجودها يبدأ من أوروبا الغربية إلى شرق آسيا، وقد بلغت ثلاثة أنواع أخرى منها الجزيرة العربية كطيور شاردة في فصل الشتاء.

عصفور الشوك العربي

Prunella fagani



يستوطن عصفور الشوك العربي أقصى قمم اليمن الوسطى، ويعد من الطيور المهددة بالانقراض نظراً لنطاقه المحدود.

يعد من عصافير المنحدرات الجبلية الصخرية ذات الحياة النباتية المحدودة التي تتخللها مناطق معشبة، وذات


شجيرات منخفضة، وأشجار السنط (الأكاسيا) المتفرقة.

يتكاثر في المرتفعات، ويقوم الذكر بإطعام الأنثى الحاضنة للبيض.

الذعرات والجشنات

Motacillidae

طيور برية نحلية ذات ذيل طويل الريش، والساق (طويلة أصابع القدم أيضاً، وبخاصة الإصبع الخلفي)، توجد في الغالب في الموائل الرطبة الفسيحة. العديد من هذه الطيور مهاجرة، وشديدة الطيران. وبالرغم من انتشار هذه العائلة في نطاق عالمي، فإن معظم أنواع هذه الطيور ينتمي إلى العالم القديم. وتستأثر شبه الجزيرة العربية بخمسة أنواع من الذعرات و١٢ جشنة من عددها الإجمالي الذي يناهز ٦٠ نوعاً في العالم. الجدير بالذكر أن معظم هذه الأنواع تعد طيوراً مهاجرة، أو ضيوفاً شتوية على الجزيرة العربية، باستثناء نوعين من الجشنة التي تسكن هذه المنطقة.



ذعرة صفراء

Motacilla flava

تمر الذعرة الصفراء بشبه الجزيرة العربية، وثمة شواهد على تكاثرها في بعض مناطق الخليج العربي.

يقطن هذا الطائر في الموائل المتاخمة للماء مثل البرك والسيخات والمستنقعات. وكثيراً ما يقصد الأراضي الزراعية، وخاصة المناطق المروية الحديثة الحصاد. تتبع أسراب من هذا الطائر الماشية طمعاً في الحصول على الحشرات التي تثيرها هذه الحيوانات.

جشنة إفريقية




Anthus cinnamomeus

الجشنة الإفريقية من الطيور النادرة في المملكة، وتقصد عادة المناطق الزراعية المرتفعة وحقول الذرة والمراعي، إضافة إلى الأودية الفسيحة العشبية الضفاف.

تُعرف هذه الجشنة بتناولها للحشرات وغيرها من المفصليات ويرقاتها فضلاً عن البذور. وعُثر لها على عش على شكل كأس عميقة في الأرض، وتقوم الأنثى وحدها بحضانة البيض.

جشنة طويلة المنقار

Anthus similis



تنتشر الجشنة الطويلة المنقار في المناطق الجبلية من شبه الجزيرة العربية، وتنتقل بين مختلف المرتفعات في الجبال الجنوبية الغربية منها.

تقطن جزيرة سقطرى، وتُعرف بأنها طائر الطرف الجبلي والحقول المدرجة الجبلية ذات الشجيرات

المنخفضة والأشجار والغطاء النباتي الأرضي الجيد.

تقتات هذه الجشنة بالجنادب واليرقات الدودية وغيرها من الحشرات، وتخفي عشاها على منحدر تل أو نبتة كثيفة.

عصافير الحسون

Fringillidae

عائلة كبيرة متنوعة من العصافير القصيرة، الأكلة للبذور والفواكه، ذات منقار مستدق الرأس، وإن كان عريضاً لدى بعضها، وجناحين صغيرين مستديرين، وزاهية الألوان. وثمة ١٦٨ نوعاً في ٤٢ جنساً موزعة في مختلف بقاع الأرض، سُجِّل تكاثر ١٦ نوعاً من ثمانية أجناس منها في شبه الجزيرة العربية، والمتكاثر منها ثمانية أنواع، فيما بقيت الأنواع الأخرى من الضيوف الشتوية النادرة القادمة من الشمال. كما رُصدت طيور قفص هاربة منها، لا دليل على تكاثر أي منها في الجزيرة العربية.

نعار عربي

Serinus rothschildi



يوجد النعار العربي غرب شبه الجزيرة العربية، ويقصد المناطق الفسيحة الزاخرة بالأشجار والشجيرات والمناطق الزراعية، وبخاصة شقق التلال شبه المستوية والمشجرة بالعرعر أو السنط الذي يفضلته لتناول أزهاره.

يضع هذا الطائر عشه مرتفعاً عن الأرض على شكل كأس

تمسكة من الأعواد الشائكة والأعشاب، وتقوم الأنثى وحدها بحضانة البيض.



نعار اليمن

Serinus menachensis

طائر يستوطن جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ويفضل منحدرات التلال والتتوءات الصخرية والحقول الزراعية.

يبحث النعار اليمني عن طعامه في المناطق الصخرية، وبين النباتات المنخفضة منقبا عن البذور. وتتميز أعشاش هذا الطائر بوجود

تتوءات أو سقف صخري فوق العش. ويتعاون الطائران البالغان على رعاية العش وإطعام الفراخ.

ضخم المنقار السقطري

Rhynchostruthus socotranus



ينحصر نطاق هذا الطائر في يابسة الجزيرة العربية بجبال المنطقة الجنوبية الغربية، ويعد شائعاً في جزيرة سقطرى، ومن الطيور المهددة بالانقراض.

يقصد الطائر المناطق المرتفعة، ويقطن سفوح التلال والسهول المنبسطة في المواقع

العالية ذات النباتات المرتوية والأشجار أو الشجيرات المنخفضة. ويفرد الذكر فardاً وخافضاً جناحيه وريش ذيله يهتز. ويعمل الذكر والأنثى معاً على تشييد العش.

الحسون



Carduelis carduelis

كان الحسون ضيفاً شتوياً على المنطقة الشرقية والشمالية من شبه الجزيرة العربية، ويعتقد أنه من طيور القفص الهاربة في الإمارات العربية المتحدة.

يقصد هذا الطائر بساتين الفاكهة وأماكن النفايات، حيث البذور والحشرات، وفي تبوك يقتات بزهور تباع الشمس، متردداً على محاور الري المركزية.

يعشش الحسون على الأشجار الصغيرة والشجيرات، وعشه متاسق وهش على هيئة كأس من الصوف والأعشاب الناعمة، ويتعاون الزوجان على بناء العش ورعاية الفراخ، وتتولى الأنثى غالباً حضانة البيض.

حسون اليمن

Carduelis yemenensis



يستوطن حسون اليمن المرتفعات الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية، ويقصد غابات العرعر المتاخمة للمناطق الزراعية في المملكة، ويجوب الأرض بحثاً عن طعامه بين النباتات أو في مناطق التربة المكشوفة أو بين الصخور أو جاثماً على الزرع لتناول البذور.

ويفضل التعشيش على الأشجار وبخاصة العرعر.



زمير وردي

Bucanetes githagineus

يقطن الزمير الوردي بأعداده المحدودة الموائل الصخرية الجافة من شبه الجزيرة العربية، ويعد من الطيور الشائعة في جبال طويق وسط الجزيرة العربية.

يققات بالبدور وبعض الحشرات التي يلتقطها من الأرض أو يحفر بمنقاره بحثاً عنها أو أثناء وجوده على شجيرة ما. وقد يضع الزمير الوردي حضنتين في العام في مواسم هطول الأمطار الغزيرة.

الحسون الصحراوي

Rhodospiza obsoleta



كان طائر الحسون الصحراوي زائراً شتوياً مقلداً في المنطقة الشمالية الغربية، وسرعان ما تكاثر في جهات متفرقة. ولا يزال انتشاره في وسط الجزيرة العربية مستمراً.

وبخلاف ما يوحي به اسمه، يعد طائر المناطق الزراعية والحدائق والبساتين، وليس طائر البادية. ويتغذى على بذور الأعشاب والحشائش. وحاجته المستمرة للماء هي السبب في انحصاره في المناطق الزراعية من شبه الجزيرة العربية.

عصفور سيناء الوردي

Carpodacus synoicus

عُرفَ عصفور سيناء الوردي فقط في نطاقه المحصور في الحجار الرملية شمال غرب المملكة، ويعد من الطيور غير الشائعة وغير المهاجرة في الجزيرة العربية.

يتقب عن غذائه في البذور الأرضية، وعند التغذي يجثم على الشجيرات والشجيرات المنخفضة مفضلاً براعم السلة الشائكة، ويعد من الأنواع التي تتنزه فرصة وجود الماء وإن لم يكن بحاجة دائمة إليه.



الدرسات

Emberizidae

جواثم متماثلة السلوك والشكل والحجم، وذات منقار مخروطي مستدق، يرتفع فكها السفلي بانزواء، آكلة للبذور التي تلتقطها من الأرض. وهي عائلة كبيرة من الطيور التي تنطوي على أكثر من ٣٠٠ نوع من ٧٠ جنسا، جميعها - عدا ثلاثة أجناس - توجد في العالم القديم.

درسة اعتيادية


Emberiza calandra



من الطيور الزائرة والمهاجرة شتاءً إلى دول الخليج العربي، وتتردد على المناطق الرحيبة، وبخاصة حقول الحبوب بعيدا عن الأراضي الرطبة والغابات والمناطق الصخرية.

تقتات بالبذور وبمختلف الأنواع النباتية والكائنات غير الفقارية. وتضع عشها في حضرة على التربة أو على سطح شجيرة ما، وتتولى الأنثى حضانة البيض وإطعام الفراخ.

درسة منزلية




Emberiza striolata

تقطن الدراسة المنزلية الأجزاء الشمالية من الإمارات وسلطنة عمان واليمن، فضلاً عن الأجزاء الوسطى والغربية من المملكة، وتعد من الطيور المنتشرة في

المواطن الصخرية والمرتفعات الجافة، ومنحدرات التلال والأودية الصخرية الجافة.

سبب تسميتها يعود إلى قربها من المناطق السكانية. تقطن بالحشرات والكائنات غير الفقارية وبالبدور الساقطة على الأرض أو من النباتات المنخفضة، وكثيراً ما تقوم بالتعشيش في المنازل.

درسة الصخور الإفريقية



Emberiza tahapisi

تتكاثر دراسة الصخور الإفريقية في المرتفعات الغربية من المملكة واليمن، وتنتشر في جزيرة سقطرى.

تعد من طيور المناطق الصخرية وسفوح التلال الخضراء، وترد هذه الطيور شتاءً شجيرات السنط

المتاخمة للمناطق الصخرية ومصادر المياه.

تقطن بالأعشاب والبدور، ويتعاون الزوجان على بناء العش وحضانة البيض ورعاية الفراخ.



درسة سقطرى

Emberiza socotrana

تستوطن جزيرة سقطرى،
وينحصر تكاثرها في منطقة
صغيرة وسط الجزيرة، لذا تعد
من الطيور المهددة بالانقراض.

تتكاثر درسة سقطرى في الجبال،

إذ تفضل المناطق الوعرة، وتجتثم فوق الشجيرات، وتتغذى على مختلف أنواع البذور، وتكاثرها
يكون بشكل جماعي.

الفهرس الألفبائي

- أبلق أبو قانسوة ١٨٨
- أبلق أحمر الصدر ١٨٥
- أبلق أسود أبيض القنة ١٨٧
- أبلق البادية أو الصحراء ١٨٥
- أبلق جنوب الجزيرة العربية ١٨٦
- أبلق حزين ١٨٦
- أبلق هيوم ١٨٧
- الأبله الاعتيادي ٨٧
- أبو المغازل ٦٩
- أبو اليسر المطوق ٧٨
- أبو حناء الأحراش الأحمر ١٨٣
- أبو حناء الأحراش الأسود ١٨٤
- أبو قردان أو بلشون البقر ٣٠
- أبو منجل المقدس ٢٥
- أبوملقة ٢٦
- أبيض العين الحبشي ١٧٤
- أبيض العين الشرقي ١٧٣
- الأطيش البني ٤٠
- الأطيش المقنع ٣٩
- الإوزة المصرية ١٣
- الباشق الحزين الترتيل ٥٢

- باشق قير..... ٥٢
- البجع الأبيض..... ٣٧
- البجع الوردى..... ٣٨
- البجع والإوز والبط..... ١٢
- البط أبو فرة..... ١٤
- بلبل أبيض الخد..... ١٦٠
- بلبل أحمر العجز..... ١٦٠
- بلبل أحمر الوجنة..... ١٥٩
- بلبل أصفر العجز..... ١٦١
- بلشون أسود الرأس..... ٣١
- البلشون الأخضر الظهر أو المخطط..... ٢٩
- البلشون الأرجواني..... ٣٢
- البلشون الجبار..... ٣١
- بلشون الصخر..... ٣٢
- بلشون الليل..... ٢٨
- بلشون رمادي..... ٣٠
- البوقير..... ١٢٧
- البوقير الإفريقي الرمادي..... ١٢٧
- بومة المخازن..... ١٠٥
- بومة بتلر..... ١١٠
- بومة صغيرة..... ١١٠
- بومة نسارية صحراوية..... ١٠٩
- بومة نسارية مرقطه..... ١٠٩

- ١٩٣..... تمير آسيوي
- ١٩٣..... التميز اللامع
- ١٩٢..... تمير سقطرى
- ١٩٢..... تمير فلسطيني
- ١٩١..... تمير وادي النيل
- ١٠٨..... الشج الإفريقي
- ١٠٨..... شج مخطط سوقطري
- ١٠٧..... شج مخطط
- ١٧١..... الثرثارات
- ١٧٢..... الثرثارة العربية
- ١٧١..... ثرثارة عادية
- ٢١٢..... جشنة إفريقية
- ٢١٢..... جشنة طويلة المنقار
- ١٧..... جلم الماء الفارسي
- ٥٧..... الحُبَارَى
- ٥٨..... الحُبَارَى الآسيوية (حُبَارَى شرقية)
- ٥٧..... الحُبَارَى العربية
- ١١..... الحجل الرملي
- ١٠..... الحجل العربي
- ١٠..... حجل فيليبي
- ٩..... الحجل
- ٤٨..... الحدأة السوداء
- ٤٨..... الحدأة ذات الجناح الأسود

| | |
|----------|-------------------------------|
| ٢١٦..... | الحسون الصحراوي |
| ٢١٥..... | حسون اليمن |
| ٢١٥..... | الحسون |
| ٩٤..... | حمام الزيتونى |
| ٩٤..... | حمام الغابات |
| ٩٣..... | حمام جبلي |
| ٩٨..... | حمامة الخضراء |
| ١٥..... | حماماوى أبيض العين |
| ٦٧..... | الحنكور |
| ٦٧..... | الحنكور |
| ٥٤..... | الحوام الطويل الساق |
| ٥٣..... | حوام سقطرى |
| ١٣٩..... | خاطف الذباب الإفريقي الفردوسي |
| ١٨٩..... | خاطف الذباب الجامباغي |
| ١٤..... | الخضاري |
| ٨٤..... | خطاف البحر أبيض الخد |
| ٨٥..... | خطاف البحر الأسحم |
| ٨٣..... | خطاف البحر السريع |
| ٨٤..... | خطاف البحر الصغير |
| ٨٦..... | خطاف البحر الفاحم |
| ٨٢..... | خطاف البحر المتوج الصغير |
| ٨٣..... | خطاف البحر الوردي |
| ٨٢..... | خطاف البحر ساندوتش |

| | |
|----------|---------------------------|
| ١٣٩..... | خطاف الذباب الفردوسي |
| ١٤٥..... | خطاف الصخور الشاحب اللون |
| ٨٥..... | خطاف بحر سوندرز |
| ٨١..... | خطاف بحر قزويني |
| ٨١..... | خطاف بحر نيلي |
| ٨٦..... | خطاف مستنقعات أبيض الجناح |
| ٧..... | الدجاج الغيني أبو خوذة |
| ٧..... | الدجاج الغيني |
| ٦١..... | دجاجة الماء |
| ١١..... | الدراج الرمادي |
| ١٠٠..... | درة برقوقية الرأس |
| ٩٩..... | درة نبيلة |
| ١٠٠..... | درة هندية مطوقة |
| ٢١٩..... | الدرسات |
| ٢١٩..... | درسة اعتيادية |
| ٢٢٠..... | درسة الصخور الإفريقية |
| ٢٢١..... | درسة سقطرى |
| ٢٢٠..... | درسة منزلية |
| ٢١١..... | الذعرات والجشئات |
| ٢١١..... | ذعرة صفراء |
| ٤٩..... | الرخمة المصرية |
| ١٧٥..... | الزرازير |
| ١٧٨..... | زرزور أبيض البطن |

| | |
|----------|--------------------------|
| ١٨٠..... | زرزور أسود..... |
| ١٧٧..... | الزرزور الشائع..... |
| ١٧٦..... | الزرزور المبقّع..... |
| ١٧٧..... | زرزور براهمي..... |
| ١٧٩..... | زرزور سقطرى..... |
| ١٧٩..... | زرزور صومالي..... |
| ١٧٨..... | زرزور فائن..... |
| ٢١٦..... | زمير وردي..... |
| ١١٢..... | سيد الجبال..... |
| ١١٢..... | سيد السهول..... |
| ١١١..... | سيد نوبي..... |
| ١١٤..... | السمامة الشاحبة..... |
| ١١٤..... | سمامة الصرود..... |
| ١١٣..... | سمامة النخيل..... |
| ١١٥..... | سمامة برليوزي..... |
| ١١٥..... | سمامة صغيرة..... |
| ٦٣..... | سمان الشجر الصغير..... |
| ١٢..... | السمان العادي..... |
| ١٢..... | سمان دليجورجوي..... |
| ١٨٩..... | سمنة الصخور الصغيرة..... |
| ١٨١..... | سمنة اليمن..... |
| ١٤٦..... | سنونو أحمر العجز..... |
| ٤٥..... | شاهين مغربي..... |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| ٤٥..... | الشاهين..... |
| ٢٠٦..... | شمعي المنقار الأحمر..... |
| ٢٠٥..... | شمعي المنقار العربي..... |
| ٢٠٦..... | شمعي المنقار المخطط..... |
| ٥٢..... | الشيكر أو الباشق الكستائي..... |
| ١٢١..... | الصدر أسود الرأس..... |
| ١٢١..... | صدر الشجيرات..... |
| ١٢٤..... | صدر رمادي شرقي كبير..... |
| ١٢٤..... | الصدر كستائي الظهر..... |
| ١٢٣..... | الصدر محمر الذنب..... |
| ١٣٥..... | الصدر محمر القنة..... |
| ١٢٧..... | صفيبر ذهبي..... |
| ٤٤..... | الصقر الحر..... |
| ٤٤..... | صقر الغروب..... |
| ٤٣..... | الصقور..... |
| ١١٩..... | صيّاد السمك أبيض الصدر..... |
| ١٢٠..... | صيّاد السمك الأبيض الطوق..... |
| ١١٩..... | صيّاد السمك الرمادي الرأس..... |
| ١٢٠..... | صياد السمك المتوج..... |
| ٢١٤..... | ضخم المنقار السقطري..... |
| ٣٢..... | الطائر الاستوائي الأحمر المنقار..... |
| ١٨..... | طائر النوء الجواني..... |
| ٢٥..... | طيور أبي منجل والطيور الملاعية..... |

- ١٧٢..... طيور أبيض العين
- ١٨٢..... طيور الأبلق وصائدي ذباب العالم القديم
- ٣٩..... طيور الأطيش
- ٩٩..... طيور البغفاء
- ٣٧..... طيور البجع
- ١٥٩..... طيور البلبل
- ٢٧..... طيور البلشون والواق
- ١٠٧..... طيور البوم
- ١٩١..... طيور التميز
- ٩٣..... طيور الحمام واليمام
- ٩..... طيور الدرّاج والحجل
- ٧١..... طيور الزقزاق (رسول الغيث)
- ١١١..... طيور السبد
- ١١٢..... طيور السمامة
- ٦٣..... طيور السمان
- ١٨١..... طيور السمّنة أو الدّج
- ١٤٥..... طيور السنونو والخطاف
- ١١٧..... طيور الشقراق
- ٢٠٥..... الطيور الشمعية المنتقار وطيور المونيا
- ١٣٧..... الطيور الصافرة
- ١٣٣..... طيور الصرد
- ٦٩..... طيور الطُّول والنكات
- ٤٧..... طيور العقاب النسارية والحدأة والنسور

| | |
|----------|--------------------------|
| ٤١..... | طيور الغاق |
| ١٤٧..... | طيور القبرة |
| ٨٩..... | طيور القطاة |
| ٦٥..... | طيور الكروان |
| ٥٩..... | الطيور المائية |
| ٣٣..... | طيور المدار |
| ٣٥..... | الطيور المطرقية الرأس |
| ٢١..... | طيور النحام |
| ٢٠١..... | الطيور النساجة |
| ٧٩..... | طيور النورس والخطاف |
| ١٢١..... | طيور الوروار |
| ٧٥..... | طيور اليقنة |
| ١٠٥..... | طيور بوم الحظيرة |
| ١٧..... | طيور جَلَم الماء والنوء |
| ٢١٣..... | عصافير الحسون |
| ٢٠٩..... | عصافير الشوك |
| ١٩٥..... | عصافير العالم القديم |
| ١٩٦..... | عصفور إسباني |
| ١٩٩..... | عصفور أصفر الرقبة |
| ١٩٧..... | العصفور الذهبي العربي |
| ٢٠٩..... | عصفور الشوك العربي |
| ١٩٨..... | عصفور الصخر الشاحب اللون |
| ١٩٥..... | عصفور دوري |

- ١٩٦.....عصفور سقطرى
- ٢١٧.....عصفور سيناء الوردي
- ١٩٧.....عصفور عبد الكوري
- ١٩٨.....عصفور مسنن المنقار
- ٥٤.....عقاب أصحم
- ٥٥.....العقاب الأسود
- ٥٥.....العقاب الذهبي
- ٥١.....العقاب المصفق
- ٤٧.....العقاب النساري
- ٥٦.....عقاب بونللي
- ٥١.....عقاب صرارة
- ١٤١.....العقق
- ٤٣.....العوسق
- ١٤١.....الغراب
- ٤٢.....غراب البحر السقطري
- ٤١.....غراب البحر
- ١٤٢.....الغراب الدوري
- ١٤٢.....غراب بني العنق
- ١١٨.....غراب زيتوني أوروبي
- ١١٨.....غراب زيتوني حبشي
- ١١٧.....غراب زيتوني هندي
- ١٤٣.....غراب مروحي الذنب
- ٦٢.....الغرة

| | |
|----------|---------------------------------|
| ٢٠..... | غطاس أسود الرقبة..... |
| ١٩..... | الغطاس الصغير..... |
| ٢٠..... | غطاس متوج كبير..... |
| ١٩..... | الغطاسيات..... |
| ٦١..... | الفرفر الأرجواني..... |
| ٢٠٧..... | فضي المنقار الإفريقي..... |
| ٢٠٧..... | فضي المنقار الهندي..... |
| ٢٠٤..... | فودي أحمر..... |
| ١٤٧..... | قبرة الشجر المغنية..... |
| ١٤٩..... | قبرة الصحراء الموشمة الذنب..... |
| ١٥٠..... | قبرة الصحراء..... |
| ١٥١..... | قبرة بلنפורد قصيرة الأصابع..... |
| ١٥٢..... | قبرة تمنك القرناء..... |
| ١٥٢..... | قبرة دان..... |
| ١٤٨..... | قبرة سميقة المنقار..... |
| ١٥٢..... | قبرة سوداء الرأس..... |
| ١٤٩..... | قبرة شرقية صغيرة..... |
| ١٥١..... | قبرة قصيرة الأصابع صغيرة..... |
| ١٥٠..... | قبرة قصيرة الأصابع..... |
| ١٥٢..... | قبرة متوجة..... |
| ١٤٨..... | قبرة هدهدية..... |
| ٩٠..... | القطا المرقط..... |
| ٨٩..... | قطا عراقي..... |

- ٩٠..... قطا كستنائي البطن
- ٩١..... قطا ليشتستين
- ٩١..... قطا متوج
- ٧٢..... قطقاط أبيض الذيل
- ٧٢..... قطقاط أحمر اللغد
- ٧٣..... قطقاط اسكندري
- ٧٤..... قطقاط الرمل الكبير
- ٧١..... قطقاط شوكي الجناح
- ٧٣..... قطقاط مطوق صغير
- ١٨٨..... قليعي أسود الذيل
- ١٨٤..... القليعي المطوق
- ٩٥..... قمري نواح
- ٩٥..... القمري
- ٦٦..... الكروان الجبلي الأرقط
- ٦٥..... الكروان الجبلي
- ٧٧..... كروان عسلي
- ٧٧..... الكروان وأبو اليسر
- ١٥..... الكيش أو أبو مجرف
- ٢٢..... لقلق أبديم
- ٢٢..... اللقلق
- ٦٠..... المرعة الرقطاء
- ٦٠..... المرعة الصغيرة
- ٥٩..... مرعة الماء


| | |
|----------|---------------------|
| ٣٥..... | مطرقى الرأس |
| ١٥٦..... | مغنية سقطرى |
| ٢٠٨..... | مونيا حرشفية الصدر |
| ١٧٦..... | مينة اعتيادية |
| ١٧٥..... | مينة الضفاف |
| ١٢٩..... | ناقر الخشب |
| ١٢٩..... | ناقر الخشب العربي |
| ٢١..... | النحام الكبير |
| ٢٠٢..... | نساج بايا |
| ٢٠٢..... | نساج ذهبي الظهر |
| ٢٠١..... | نساج روبل |
| ٢٠٢..... | نساج مخطط |
| ٢٠٢..... | نساج مقنع صغير |
| ٥٠..... | النسر الأوزن |
| ٤٩..... | النسر الملتهجي |
| ٥٠..... | نسر جريزون |
| ٢١٤..... | نعار اليمن |
| ٢١٢..... | نعار عربي |
| ٥..... | النعام |
| ١٦٨..... | نقشارة الغاب البنية |
| ٧٠..... | النكات |
| ١٥٧..... | نممة الشجر |
| ٧٩..... | نورس أبيض العين |

| | |
|----------|-------------------------|
| ٨٠..... | النورس الفاحم |
| ٨٠..... | النورس المستدق المنقار. |
| ١٥٥..... | الهازجات |
| ١٦٣..... | هازجات العالم القديم |
| ١٦٦..... | هازجة القصب الأوروبية. |
| ١٦٥..... | هازجة القصب الصيّاحة |
| ١٦٤..... | هازجة القصب الكبيرة |
| ١٦٩..... | هازجة اليمن |
| ١٦٥..... | الهازجة ذات الشارب |
| ١٥٧..... | هازجة رشيقة |
| ١٦٧..... | هازجة زيتونية |
| ١٦٣..... | هازجة سايف |
| ١٦٧..... | هازجة سايك |
| ١٥٦..... | هازجة سقطرى |
| ١٦٨..... | هازجة عربية. |
| ١٦٦..... | هازجة قصب البحر الأحمر |
| ١٦٤..... | هازجة قصب البصرة |
| ١٥٥..... | هازجة مروحية الذنب |
| ١٢٥..... | الهدهد |
| ١٢٥..... | الهدهد |
| ٢٩..... | واق أبيض صغير |
| ٢٨..... | واق أصفر أو صيني |
| ٢٧..... | الواق الصغير |

- ١٢١.....وروار أبيض الزور
- ١٢٢.....وروار أزرق الخد
- ١٢٣.....وروار أوروبي
- ١٢٢.....وروار شرقي صغير
- ١٠١.....الوقواق الراهب
- ١٠٣.....وقواق أو كوكال أبيض الحاجب
- ١٠٢.....وقواق ديدريك
- ١٠٢.....وقواق كلاس
- ١٠١.....الوقواق
- ٧٥.....يقنة متدرجة الذيل
- ٩٧.....يمام أحمر العين أو شبه المطوق
- ٩٧.....اليمام الضاحك
- ٩٦.....اليمام المطوق
- ٩٨.....يمام طويل الذنب
- ٩٦.....يمام مطوق إفريقي

أطلس الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية

نشر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام ٢٠١٠م ضمن سلسلة كتب «حيوانات شبه الجزيرة العربية» Fauna of Arabia. يحوي تفاصيل علمية توثق توزيع الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية. أعدّه «مايكل جينيغز» الذي بدأ العمل فيه عام ١٩٨٤م.



عن الكتاب

اقتبس محتوى هذا الكتاب من الكتاب المترجم «أطلس الطيور المتكاثرة في شبه الجزيرة العربية». روعي في إعداده توثيق كافة الطيور التي تضمنها الكتاب باختصار وبلغة سهلة وميسرة لتلائم القارئ العادي.

المعدان

د. دحام بن إسماعيل العاني

حاصل على دكتوراه دولة في التقنية الحيوية من فرنسا. مستشار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدير إدارة إعداد التقارير العلمية بها.

أ. خالد بن محمد الطاسان

باحث في إدارة إعداد التقارير العلمية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على توفير المعرفة للقارئ العربي. فقامت في هذا الإطار بنشر سلسلة من الكتب والمجلات العلمية وأتاحها للقراء دون مقابل بصيغتها الرقمية والورقية. فجميع إصدارات المدينة متاحة على موقعها الإلكتروني ليتمكن المتصفح من تحميلها أو قراءتها على الإنترنت.



مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST

الموقع الإلكتروني: www.kacst.edu.sa
إصدارات المدينة: publications.kacst.edu.sa
البريد الإلكتروني: awareness@kacst.edu.sa

ردمك: ٦-٨٤-٨٠٤٩-٦٠٣-٩٧٨

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
هاتف: ٠١١ ٤٨٨٣٤٤٤ - ٠١١ ٤٨٨٣٥٥٥
فاكس: ٠١١ ٤٨٨٣٧٥٦
ص.ب. ٦٠٨٦ الرياض ١١٤٤٢
المملكة العربية السعودية