



الوحدة 9

المتتاليات والمتسلسلات



مشروع الوحدة

المبالغ المالية الكبيرة

يستخدم الطلاب ما تعلموه عن المتتاليات والمتسلسلات لإكمال مشروع.

يتناول مشروع هذه الوحدة المعرفة المالية، والعديد من المهارات الخاصة الضرورية لنجاح الطالب في إطار عمل التعلم في القرن الواحد والعشرين.

المشروعات **الأساسية** قدم المفردات الأساسية في الوحدة متبعا النظام التالي.

عرّف: الحد هو أي رقم في متسلسلة.

مثال: الحد الرابع في المتتالية التالية هو 29, 2, 11, 20, 29, 39, ...

اطرح السؤال التالي، ما الحد الأول في المتتالية أعلاه؟ 2

لماذا؟

الاستدامة والبيئة تظهر الرياضيات عبر المظاهر الطبيعية بطرق مذهلة. فتتجلى متتالية فيبوناتشي في السورن والأزهار ومحايط السحور والمكلمة والخمصرات. كذلك قد تساهم المتتاليات والمتسلسلات في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال زيادة فعالية أنظمة تصفية المياه.


الحالي

- ستقوم بما يلي:
- استخدام المتتاليات والمتسلسلات الحسابية والهندسية.
- استخدام المتتاليات الخاصة ودوال التكرار.
- تشكيل الأسس باستخدام نظرية ذات الجدين.
- مهنة الفنارات باستخدام الاستقراء الرياضي.

السابق

- كنت تتحول التعابير الجبرية لأبسط صورها وأوجدت قيمتها.

إجابات إضافية (الاستعداد للوحدة 9)






الأسئلة الأساسية

- أين توجد الأنماط في الحياة اليومية؟ الإجابة النموذجية: في الطبيعة والهندسة المعمارية والموسيقى والعلوم والفن
- كيف يمكنك تمييز الأنماط التي تساعدك على حل مسائل من الحياة اليومية؟ الإجابة النموذجية: يساعدك تمييز الأنماط في توقع السلوكيات المستقبلية.

الاستعداد للوحدة

مراجعة سريعة	تدريب سريع
<p>مثال 1 (مستخدم في الدروس من 9-1 إلى 9-3) أوجد حل $25 = 3x^2 + 400$</p> <p>المعادلة الأصلية اطرح 400 من الطرفين. اقسم الطرفين على 3. أوجد الجذر التكعيبي للطرفين. بسط.</p> $25 = 3x^2 + 400$ $-375 = 3x^2$ $-125 = x^2$ $\sqrt{-125} = \sqrt{x^2}$ $-5 = x$	<p>أوجد حل كل من المعادلات التالية.</p> <ol style="list-style-type: none"> $-6 = 7x + 78$ $x = -12$ $768 = 3x^4$ $x = \pm 4$ $23 - 5x = 8$ $x = 3$ $2x^2 + 4 = -50$ $x = -3$ <p>5. النباتات لدى ليلي 48 نباتاً في حديقتين خاصتين بها. وترجع 12 نباتاً في الحديقة الصغيرة. أما في الحديقة الكبيرة، فتزيد زراعة 4 نباتات في كل صنف. ما عدد الصنوف التي ستكون لديها؟ 9 صنوف</p>
<p>مثال 2 (مستخدم في الدروس من 9-1 إلى 9-5) مثل الدالة بيانياً $(1, 0), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)$. حدد المدى والمجال.</p> <p>مجال الدالة هو مجموعة جميع الاحتمالات لقيم x. إذا مجال هذه الدالة هو $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ مدى لقيم y إذا مدى هذه الدالة هو $\{1, 4, 9, 16, 25\}$</p> 	<p>مثل كل دالة بيانياً. 6-9. انظر الهامش.</p> <ol style="list-style-type: none"> $\{(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11)\}$ $\{(1, -15), (2, -12), (3, -9), (4, -6), (5, -3)\}$ $\{(1, 27), (2, 9), (3, 3), (4, 1), (5, \frac{1}{5})\}$ $\{(1, 1), (2, 2), (3, \frac{3}{2}), (4, \frac{4}{4}), (5, \frac{25}{8})\}$ <p>10. الرعاية الصباحية يتكلم مركز رعاية أطفال AED 450 في اليوم ويتقاضون AED 150 من كل طفل في اليوم. ونسج الدالة $P(c) = 150c - 450$ مبلغ المال الذي يجنيه المركز عند وجود عدد c من الأطفال. ما أرباح الربح الذي سيجمعه المركز إذا كان يوجد به 8 أطفال؟ AED 750</p>
<p>مثال 3 (مستخدم في الدروس من 9-1 إلى 9-5 و 9-8) أوجد قيمة $2 \cdot 3^{x+y} - 2 \cdot 3^{-2} + (-3)$ عوف. بسط. أعد الكتابة بأش موجب. أوجد قيمة الأس.</p> $2 \cdot 3^{x+y} - 2 \cdot 3^{-2} + (-3)$ $= 2 \cdot 3^{-4}$ $= \frac{2}{3^4}$ $= \frac{2}{243}$	<p>أوجد قيمة كل تعبير في ضوء قيمة (قيم) المتغير (المتغيرات).</p> <ol style="list-style-type: none"> $\frac{a}{b} + c$ إذا كان $a = 9$, $b = -2$, $c = -8$ -30 $f + (n - 2)f$ إذا كان $f = 15$, $n = 5$, $f = -1$ $x \cdot y \cdot z + 1$ إذا كان $x = -2$, $y = \frac{1}{3}$, $z = 5$ $-\frac{2}{729}$ $\frac{a^2 - b^2}{1 - a}$ إذا كان $a = -3$, $b = -4$, $c = 1$ -15





المطويات | منظم الدراسة

المطويات @ دينا زاويك

التركيز يسجل الطلاب الملاحظات والأمثلة على التسلسلات والمتتاليات في بطاقات فهرسة ويضعونها في حافظة مناسبة من مطوياتهم.

التدريس اجعل الطلاب يصنعوا مطوياتهم ويسوها كما هو موضح. ينبغي أن يستخدم الطلاب مطوياتهم في كتابة الملاحظات وتقديم الحدود وتسجيل المفاهيم وتقديم الأمثلة على المتتاليات والمتسلسلات في بطاقات الفهرسة. وبعد ذلك، ينبغي وضع البطاقات في الحافظة المناسبة.

وقت الاستخدام شجّع الطلاب على إضافة المزيد من المعلومات إلى المطويات أثناء دراسة الوحدة وعلى استخدام تلك المطويات عند المراجعة للاستعداد لاختبار الوحدة.

البدء في هذه الوحدة

ستتعلم عدة مفاهيم ومهارات ومفردات جديدة أثناء دراستك للوحدة 9. ولكي تستعد، حدد المفردات المهمة ونظم مواردك.

المفردات الجديدة

العربية

sequence متتالية
finite sequence متتالية منتهية
infinite sequence متتالية غير منتهية
arithmetic sequence متتالية حسابية
common difference فرق مشترك
geometric sequence متتالية هندسية
common ratio نسبة مشتركة
arithmetic means أوساط حسابية
series متسلسلة
arithmetic series متسلسلة حسابية
partial sum المجموع الجزئي
geometric means أوساط هندسية
geometric series متسلسلة هندسية
convergent series متسلسلة تقاربية
divergent series متسلسلة تاعدية
recursive sequence متتالية تكرارية
iteration الإعادة
mathematical induction الاستقراء الرياضي
induction hypothesis فرضية الاستقراء

المطويات | منظم الدراسة

المتتاليات والمتسلسلات ابتكر المطوية التالية لسماعتك في تنظيم ملاحظات الوحدة 9 من المتتاليات والمتسلسلات. وأبدأ بورقة واحدة أعادها $8\frac{1}{2}$ في 11 .

- اطو الورقة إلى نصفين. مع مطوية الأضلاع القصيرة.
- افرد واطو الجلع الأطول لأعلى لعمل جيب.
- دهس الحواف الخارجية أو أضعها لإكمال الجيب.
- اكتب اسم كل ضلع كما هو موضح. استخدم بطاقة الفهرسة لتسجيل الملاحظات والأمثلة.

مراجعة المفردات

العامل (coefficient) العامل العددي لذات الحد

معامل

$15x^3$

الصيغة (formula) جملة رياضية تصف عن العلاقة بين كميات بعضها

الدالة (function) علاقة يقرن فيها كل عنصر من المجال بعنصر واحد بالتحديد في المدى





الدرس 9-1

1 التركيز

التخطيط الواسي

قبل الدرس 9-1 تحليل الدوال الخطية والأسية.

الدرس 9-1 ربط المتتاليات الحسابية بالدوال الخطية. وربط المتتاليات الهندسية بالدوال الأسية.

بعد الدرس 9-1 استخدم المتسلسلات والمتتاليات الحسابية والهندسية والأشكال الأخرى من المتسلسلات والمتتاليات لحل مسائل من الحياة اليومية.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة قسم **لماذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

- ما النمط الذي يؤديه عازفو الفرقة الموسيقية؟ **1, 3, 5, 7, ...**
- كيف يمكنك إيجاد الأعداد الأربعة التالية في النمط؟ أضف **2** لكل صف متتابع لإيجاد عدد عازفي الفرقة الموسيقية في ذلك الصف.
- ما الأعداد الأربعة التالية؟ **9, 11, 13, 15**
- هل تتوقع أن يستمر هذا النمط إلى ما لا نهاية؟ لا. فهناك حد لعدد صفوف العازفين.

9-1 المتتاليات كدوال

لماذا؟

- خلال الفترة المدرسية، تتحرك مجموعة من الطلاب، وينتقلون مرة واحدة أيام السبت، ويوجد بالصف التالي ثلاث طلاب.
- ويوجد خمسة طلاب بالصف التالي. ويستمر هذا النمط لبقية الصفوف.

المسابق

- فما تحليل الدوال الخطية والأسية.

الجواب

- 1 ربط المتتاليات الحسابية بالدوال الخطية.
- 2 ربط المتتاليات الهندسية بالدوال الأسية.

1 متتاليات حسابية هي مجموعة من الأعداد تأخذ ترتيب أو نمط محدد. ويطلق على كل عدد في المتتالية **حد**. وقد تكون المتتالية **متتالية منتهية** وتحتوي على أعداد محددة، مثل $(-2, 0, 2, 4, 6)$. أو قد تكون **متتالية غير منتهية** وتستمر دون نهاية مثل $(0, 1, 2, 3, \dots)$. يرمز إلى الحد الأول من المتتالية بالرمز a_1 ويرمز إلى الحد الثاني بالرمز a_2 وهكذا.

المفهوم الأساسي: المتتاليات في صورة دوال

الشرح	1	2	3	...	n
المتتالية هي دالة يتكون مجالها من أعداد طبيعية. ويتكون مداها من أعداد حقيقية.					
الرموز	الحد	a_1	a_2	a_3	a_n
الحدود المتتالية	0_1	0_2	0_3	...	0_n
أمثلة	متتالية غير منتهية (3, 6, 9, 12, 15, ...)	متتالية منتهية (3, 6, 9, 12, 15)	الجدال: {1, 2, 3, 4, 5}	الجدال: {3, 6, 9, 12, 15}	الجدال: {1, 2, 3, 4, 5}
	الجدال: {3, 6, 9, 12, 15}	الجدال: {3, 6, 9, 12, 15}	الجدال: {1, 2, 3, 4, 5}	الجدال: {3, 6, 9, 12, 15}	الجدال: {3, 6, 9, 12, 15}

في **المتتالية الحسابية** يتحدد كل حد من خلال إضافة قيمة ثابتة إلى الحد السابق. ويطلق على هذه القيمة الثابتة **الفرق المشترك**.

أصل المتتالية 3, 6, 9, 12, 15 حماية. وذلك لأن الحدود لها نفس الفرق المشترك. وكل حد يزيد عن الحد الذي يسبقه بمقدار 3 أضعاف.

$$3 \quad 6 \quad 9 \quad 12 \quad 15$$

$$+2 \quad +3 \quad +3 \quad +3$$

مثال 1 تحديد المتتاليات الحسابية

a. $5, -6, -17, -28, \dots$

$$5 \quad -6 \quad -17 \quad -28$$

$$-11 \quad -11 \quad -11$$

الفرق المشترك هو -11.

المتتالية حسابية.

b. $-4, 12, 28, 42, \dots$

$$-4 \quad 12 \quad 28 \quad 42$$

$$+16 \quad +16 \quad +14$$

لا يوجد فرق مشترك.

هذه ليست متتالية حسابية.

تمرين موجه

1A. $7, 12, 16, 20, \dots$ **نعم**

1B. $-6, 3, 12, 21, \dots$ **نعم**

المفردات الجديدة

متتالية sequence

حد term

متتالية منتهية finite sequence

متتالية غير منتهية infinite sequence

متتالية حسابية arithmetic sequence

فرق مشترك common difference

متتالية هندسية geometric sequence

نسبة مشتركة common ratio

مهارات في الرياضيات

التفكير بطريقة تعريفة وكيفية محاولة إيجاد البنية واستخدامها

McGraw-Hill Education | جميع الحقوق محفوظة

472 / 38



يمكن استخدام الفرق المشترك لإيجاد حدود المتتالية الحسابية.

مثال 2 التمثيل البياني للمتتالية الحسابية

فكر في المتتالية الحسابية ... 18, 14, 10, ...
 أوجد الحدود الأربعة التالية للمتتالية.

الخطوة 1 لتحديد الفرق المشترك، اطرح أي حد من الحد التالي له مباشرة. الفرق المشترك هو -4 أو $10 - 14$.


الخطوة 2 لإيجاد الحد التالي، أضف -4 إلى الحد الأخير.

استمر في إضافة -4 لإيجاد الحدود التالية.

$$10 \quad 6 \quad 2 \quad -2 \quad -6$$

$$+(-4) \quad +(-4) \quad +(-4) \quad +(-4)$$

الحدود الأربعة التالية هي 6 و 2 و -2 و -6 .



ب مثل الحدود السبعة الأولى من المتتالية بيانياً.
 يسئوي المحال على العناصر {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} ويحتوي المحور على العناصر {18, 14, 10, 6, 2, -2, -6} وبذلك، مثل الأزواج المرفقة المعادلة بيانياً.

تمرين موجه

2. أوجد الحد الرابع في المتتالية الحسابية ... 18, 11, 4, ...
 انظر الهامش.

لاحظ أن التمثيل البياني لحدود المتتالية الحسابية يقع على مستقيم واحد. وهذه المتتالية الحسابية دالة خطية تكون فيها رتبة الحد n هو المتغير المستقل، والحد a_n هو المتغير التابع. والفرق المشترك هو ميل المستقيم.

مثال 3 من الحياة اليومية إيجاد حد

الفرقة المدرسية راجع بداية الدرس، يفرض أن مخرج العرض يريد تحديد عدد الطلاب المشاركين في الصف الرابع عشر خلال سير الفرقة.

الاستيعاب نظراً لأن الفرق بين أي صفين متتاليين هو 2 ، فإن الفرق المشترك للمتتالية هو 2 .
 التخطيط استخدم صيغة الميل والنقطة للمتتالية افترض أن $m = 2$ و $(x_1, y_1) = (3, 5)$ ثم حل لإيجاد قيمة $x = 14$.

$(y - y_1) = m(x - x_1)$	صيغة الميل والنقطة	الحل
$(y - 5) = 2(x - 3)$	$(y - 5) = 2(x - 3)$	$m = 2$
$y - 5 = 2x - 6$	أضرب	
$y = 2x - 1$	أضف 5 إلى الطرفين	
$y = 2(14) - 1$	عوض عن x بالعدد 14	
$y = 28 - 1$	بسّط	
$y = 27$		

التحقق يمكنك إيجاد حدود المتتالية عن طريق جمع 2 بداية من الصف 1، وحتى تصل إلى الصف 14

تمرين موجه

3. المال يفرض صاحب العمل على أسامه أجر بقيمة AED 33 لكل ساعة بالإضافة إلى AED 0.50 علاوة كل 10 أشهر، ما إجمالي المبلغ الذي سيتقاضاه أسامة لكل ساعة بعد 3 أشهر؟ AED 39



الربط بالحياة اليومية
 كل ما نتعلمه قراءة 100 فرقة في بطولات الوطنية الكبرى التي تقام في أمريكا (فرق أمريكا) المصنوع من أمريكا

1 المتتاليات الحسابية

المثال 1 بين كيفية تحديد ما إذا كان هناك فرق مشترك لمتتالية، وإن وجد، فكيف نحدد المتتالية على أنها حسابية. و**المثال 2** كيفية استخدام الفرق المشترك لإيجاد حدود المتتالية الحسابية وكيف تمثل حدود المتتالية بيانياً. و**المثال 3** كيفية إيجاد حد في متتالية حسابية معطاة لحل مسألة من الحياة اليومية.


التقويم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تدريبات موجهة" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

أمثلة إضافية

- حدد ما إذا كانت كل متتالية هي متتالية حسابية أم لا. اكتب نعم أو لا.
 a. $-3, -8, -13, -23, \dots$
 b. $-8, -2, 4, 10, \dots$ نعم


- تأمل المتتالية الحسابية $-8, -6, -4, \dots$
 a. أوجد الحدود الأربعة التالية للمتتالية. $-2, 0, 2, 4$
 b. مثل بيانياً الحدود السبعة الأولى للمتتالية.



- فرقة عزف استخدم المعلومات الواردة في المثال 3 لتحديد عدد العازفين في الصف رقم 20 أثناء العرض. 39

إجابة إضافية (تمرين موجه)

2. $-3, -10, -17, -24$



انتبه!

تجنب المفاهيم الخاطئة تأكد من فهم جميع الطلاب أن العدد أسفل السطر في a_n يشير إلى الحد، ولا يُعدّ أساً.





2 المتتاليات الهندسية

المثال 4 كيفية تحديد ما إذا كان للمتتالية نسبة مشتركة وإذا لم يكن لها. فبين كيفية تحديد المتتالية على أنها متتالية هندسية. ويوضح **المثال 5** كيفية استخدام النسبة المشتركة لتحديد المزيد من الحدود في متتالية هندسية وكيفية تخطيط تلك الحدود بيانياً. وبين **المثال 6** كيفية تحديد ما إذا كانت المتتالية حصرية أو هندسية أو ليست أيًا منهما.


أمثلة إضافية

4 حدد ما إذا كانت المتتالية هندسية أم لا. اكتب نعم أو لا.

- a. 8, 20, 50, 125, ... **نعم**
 b. 19, 30, 41, 52, ... **لا**


5 تأمل المتتالية الهندسية 10, 15, 22.5, ...

- a. أوجد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية.
33.75, 50.625, 75.9375
- b. مثل بيانياً الحدود الستة الأولى للمتتالية.




إجابة إضافية (تمرين موجه)

5. 189, 567



2 المتتالية الهندسية تعد المتتالية الهندسية نوعاً آخر من المتتاليات. في **المتتالية الهندسية** يتم تحديد كل حد من خلال ضرب ثابت غير صفري في الحد السابق. ويطلق على هذا الثابت **النسبة المشتركة**. تأمل المتتالية 16, 4, 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$. هذه متتالية هندسية لأن الحدود لها نفس النسبة المشتركة. وكل حد أكبر من الحد السابق له بـ 4 مرات.



مثال 4: تحديد المتتاليات الهندسية

حدد ما إذا كانت كل متتالية هندسية.

a. -2, 6, -18, 54, ...

$$\frac{6}{-2} = -3, \quad \frac{-18}{6} = -3, \quad \frac{54}{-18} = -3$$

أوجد نسب الحدود المتتالية.

النسب متساوية، إذا فالمتتالية هندسية.

b. 8, 16, 24, 32, ...

$$\frac{16}{8} = 2, \quad \frac{24}{16} = 1.5, \quad \frac{32}{24} = 1.33$$

النسب ليست متساوية، إذا فالمتتالية ليست هندسية.

تمرين موجه

4A. -8, 2, -0.5, 0.125, ... **نعم**

4B. 1, 3, 7, 15, ... **لا**

أنتبه!
النسب إذا أوجدت نسبة حد إلى الحد السابق له، فأنت تبحث النسب المضافة بالطريقة نفسها.

عند متحك مجموعة من المعلومات، يمكنك إنشاء مسألة ترتبط بمسألة.


مثال 5: تخطيط متتالية هندسية بيانياً

فكر في المتتالية الهندسية ... 32, 8, 2.

h. أوجد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية.

التحدي 1 أوجد قيمة النسبة المشتركة، $\frac{2}{8}$ أو $\frac{1}{4}$.

التحدي 2 لإيجاد الحد التالي، اضرب الحد السابق في $\frac{1}{4}$. استمر في الضرب في $\frac{1}{4}$ لإيجاد الحدود التالية.



الحدود الثلاثة التالية هي $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{32}$.


b. مثل بيانياً الحدود الستة الأولى للمتتالية.

الحال: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

البيانات: $\left\{32, 8, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{32}\right\}$

تمرين موجه

5. أوجد الحدين التاليين في ... 7, 21, 63, ثم مثل الحدود الستة الأولى بيانياً. **انظر الهامش.**



المتابعة

انتهى الطلاب من استكشاف المتتاليات.

اطرح السؤال التالي:


- ما أنواع الأنشطة التي يمكن تشييدها بالنماذج رياضياً؟ الإجابة النموذجية: الأنشطة العددية التي تشمل على عمليات بأعداد حقيقية مثل الجمع والضرب






الحس التنبيل البياني في المثال 5 في حين أن التنبيل البياني للمتتالية الحسابية يكون خطية فإن التنبيل البياني للمتتالية الهندسية يكون أسياً ويمكن تشبيهه بواسطة $f(x) = a^x$ حيث a هي النسبة المشتركة، $a > 0$ و $a \neq 1$.

مراجعة المفردات
العلاقة الأسية $y = a^x$ في صورة $b > 0$ حيث $f(x) = b^x$ و $b \neq 1$.



x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40



x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	2	4	8	16	32	64

المتتاليات الحسابية والهندسية هي دوال يكون فيها المجال معرفاً بواسطة عدد الحدود n وتضمن مجموعة أو مجموعة فرعية لأعداد صحيحة موجبة. ويمكن استخدام خواص المتتاليات الحسابية والهندسية لتصنيف المتتاليات.

مثال 5 تصنيف المتتاليات

حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية أم هندسية أم غير ذلك. اشرح استنتاجك.

a. 16, 24, 36, 54, ...

تحقق من وجود فرق مشترك.
 $54 - 36 = 18$ $36 - 24 = 12$ ✗
 تحقق من وجود نسبة مشتركة.
 $\frac{54}{36} = \frac{3}{2}$ $\frac{36}{24} = \frac{3}{2}$ $\frac{24}{16} = \frac{3}{2}$ ✓
 نظراً لوجود نسبة مشتركة، فإن المتتالية هندسية.

b. 1, 4, 9, 16, ...

تحقق من وجود فرق مشترك.
 $16 - 9 = 7$ $9 - 4 = 5$ ✗
 تحقق من وجود نسبة مشتركة.
 $\frac{16}{9} = 1.7$ $\frac{9}{4} = 2.25$ ✗
 نظراً لعدم وجود فرق مشترك أو نسبة مشتركة، فإن المتتالية ليست حسابية ولا هندسية.

c. 23, 17, 11, 5, ...

تحقق من وجود فرق مشترك.
 $5 - 11 = -6$ $11 - 17 = -6$ $17 - 23 = -6$ ✓
 نظراً لوجود فرق مشترك، فإن المتتالية حسابية.

- 6A. حسابية؛ الفرق المشترك هو $\frac{1}{3}$.
- 6B. هندسية؛ النسبة المشتركة هي $\frac{3}{4}$.
- 6C. ليست أي منهما؛ فلا يوجد فرق مشترك ولا نسبة مشتركة.

تمرين موجه

6A. $\frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}, \dots$ 6B. $2, -\frac{3}{2}, \frac{9}{8}, -\frac{27}{32}, \dots$ 6C. $-4, 4, 5, -5, \dots$

مثال إضافي

- 6 حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية أم هندسية أم ليس أيًا منهما. اشرح استنتاجك.
- a. 13, 25, 37, 49, ...
 - حسابية. الفرق المشترك هو 12.
 - b. 2, 5, 9, 14, ...
 - ليس أيًا منهما؛ فلا يوجد فرق مشترك ولا نسبة مشتركة.
 - c. 6, -12, 24, -48, ...
 - هندسية؛ النسبة المشتركة هي -2.

التركيز على محتوى الرياضيات

المتتاليات ليست كل قوائم الأعداد التي تتبع نمطاً معيناً تكون هندسية أو حسابية. علماً بأن هذا سيسعد الطلاب للدرس 9-5 في المتتاليات الخاصة التي تسمى المتتاليات التكرارية.

التدريس باستخدام التكنولوجيا

الرسائل الفورية اطلب من الطلاب العمل في مجموعات. وأن يكتب كل طالب معادلة لإنشاء متسلسلة. ويرسل رسالة بالمتتالية فقط لطالب آخر. ويجب على كل طالب بعد ذلك إيجاد معادلة للمتتالية التي استلمها والإجابة عنها.

تدريس الممارسات في الرياضيات

الاستنتاج المنطقي يبدأ الطلاب المتفوقون في الرياضيات بشرح معنى المسألة لأنفسهم والبحث عن نقاط بدء الحل. ويحللون المعطيات. والقيود والعلاقات والأهداف. ويتأكد الطلاب المتفوقون رياضياً من أجوبتهم عن المسائل باستخدام طريقة مختلفة. ويسألون أنفسهم باستمرار: "هل هذا جواب منطقي؟"

التوافق يلاحظ الطلاب المتفوقون في الرياضيات تكرار العمليات الحسابية إن وجدت ويبحثون عن الطرق العامة والمختصرة معنا. ويحافظ الطلاب المتفوقون في الرياضيات على مراقبة العملية أثناء العمل على حل المسألة مع الانتباه إلى التفاصيل.

التدريس المتميز

المتعلمون بطريقة التواصل قسّم الطلاب في مجموعات صغيرة وناقشهم في أي التباسات قد تكون لديهم حول المفاهيم الأساسية للمتتاليات الحسابية والهندسية. اقترح عليهم مساعدة بعضهم البعض في تنظيم ملاحظاتهم بشأن هذه الموضوعات وإشامها.



3 التمرين

التقويم التكويني


استخدم التمارين 1-20 للتحقق من استيعاب الطلاب.
استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

ملاحظات لحل التمرين


ورق الرسم البياني للتمارين 5-8 و 14-17 و 25-30 و 39-44 و 68-73.
سيحتاج الطلاب إلى ورق رسم بياني.

إجابات إضافية


5. 42, 54, 66, 78




6. -12, -21, -30, -39



7. 5, 13, 21, 29



8. -47, -54, -61, -68



551

التحقق من فهمك

- 1 مثال حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية أم لا. اكتب نعم أو لا.
1. 8, -2, -12, -22, نعم
2. -19, -12, -5, 2, 9 نعم
3. 1, 2, 4, 8, 16 لا
4. 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, ... لا
2 مثال أوجد الحدود الأربعة التالية لكل متتالية حسابية. ثم مثل المتتالية بيانياً.
5. 6, 18, 30, ... 5-8 انظر الهامش.
6. 15, 6, -3, ...
7. -19, -11, -3, ... 8. -26, -33, -40, ...
3 مثال 9. المعرفة العالية تدفع ياسمين من أموالها لشراء سيارة. ولديها AED 950 لكنها تخطط لأخذ AED 320 كل أسبوع من مبالغها في مجالسة الأطفال.
8. كم ستدخر ياسمين بعد 8 أسابيع؟ AED 3,510
b. إذا كانت السيارة تكلف AED 7,350 فكم من الوقت ستستغرق لإدخار مال كاف لهذا السعر؟ 20 أسبوع عمل
4 مثال حدد ما إذا كانت المتتالية هندسية أم غير ذلك. اكتب نعم أو لا.
10. -8, -5, -1, 4, ... لا
11. 4, 12, 36, 108, ... نعم
12. 27, 9, 3, 1, ... نعم
13. 7, 14, 21, 28, ... لا
5 مثال أوجد الحدود الثلاثة التالية لكل متتالية هندسية. ثم مثل المتتالية بيانياً.
14. 8, 12, 18, 27, ... 15. 8, 16, 32, 64, ...
16. 250, 50, 10, 2, ... 17. 9, -3, 1, -1/3, ...
6 مثال حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية، أم هندسية، أم غير ذلك. أشرح استنتاجك. 18. ليس أي منهما؛ فلا يوجد فرق مشترك ولا نسبة مشتركة.
18. 5, 1, 7, 3, 9, ... 19. 200, -100, 50, -25, ... 20. 12, 16, 20, 24, ...
19. هندسية؛ النسبة المشتركة هي 1/3. 20. حسابية؛ الفرق المشترك هو 4.

التدريب وحل المسائل

- 1 مثال حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية أم لا. اكتب نعم أو لا.
21. 1/2, 3/4, 1, 5/4, ... لا
22. -9, -3, 0, 3, 9 لا
23. 34, -5, -19, ... لا
24. 2/9, 5/9, 8/9, 11/9, ... نعم
2 مثال أوجد الحدود الأربعة التالية لكل متتالية حسابية. ثم مثل المتتالية بيانياً.
25. -4, -1, 2, 5, ... 26. 10, 2, -6, -14, ... 27. -5, -11, -17, -23, ...
28. -19, -2, 15, ... 29. 1/5, 4/5, 7/5, ... 30. 2/3, -1/3, -4/3
3 مثال 31. اشرح هناك 28 متعدداً في الصف الأول بالمسرح. وكل صف نالي يتضمن متعديناً أكثر من الصف السابق. إذا كان هناك 24 متعدداً في الصف الأخير بالمسرح؟ 74
32. التبرير المنطقي بدأ إبراهيم برنامجاً تدريبياً لرفع مستوى اللياقة البدنية. ويخطط للتدريب لمدة 5 دقائق على أنه التدريب الخاص به في اليوم الأول. ثم يزيد فترة التدريب بعدد دقيقة وثلثين ثانية كل يوم.
a. ما العدد التي سيتخطاها في التدريب خلال اليوم الثامن عشر؟ 30 دقيقة و 30 ثانية
b. في أي يوم سيحدث جمال لمدة ساعة أو أكثر لأول مرة؟ في اليوم الثامن والثلاثين
c. هل من المعقول أن يستمر هذا النمط إلى ما لا نهاية؟ اشرح.
32c. الإجابة النموذجية: هذا غير معقول لأنه لا يوجد سوى عدد ساعات محدود في اليوم يمكن تخصيصه للتدريب.

551

خيارات الواجب المنزلي المتميزة

المستوى	الواجب	خيار اليومين
متقدم (M)	21-50, 54, 55, 57-80	54, 55, زوجي 22-50, 57-60, 65-80
أساسي (OL)	21-49, 51-53, 54, 55, 57-60, 61-80	21-50, 61-64
متقدم (M)	51-74, (75-80 اختياري)	



472 / 42





إجابة إضافية

59. الإجابة النموذجية: إذا كان لمتتالية هندسية نسبة r مثل $|r| < 1$. حيث إن n زداد، وتتناقص القيمة المطلقة للحدود وتقترب من الصفر نظرا لضربها في الكسر باستمرار. إذا كان $|r| \geq 1$. فإن القيمة المطلقة للحدود ستزداد وتقترب إلى قيمة اللانهائية نظرا لضربها في قيمة أكبر من 1 باستمرار.

- مثال 4 حدد ما إذا كانت المتتالية هندسية أم غير ذلك. اكتب نعم أو لا.
33. 21, 14, 7, ... **لا** 34. 124, 186, 248, ... **لا** 35. -27, 18, -12, ... **نعم**
36. 162, 108, 72, ... **نعم** 37. $\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{16}, \dots$ **لا** 38. -4, -2, 0, 2, ... **لا**
- أوجد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية. لو مكن المتتالية بيانها. **انظر ملحق 39-44**
39. 0.125, -0.5, 2, ... 40. 18, 12, 8, ... 41. 64, 48, 36, ...
42. 81, 108, 144, ... 43. $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$ 44. 1, 0.1, 0.01, 0.001, ...
45. **45. ليست أي منهما؛ فلا يوجد فرق مشترك ولا نسبة مشتركة.**
- مثال 6 حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية، أم هندسية، أم غير ذلك. أشرح استنتاجك.
46. **46. هندسية، النسبة المشتركة هي 3.**
47. **47. حسابية؛ الفرق المشترك هو -3.**
48. **48. هندسية؛ النسبة المشتركة هي $\frac{1}{5}$.**
49. **49. حسابية؛ الفرق المشترك هو $\frac{1}{2}$.**
50. **50. ليست أي منهما؛ لا يوجد فرق مشترك ولا نسبة مشتركة.**
51. **51. القراءة** قورت أسماء قراءة كتاب من 800 صفحة خلال العطلة. فإذا كانت قد وصلت بالفعل إلى الصفحة 112 وبقي من عطلتها 8 أيام، فما العدد الأدنى من الصفحات التي تحتاج إلى قراءتها كل يوم لتتصفح من قراءة الكتاب بنهاية عطلتها؟ **86 صفحة في اليوم**

52. **الاستهلاك** من البنزين لسيارة أجنبية أن تتصفح فيها بمعدل 15% كل عام إذا كانت قيمة سيارتها في الوقت الراهن هي AED 88,200. فما ستكون قيمتها بعد 6 أعوام مع التقريب لأقرب درهم؟ **AED 33,365**
53. **الارتفاع** عند طي ورقة على نفسها، يتضاعف سبكها. إذا كانت هناك ورقة سبكها 0.1 mm ويمكن طيها 37 مرة، فما السمك الذي ستصبح عليه حينها؟ **حوالي 13,744 km**

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

54. **التبرير** اشرح السبب في أن المتتالية 8, 10, 13, 17, 22 ليست حسابية
55. **مسألة غير محددة الإجابة** صف موقفا من الحياة اليومية يمكن تشبيهه باستخدام متتالية حسابية بها فرق مشترك قيمته 8.
56. **تحديد مجموع ثلاثة حدود متتالية لمتتالية حسابية يساوي 6.** ونتاج ضرب الحدود يساوي -42. أوجد هذه الحدود. **3, 2, 7**
57. **تحليل الخطأ** يحدد بدر وسالم ما إذا كانت المتتالية ... 8, 8, 8 حسابية أم هندسية. أم غير ذلك أم حسابية وهندسية. هل أحدهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.
58. **مسألة غير محددة الإجابة** أوجد متتالية هندسية ومتتالية حسابية ومتتالية ليست هندسية ولا حسابية تبدأ على النحو ... 3, 9.
59. **التبرير** إذا كان لدى متتالية هندسية النسبة r حيث $|r| < 1$. فماذا سيحدث للحدود عند زيادة n وماذا سيحدث للحدود إذا كان $|r| \geq 1$ ؟ **انظر الهامش.**
60. **الكتابة في الرياضيات** صف ما سيحدث لحدود المتتالية الهندسية عند مضاعفة النسبة المشتركة. وماذا سيحدث عند تضاعفها إلى النصف؟ اشرح استنتاجك. **انظر ملحق إجابات الوحدة 9.**

سالم	بدر
النسبة المشتركة في المتتالية تساوي 7. والمتتالية هندسية.	الفرق المشترك للمتتالية يساوي 0. والمتتالية حسابية.

Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

472 / 43

Navigation icons: back, forward, search, home, share, print, refresh.




انتبه!
تحليل الخطأ في التمرين 57.
 اطلب من الطلاب إيجاد متتالية تكون هندسية وحسابية معاً. غير المتتالية مع 8, 8, 8, ... المتتالية مع 8, 8, 8, ...

4 التقويم


عین مصطلح الرياضيات اطلب من الطلاب أن يشرحوا كيفية إيجاد أي حد في أي متتالية حسابية أو هندسية بعرفة الحدود الثلاثة الأولى.

إجابات إضافية


68. دائرة: $x^2 + y^2 = 27$



69. قطع زائد: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$



70. دائرة: $x^2 + (y + 3)^2 = 36$



تدريب على الاختبار المعياري

63. SAT/ACT كانت تريد رانيا تحديد متوسط درجاتها في ستة اختبارات. وقد أدرجت الدرجات بشكل صحيح للحصول على 7. ولكنها قامت بالخطأ على 7 بدلاً من 6 فكان المتوسط 12 درجة أقل من المتوسط الحقيقي ما المعادلة التي يمكن استخدامها لتحديد قيمة H؟


F $6T + 12 = 7T$ J $\frac{T}{6} = \frac{T-12}{7}$
 G $\frac{T}{7} = \frac{T-12}{6}$ K $\frac{T}{6} = 12 - \frac{T}{7}$
 H $\frac{T}{7} + 12 = \frac{T}{6}$

64. أوجد الحد التالي في المتتالية الهندسية

- 8, 6, $\frac{9}{2}$, $\frac{27}{8}$, ... D
 A $\frac{11}{8}$ C $\frac{9}{4}$
 B $\frac{27}{16}$ D $\frac{81}{32}$

61. الإجابة المختصرة يبلغ قياس حجرة نوم الزوجة التي على شكل مستطيل 4.5 أمتار في 3.5 أمتار وترتد لثراء سجادة لفردة اليوم بتكلفة AED 108 لكل متر مربع شامل الضريبة ما المبلغ الذي ستدفعه على فرش غرفة نومها بالصناد؟ AED 1,701

62. يمكن وصف نمط الدوائر المتساوية والدوائر البيضاء أدناه من خلال علاقة بين متغيرين.



- أي علاقة تربط w وهو عدد الدوائر البيضاء بـ f وهو عدد الدوائر الفاتحة؟ C
 A $w = 3f$ C $w = 2f + 1$
 B $f = \frac{1}{2}w - 1$ D $f = \frac{1}{3}w$

مراجعة شاملة

أوجد حل كل من أنظمة المعادلات التالية.

65. $y = 5 (\pm 4, 5)$ 66. $y - x = 1$ $(-4, -3), (3, 4)$ 67. $3x = 8y^2$ $8y^2 - 2x^2 = 36$
 $x^2 = x^2 + 9$ $x^2 + y^2 = 25$

اكتب كل معادلة بالصيغة القياسية وحدد ما إذا كان التمثيل البياني لها قطعاً مكافئاً، أم دائرة، أم قطعاً ناقصاً، أم قطعاً زائداً، ثم مثل المعادلة بيانياً. 68-70. **انظر الهامش.**

68. $6x^2 + 6y^2 = 162$ 69. $4y^2 - y^2 + 4 = 0$ 70. $x^2 + y^2 + 6y + 13 = 40$

مثل كل دالة بيانياً. 71-73. **انظر ملحق إجابات الوحدة 9.**

71. $f(x) = \frac{6}{(x-2)(x+3)}$ 72. $f(x) = \frac{-3}{(x-2)^2}$ 73. $f(x) = \frac{x^2-36}{x+6}$

74. **الصحة** ثبتت إزالة دواء معين من مجرى الدم بعدد ثابت، وانخفض معدل الدواء وفق الدالة $y = ae^{-0.1625t}$ حيث t بالساعات. أوجد عمر النصف لهذه المادة. **حوالي 4.27 ساعات**

مراجعة المهارات

اكتب معادلة لكل مستقيم.

75. يمر بالنقطة (4, 6) و (0.5, 1) $y = 0.5x + 1$ $m = 0.5$
 76. يمر بـ $(2, \frac{1}{2})$ و $(\frac{3}{4}, 2)$ $y = -\frac{3}{4}x + 2$ $m = -\frac{3}{4}$
 77. يمر بالنقطة (6, -4) و (3, 10) $y = 3x - 6$ $m = 3$
 78. يمر بالنقطة (4, 0) و $(\frac{1}{3}, 4)$ $y = \frac{1}{3}x + 4$ $m = \frac{1}{3}$
 79. يمر بالنقطتين (1, 3) و $(8, -\frac{1}{2})$ $y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$
 80. يمر بالنقطتين (1, -5) و (5, 16) $y = \frac{3}{2}x + \frac{17}{2}$

التدريس المتميز

التوسع أسأل الطلاب هذا السؤال: "هل 1, 2, 4, 8, 16, ... متتالية حسابية أم هندسية؟ وكيف عرفت ذلك؟" **هندسية، لأن النسبة المشتركة هي 2.** ثم أسأل: "إذا تم استبدال كل حد في المتتالية 1, 2, 4, 8, 16, ... بعكوسه الضربي، فهل ستظل المتتالية هندسية؟ وكيف عرفت ذلك؟" **نعم؛ لأن النسبة المشتركة هي $\frac{1}{2}$.** اطلب من الطلاب كتابة متتالية هندسية وتحديد ما إذا كان عكوسها الضربي المائل أيضاً متتالية هندسية.



9-2 المتتاليات والمتسلسلات الحسابية

الدرس 9-2

1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 9-2 لقد حدثت ما إذا كانت المتتالية حسابية أم لا.

الدرس 9-2 استخدام المتتاليات الحسابية. وإيجاد مجموع المتسلسلات الحسابية.

بعد الدرس 9-2 إثبات العبارات باستخدام الاستقراء الرياضي.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة قسم لماذا؟ الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

ما نوع متتالية أعداد الإحصاء 1-100 حسابية؟

ما قيمة الحد الأول؟ 1

كيف يمكنك سريعاً تحديد مجموع أول 10 أعداد إحصاء؟

الإجابة النموذجية: $5 \times 11 = 55$



المفردات الجديدة

- أوساط حسابية arithmetic means
- متسلسلة حسابية arithmetic series
- مجموع جزئي partial sum
- الرمز سيجما sigma notation

ممارسات في الرياضيات

البحث عن التوافق في الاستنتاجات المتكررة والتعمير من ذلك.

1 **متتاليات حسابية** في الدرس 9-1 استخدمت صيغة التل والخطوة لإيجاد حد معين لمتتالية حسابية. ومن الممكن وضع معادلة لأي حد لمتتالية حسابية باستخدام نفس العملية. ذكر في المتتالية الحسابية $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ التي فيها الفرق المشترك هو d .

صيغة التل والخطوة: $(y - x) = m(x - y)$
 $(a_n - a_1) = d(n - 1)$
 $a_n = a_1 + d(n - 1)$
 صيغة التل والخطوة: $(x_2 - x_1) = m(x_3 - x_2) = m(x_4 - x_3) = \dots = m(x_n - x_{n-1})$
 أضيف إلى الطرفين: $a_n = a_1 + d(n - 1)$

يمكنك استخدام هذه المعادلة لإيجاد أي حد في متتالية حسابية عند معرفتك للحد الأول والفرق المشترك.

المفهوم الأساسي الحد النوني لمتتالية حسابية

بم الحصول على الحد نوني a_n لمتتالية حسابية. والتي يكون الحد الأول فيها هو a_1 والفرق المشترك هو d . من خلال الصيغة التالية، حيث n هو أي عدد طبيعي.

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

استخدم على هذه الصيغة في التمرين 80.

مسألة 1 إيجاد الحد النوني

أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية ... 9, 16, 23, 30.

الحل: أوجد الفرق المشترك.

$$16 - 9 = 7 \quad 23 - 16 = 7 \quad 30 - 23 = 7$$

$$d = 7$$

الحل: أوجد الحد الثاني عشر.

الحد النوني لمتتالية حسابية: $a_n = a_1 + (n - 1)d$
 $a_{12} = 9 + (12 - 1)(7)$
 $= 9 + 77 = 86$
 الحد النوني لمتتالية حسابية: $a_n = a_1 + (n - 1)d$
 $a_{12} = 9 + (12 - 1)(7)$
 $= 9 + 77 = 86$

تمرين نموذجي

أوجد الحد المشار إليه لكل متتالية حسابية.

1A. $a_1 = -4, d = 6, n = 9$ **44**

1B. $a_{20} = 15, d = -8$ **137**





1 المتتاليات الحسابية

المثال 1 يبين كيفية إيجاد الحد النوني في متتالية حسابية بمعرفة الحد الأول والفرق المشترك. وبين **المثال 2** كيفية كتابة معادلة للحد النوني في متتالية حسابية بمعرفة بعض الحدود في المتتالية. وبين **المثال 3** كيفية إيجاد الوسائط الحسابية بين حدين غير متعاقبين في متتالية حسابية.

التويم التكويني

استخدم الثمارين الواردة في القسم "تمرين موجّه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

أمثلة إضافية

- أوجد الحد رقم عشرين في المتتالية الحسابية ... 3, 10, 17, 24, 136
- اكتب معادلة للحد النوني في كل متتالية حسابية.
 - a. $-8, -6, -4, \dots$
 $a_n = 2n - 10$
 - b. $a_6 = 11, d = -11$
 $a_n = -11n + 77$
- أوجد الأوساط الحسابية في المتتالية 21, ..., 45, ...
27, 33, 39

التركيز على محتوى الرياضيات

صفة لمتتالية حسابية

يمكن إيجاد أي حد لأي متتالية من قيمة الحد السابق إذا كان الفرق المشترك معروفاً، ولكن تتطلب صيغة الحد النوني معرفة الحد الأول في المتتالية.

إذا كان لديك بعض الحدود الخاصة بمتتالية حسابية ما، فيمكنك كتابة معادلة للحد النوني للمتتالية.

مثال 2 اكتب معادلات للحد النوني

اكتب معادلة للحد النوني لكل متتالية حسابية.

a. $5, -13, -31, \dots$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_4 = 5 + (4-1)(-18)$$

$$a_4 = 5 + (-18n + 18)$$

$$a_4 = -18n + 23$$

الحد النوني لمتتالية حسابية
 $a_1 = 5$ و $d = -18$
خاصية التوزيع
بسيط.

b. $a_3 = 19, d = 6$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$19 = a_1 + (3-1)(6)$$

$$19 = a_1 + 12$$

$$-5 = a_1$$

الحد النوني لمتتالية حسابية
 $a_3 = 19$ و $d = 6$ و $n = 3$
الطرف،
اطرح 12 من الطرفين.

أولاً: أوجد a_1 .

ثم اكتب المعادلة.

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_n = -5 + (n-1)(6)$$

$$a_n = -5 + (6n - 6)$$

$$a_n = 6n - 11$$

الحد النوني لمتتالية حسابية
 $d = 6$ و $a_1 = -5$
خاصية التوزيع
بسيط.

تمرين موجّه

2A. $12, 3, -6, \dots$ $a_n = -9n + 21$ 2B. $a_6 = 12, d = 8$ $a_n = 8n - 36$

يكون لديك في بعض الأحيان حدين لمتتالية. لكنهما غير متتاليين في المتتالية. بطلق على الحدود الواقعة بين أي حدين غير متتاليين **أوساط حسابية**. ويمكن استخدامه لإيجاد الحدود المجهولة لمتتالية.

مثال 3 إيجاد الأوساط الحسابية

أوجد الأوساط الحسابية في المتتالية ... $22, 2, 2, 2, 2, 2, -8$.

المفردة 1 بما أن هناك أربعة حدود بين الحدين الأول والأخير المقطعين، فإن إجمالي الحدود يساوي $4 + 2$ أو 6 . إذا $n = 6$.

المفردة 2 أوجد قيمة d .

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$22 = -8 + (6-1)d$$

$$30 = 5d$$

$$6 = d$$

الحد النوني لمتتالية حسابية
 $a_6 = 22$ و $a_1 = -8$ و $n = 6$
خاصية التوزيع
اقسم الطرفين على 5.

المفردة 3 استخدم d لإيجاد الأوساط الحسابية الأربعة



الأوساط الحسابية هي -2 و 4 و 10 و 16 .

تمرين موجّه

3. أوجد الأوساط الحسابية الخمسة بين -18 و 36 . **$-9, 0, 9, 18, 27$**

نصيحة دراسية
التحقق من الحلول تحقق من إجاباتك مستخدماً أيها الحدين الحدود الثلاثة الأولى للمتتالية.

قراءة في الرياضيات
الوسط الحسابي متوسط عددين أو أكثر. الأوساط الحسابية الحدود الموجودة بين أي حدين غير متتاليين لمتتالية حسابية.

مركز تطوير المحتوى الإلكتروني - مركز تطوير المحتوى الإلكتروني - وزارة التعليم - الإمارات العربية المتحدة





2 المتسلسلة الحسابية تكون **المتسلسلة** عند جمع حدود متتالية و **المتسلسلة الحسابية** هي عبارة عن مجموع حدود المتتالية الحسابية. ويطبق على مجموع الحدود التوافقية **المجموع الجبري** ويرمز إليه بالرمز S_n .

المفهوم الأساسي: المجموع الجبري للمتسلسلة حسابية		
الصيغة	معنى	مجموع S_n للحدود التوافقية الأولى يتساوى:
$S_n = n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right)$	a_n و a_1	
$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]$	d و a_1	

يلزم أحياناً تحديد a_1 ، أو a_n ، أو n قبل إيجاد مجموع المتسلسلة الحسابية. وعند حدوث ذلك، استخدم صيغة الحد التوازي.

مثال 4 استخدام صيغ المجموع

أوجد مجموع $12 + 19 + 26 + \dots + 180$.

الحل: $a_1 = 12$ ، $a_n = 180$ و $d = 19 - 12 = 7$.

يمكن إيجاد n قبل أن نتمكن من استخدام إحدى الصيغ.

الحد التوازي لمتتالية حسابية

$a_n = a_1 + (n-1)d$

$180 = 12 + (n-1)(7)$

$168 = 7n - 7$

$25 = n$

$d = 7$ و $a_n = 180$ و $a_1 = 12$

ببساطة

أوجد قيمة n .

الحل: استخدم أي من الصيغتين لإيجاد S_n .

$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]$

صيغة المجموع

$S_{25} = \frac{25}{2} [2(12) + (25-1)(7)]$

$n = 25$ ، $a_n = 180$ و $d = 7$

$S_{25} = 12.5(192) \text{ or } 2400$

ببساطة

تمرين موجه

أوجد مجموع كل متسلسلة حسابية.

4A. $2 + 4 + 6 + \dots + 100$ **2550**

4B. $n = 36$ ، $a_n = 240$ ، $d = 8$. **2880**

يمكنك استخدام صيغة المجموع لإيجاد حدود المتسلاطات.

مثال 5 إيجاد الحدود الثلاثة الأولى

أوجد الحدود الثلاثة الأولى للمتسلسلة الحسابية التي فيها $a_1 = 7$ و $a_n = 79$ و $S_n = 430$.

الحل: أوجد n .

$S_n = n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right)$

صيغة المجموع

$430 = n \left(\frac{7 + 79}{2} \right)$

$a_n = 79$ و $a_1 = 7$ و $S_n = 430$

$430 = n(43)$

ببساطة

$10 = n$

اقسم الطرفين على 43.

انتبه!

الفرق المشترك احرص ألا يحتفظ عليك الأمر في علامة الفرق المشترك بالمتتالية الحسابية. تحقق أن القائمة نتج بالفعل حدود المتتالية.

التدريس المتميز

المتعلمون بطريقة التواصل ناقش الفرق بين المتتالية والمتسلسلة واطلب من الطلاب اقتراح طرق لتذكرها.

2 المتسلسلة الحسابية

يبين **المثال 4** كيفية استخدام الصيغة لإيجاد مجموع متسلسلة حسابية. ويبين **المثال 5** كيفية استخدام صيغة لإيجاد حدود في متسلسلة حسابية. ويبين **المثال 6** كيفية إيجاد مجموع متسلسلة مكنوبة بالرمز سيجما.

أمثلة إضافية

4 أوجد مجموع

$836 \cdot 8 + 12 + 16 + \dots + 80$

5 أوجد الحدود الثلاثة الأولى في

المتسلسلة الحسابية.

$a_1 = 14$ و $S_n = 129$

و $a_n = 29$

$14, 17, 20$

التدريس باستخدام التكنولوجيا

اللوحة البيضاء التفاعلية وضح مثالاً على اللوحة للمساعدة في شرح الصيغة لإيجاد مجموع متسلسلة حسابية. اكتب متسلسلة للأعداد من 1 إلى 10 واحسب الأعداد لتشكّل المجاميع $1 + 10$ و $2 + 9$ و $3 + 8$. وما إلى ذلك. وأوجد مجموع المتتالية. ثم وضح كيفية تبسيط الصيغة هذه العملية الحسابية.





التركيز على محتوى الرياضيات

المتسلسلة المنتهية رغم أن معظم المتتاليات التي تمت دراستها خلال هذا الدرس هي متتاليات لا نهائية، فإن المتسلسلات في هذا الدرس خلاف ذلك. وتعد الصيغة $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ لمجموع متسلسلة حسابية صالحة فقط لعدد نهائي محدد لحدود n .

مثال إضافي

6 تدريب على الاختبار المعياري

- أوجد قيمة $\sum_{k=3}^{10} (2k + 1)$.
- A 23
 - B 70
 - C 98
 - D 112

تدريس الممارسات في الرياضيات

المشاركة يراقب الطلاب المتفوقون في الرياضيات تقدمهم وبنيونهم وبغيرهم مشارهم إذا لزم الأمر. شجع الطلاب على فحص التعابير وسرد كافة القيم المهمة قبل بدء عملياتهم الحسابية.

المسألة 1 أوجد قيمة d .

الحد الثاني لمتتالية حسابية
 $a_2 = a_1 + (n - 1)d$
 $79 = 7 + (10 - 1)d$
 $72 = 9d$
 $8 = d$

الحد الثاني لمتتالية حسابية
 $n = 10$ و $a_2 = 79$ و $a_1 = 7$
 اطرح 7 من الطرفين.
 انقسم الطرفين على 9.

المسألة 2 استخدم d لتحديد a_8 و a_9 .

$a_8 = 7 + 8d = 7 + 8(8) = 71$
 $a_9 = 7 + 9d = 7 + 9(8) = 79$

الحدود الثلاثة الأولى هي 7 و 15 و 23.

تمرين توجيهي

أوجد الحدود الثلاثة الأولى لكل متسلسلة حسابية: **5B. -24, -16, -8**

5A. $S_n = 120$, $n = 8$, $a_n = 36$ 5B. $a_1 = -24$, $a_n = 288$, $S_n = 5280$

يمكن كتابة مجموع المتسلسلة باختصار عن طريق استخدام الرمز Σ .

المفهوم الأساسي الرمز Σ سيجمما

الرمز: صيغة حدود المتسلسلة $\sum_{k=1}^n (ak + b)$

مثال: $\sum_{k=1}^{10} (4k + 2) = (4(1) + 2) + (4(2) + 2) + (4(3) + 2) + \dots + (4(10) + 2)$
 $= 6 + 10 + 14 + \dots + 50$

قراءة في الرياضيات
 الرمز سيجمما يأتي الاسم من الحرف اليوناني سيجمما والذي يستخدم في الرمز.

مثال 6 على الاختبار المعياري استخدام الرمز سيجمما

أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{10} (6k - 1)$

A 846 B 910 C 975 D 1008

قراءة فقرة الاختبار

يتوجب عليك إيجاد مجموع المتسلسلة. أوجد قيمة a_1 و a_n و n .

حل فقرة الاختبار

هناك $1 + 4 + 18$ أو 15 حدا، إذا $n = 15$

$1 - 6(4) = a_1$ أو $a_1 = 23$ $1 - 6(15) = a_n$ أو $a_n = 107$

أوجد المجموع.

صيغة المجموع
 $S_n = n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right)$
 $S_{15} = 15 \left(\frac{23 + 107}{2} \right)$
 $S_{15} = 15(65) = 975$

$a_1 = 23$ و $a_n = 107$ و $n = 15$

الإجابة الصحيحة هي C.

تمرين توجيهي

6. أوجد قيمة $\sum_{m=1}^{10} (5m + 6)$

- F 972 G 1053 H 1281 J 1701

نصيحة عند حل الاختبار
 أحياناً يقوم تقسيم مسألة ما إلى أجزاء وحل كل جزء منفرداً، ثم دمج حلول الأجزاء.

مركز البحوث والدراسات والبحوث التربوية - وزارة التربية والتعليم - دولة الإمارات العربية المتحدة





التحقق من فهمك

- مثال 1 أوجد الحد البشار إليه لكل متتالية حسابية.
 1. $a_1 = 14, d = 9, n = 11$ **104**
 2. $a_{10} = 233$ بالنسبة لـ $12, 25, 38, \dots$
- مثال 2 اكتب معادلة للحد النوني لكل متتالية حسابية.
 3. $13, 19, 25, \dots$ $a_n = 6n + 7$
 4. $a_5 = -12, d = -4$ $a_n = -4n + 8$
- مثال 3 أوجد الأوساط الحسابية في كل متتالية.
 5. $6, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, 42$ **15, 24, 33**
 6. $-4, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, 8$ **-1, 2, 5**
- مثال 4 أوجد مجموع كل متسلسلة حسابية.
 7. **1275** الأعداد الطبيعية الخمسين الأولى
 8. $4 + 8 + 12 + \dots + 200$ **5100**
 9. $a_1 = 12, a_n = 188, d = 4$ **4500**
 10. $a_n = 145, d = 5, n = 21$ **1995**
- مثال 5 أوجد الحدود الثلاثة الأولى لكل متسلسلة حسابية.
 11. $a_1 = 8, a_n = 100, S_n = 1296$ **8, 12, 16**
 12. $n = 18, a_n = 112, S_n = 1098$ **10, 16, 22**
- مثال 6 الاختيار من متعدد أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{10} (3k + 9)$
 A 45
 B 78
 C 342
 D 410

التدريب وحل المسائل

- مثال 1 أوجد الحد البشار إليه في كل متتالية حسابية.
 14. $a_1 = -18, d = 12, n = 16$ **162**
 15. $a_1 = -12, n = 66, d = 4$ **248**
 16. $a_1 = 9, n = 24, d = -6$ **-129**
 17. $a_{15} = -103$ بالنسبة لـ $-5, -12, -19, \dots$
 18. $a_{10} = 17$ بالنسبة لـ $-1, 1, 3, \dots$
 19. $a_{24} = 14$ بالنسبة لـ $8.25, 8.5, 8.75, \dots$
- مثال 2 اكتب معادلة للحد النوني لكل متتالية حسابية.
 20. $a_1 = 11n + 13$
 21. $a_n = -14n + 45$
 22. $a_n = -3n + 72$
 23. $a_n = 5n - 14$
 24. $a_n = 0.25n + 11$
 25. $a_n = 4.5n - 21$
 26. $a_n = -7n + 16$
- مثال 3 أوجد الأوساط الحسابية في كل متتالية.
 33. $24, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, -1$ **19, 14, 9, 4**
 34. $-6, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, 49$ **5, 16, 27, 38**
 35. $-28, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, 7$ **-21, -14, -7, 0**
 36. $84, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, 39$ **75, 66, 57, 48**
 37. $-12, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, -66$
 38. $182, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad}, 104$ **169, 156, 143, 130, 117**
 39. $-21, -30, -39, -48, -57$
32. البنية يبلغ متوسط إجمالي ما يجرده جمال لكل مباراة في بطولة البولنج هذا الموسم 123 قارورة، ولكنه يتلقى دروساً في البولنج حتى يزيد متوسط ما يجرده في كل موسم بعدد 8 قارورات. **b. الموسم التاسع**
 a. اكتب معادلة لتمثيل الحد النوني للمتتالية. $a_n = 115 + 8n$
 b. إذا استمر النمط هكذا، فخلال أي موسم سيحجز جمال متوسط 187 قارورة في المباراة؟
 c. هل من المعقول أن يستمر هذا النمط إلى ما لا نهاية؟ اشرح. **انظر الهامش.**

خيارات الواجب المنزلي المتمايزة

المستوى	الواجب	خيار اليمين
AL مبتدئ	14-60, 74, 75, 78-82, 83-100	74, 75, 78-82, 87-100
OL أساسي	15-59, 61-71, 73-75, 78-100	61-73, 74, 75, 78-82, 87-100
BL متقدم	61-96, (اختياري: 97-100)	

التيه!

تجنب الأخطاء! ساعد الطلاب على التجاوب مع الرمز سيجما بجعلهم يترؤن عدة تعابير مكتوبة في هذا الترميز بصوت عالٍ. اشرح أن ترميز سيجما هو الحرف الكبير S في الأبجدية اليونانية. اطلب منهم طرح أمثلة أخرى من ترميز رياضي يستخدم الحروف اليونانية. **الإجابة النموذجية: Σ**

3 التبرين

التقويم التكويني

استخدم التمارين 1-13 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

تدريس الممارسات في الرياضيات

البنية يدقق الطلاب المتفوقون في الرياضيات للتفريق بين النمط أو البنية. ويمكنهم رؤية الأشياء المعقدة، مثل بعض التعابير الجبرية. كأنشاء مفردة أو تتألف من عدة أشياء.

إجابة إضافية

32c. الإجابة النموذجية: لا، هناك قيمة عظمى قدره 300 نقطة في لعبة البولنج. لذلك سيكون من المستحيل للمتوسط مواصلة الصعود إلى ما لا نهاية.





تدريس الممارسات في الرياضيات

التمثيل يستطيع الطلاب المتخوفون في الرياضيات تطبيق الحساب الذي يعرفونه لحل المسائل الناشئة في الحياة اليومية. وتحليل العلاقات رياضيًا لاستخلاص الاستنتاجات. وتفسير نتائجهم الرياضية في سياق الحالة.

ملاحظات لحل التمرين

ورق الرسم البياني في التمارين 71 و 90-92 و 94-96. سيحتاج الطلاب إلى ورق رسم بياني.

إجابة إضافية

67a. 14, 18, 22



- أوجد مجموع كل متسلسلة حسابية.
39. أول 100 عدد طبيعي زوجي
40. أول 200 عدد طبيعي فردي
41. أول 100 عدد طبيعي زوجي
42. أول 300 عدد طبيعي زوجي
43. $-18 + (-15) + (-12) + \dots + 66$ **696** 44. $-24 + (-18) + (-12) + \dots + 72$ **408**
45. $a_1 = -16, d = 6, n = 24$ **1272** 46. $n = 19, a_n = 154, d = 8$ **1558**
47. **المسائل:** تبدأ الجوائز التي يتم منحها في مسابقة أسبوعية على الراديو بمبلغ قيمته AED 150 ويزداد بمقدار AED 50 لكل أسبوع يقبل فيه المتنافس. إذا استمرت المسابقة لمدة 11 أسبوعًا، فما إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه الراعي في النهاية؟ **AED 4400**

مثال 4

- أوجد الحدود الثلاثة الأولى لكل متسلسلة حسابية.
48. $n = 32, a_n = -86, S_n = 224$ **100, 94, 88** 49. $a_1 = 48, a_n = 180, S_n = 1368$ **48, 60, 72**
50. $a_1 = 3, a_n = 66, S_n = 759$ **3, 6, 9** 51. $n = 28, a_n = 228, S_n = 2982$ **-15, -6, 3**
52. $a_1 = -72, a_n = 453, S_n = 6858$ 53. $n = 30, a_n = 362, S_n = 4770$ **-16, -30, -44**
54. $a_1 = 19, n = 44, S_n = 9350$ **19, 28, 37** 55. $a_1 = -33, n = 36, S_n = 6372$ **-9, -21, -33**
56. **الجوائز:** تمنح محطة راديو جائزة يصل إجمالي قيمها إلى AED 8500 بتقدير عشر ساعات، وتزيد الجائزة كل ساعة بمقدار AED 100. أوجد قيمتي الجائزة الأولى والجائزة الأخيرة. **AED 400 و AED 1300**

مثال 5

- أوجد مجموع كل متسلسلة حسابية.
57. $\sum_{k=1}^{20} (4k - 2)$ **512** 58. $\sum_{k=4}^{11} (4k + 1)$ **350** 59. $\sum_{k=5}^{20} (2k + 6)$ **324** 60. $\sum_{k=6}^{14} (-3k + 2)$ **-208**

مثال 6

61. **المعرفة العالية:** الترحلت تجلاء بعض المال من والديها ووافقت على سداد AED 50 بداية الشهر الأول وإضافة AED 25 في كل شهر آخر لمدة 12 شهرًا. ما إجمالي المبلغ الذي ستكون قد سدده بعد مرور 12 شهرًا؟ **AED 2250**
62. **الجاذبية:** إذا وقع جسم في سقوط حرم إحمال مقاومة الهواء، فإنه يسقط بمعدل 16 مترًا في الثانية الأولى. ويزيد بمقدار 48 مترًا في الثانية التالية، و 80 مترًا في الثانية الثالثة، ما إجمالي الأمتار التي سيقطعها هذا الجسم في سقوطه بعد مرور 10 ثوانٍ؟ **1600 m**
- استخدم المعلومات المعطاة لكتابة معادلة تمثل الحد النوني في كل متتالية حسابية
64. $a_n = -9n + 177$
63. الحد رقم 100 في المتتالية هو 245 والفرق المشترك يساوي 13 $a_n = 13n - 1055$
64. الحد الحادي عشر في المتتالية هو 78 والفرق المشترك يساوي 9.
65. الحد السادس في المتتالية هو 34. الحد رقم 23 في المتتالية هو $a_n = 9n - 88$
66. الحد رقم 25 في المتتالية هو 121. الحد رقم 80 في المتتالية هو $a_n = 7n - 54$ 506
67. **تمثيل التهاج:** غالبًا ما يتم وضع الطاولة المستطيلة في قائمة الاستقبال بلحس طرف كل طاولة بالأخرى. يوضح الرسمان التخطيطيان التاليان عدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس في كل ترتيب للطاولات.



- a. قم بإعداد رسومات لإيجاد الأعداد الثلاثة التالية عند إضافة الطاولة بعدد واحد في المرة إلى الطاولة البرتقة. **انظر الهامش.**
- b. اكتب معادلة لتشكل العدد النوني في هذا النمط. $p_n = 4n + 2$
- c. هل من الممكن الحصول على مقامه تكفي بالتميط 100 شخص في هذه الطاولة البرتقة؟ اشرح. **ن؛ لا يوجد عدد نوني كافي يستوفي المعادلة $4n + 2 = 100$.**

التدريس المتمايز

التوسع اكتب متسلسلة حسابية، مثل $21 + 17 + 13 + 9 + 5$ على اللوحة واطلب من الطلاب

كتابة مجموع الحدود n باستخدام الرمز سيجما n بدءًا من 1. $\sum_{n=1}^5 (4n + 1)$





تدريس الممارسات في الرياضيات

التفكير النقدي يُمكن للطلاب المتوقّفين في الرياضيات أبحاثًا المناظرة بين كفاءة فرضيتين متحولتين وتفسير المنطق أو الاستنتاج الصحيح من الخاطئ. وفي حالة وجود خطأ في فرضية ما، فهم يستطيعون توضيح ماهيته.

70c. الإجابة النموذجية: لا، ففي النهاية سيصبح عدد الكيلومترات المتخطوة في اليوم غير واقعي.

68. الأداء هناك شركة ما تدفع لموظفيها ولها معدلات أرباحها تتناقص بدرجة سبغاً موحداً بلغ 800 AED لكل أسبوع بالإضافة إلى 96 AED نظير كل وحدة تضرعها. إذا تناقصت 2,048 AED في أسبوع واحد، فما عدد الوحدات التي أجزئها؟ 13
69. الراتب يتناقص طارحاً في الوقت الزمان 112,000 AED في العام. إذا كان طارحاً يتوقع زيادة راتبه كل عام بزيادة 16,000 AED، فبعد كم عام سيصبح راتبه 400,000 AED في العام؟ **العام التاسع عشر**
70. الألعاب الرياضية أثناء التدريب لخوض سباق الشاحنة، تخطط سبغاً للجرى 3 كيلومترات يومياً في الأسبوع الأول. ثم زيادة المسافة بمقدار نصف كيلومتر في كل من الأسابيع التالية.
- a. اكتب معادلة لتمثيل الحد التوحي للمنتابله: $a_n = 2.5 + 0.5n$
- b. إذا استمر النمط هكذا، فخلال أي أسبوع ستجرى 10 كيلومترات في اليوم؟ **أسبوع العمل الخامس عشر**
- c. هل من المعقول أن يستمر هذا النمط إلى ما لا نهاية؟ اشرح.
71. المتتاليات المتعددة تأمل $\sum_{k=1}^n (2k + 2)$ ، a-c. انظر ملحق إجابات الوحدة 9.
- a. جدولها اصنع جدولاً للجامع الجزئية للمتسلسلة بالنسبة لـ $1 \leq k \leq 10$
- b. بيانياً مثل بيانياً A، المجموع الجزئي.
- c. بيانياً مثل بيانياً $f(x) = x^2 + 3x$ على نفس الشبكة.
- d. لفظياً ماذا تلاحظ بشأن التشابه بين البيانيين؟
- e. تحليلياً ما الاستنتاجات التي يمكنك التوصل إليها بشأن العلاقة بين الدوال التربيعية ومجموع المتسلسلة الحسابية؟
- f. جريباً أوجد المتسلسلة الحسابية التي ترتبط بـ $\sum_{k=1}^n (2k + 7)$ ، $g(x) = x^2 + 8x$
- أوجد قيمة x.
72. $\sum_{k=1}^n (6k - 5) = 928$ 18
73. $\sum_{k=1}^n (8k + 2) = 1032$ 16
74. الإجابة النموذجية: لكل مجموع جزئي لمتسلسلة حسابية، تكون هناك دالة تربيعية مطابفة تتشارك نفس المعنى.

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

74. التقدر بعدد عيسى وجاسم صيغة الحد التوحي للمتتالية ... 11, -2, 7, 16. هل أحدهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.
- | | |
|---|---|
| جاسم
$a_1 = 11, d = 7$
$a_n = 9n - 8$ | عيسى
$a_1 = -11, d = 7$
$a_n = -11 + (n-1)7$
$= 7n - 20$ |
|---|---|
74. الإجابة النموذجية: عيسى؛ نفس معصام خطوة الضرب ك في $n - 1$.
75. التبرير إذا كان a هو الحد الثالث في متتالية حسابية، و b هو الحد الخامس، و c هو الحد الحادي عشر، فمبر من c بدلالة a و b $4b - 3a$
76. تعدّ توجد ثلاثة أوساط حسابية بين a و b في متتالية حسابية، ومتوسط الأوساط الحسابية يساوي 16. ما متوسط a و b ؟ 16
77. تعدّ أوجد S_n حيث إن ... $(x + 3) + (x + 2) + (x + 1) + \dots + (x + 1) + x$
78. مسألة غير محددة الإجابة اكتب متسلسلة حسابية بها 8 حدود ومجموع يبلغ 324 **الإجابة النموذجية: $9 + 18 + 27 + \dots + 72$**
79. الكتابة في الرياضيات قارن وقارن بين المتتاليات والمتسلسلات الحسابية. انظر الهامش.
80. البرهان برهن الصيغة المتعلقة بالحد التوحي لمتتالية حسابية. 80-81. انظر ملحق إجابات الوحدة 9.
81. البرهان اشرح صيغة مجموع لا تشمل a_1 .
82. البرهان اشرح صيغة المجموع البديلة باستخدام صيغة المجموع العام. انظر الهامش.





انتبه!
تحليل الخطأ في التمرين 74. أخطر الطلاب أنه لتفادي الخطأ مثل الذي وقع فيه حسن، من المفيد كتابة الصيغة ثم توضيح، في السطر التالي، التعويض عن القيم المعروفة. تجنب الأخطاء. تأكد أنه يمكن لجميع الطلاب إثبات فهمهم لترميز سيجما وذلك بأن تطلب منهم كتابة حدود المتسلسلة الواردة في ترميز سيجما.

4 التقييم

حصاد الأوس اطلب من الطلاب وصف كيف ساعدتهم عملهم في المتسلسلات في الدرس السابق في هذا الدرس.

التقويم التكويني

تحقق من فهم الطلاب للمعاهيم في الدروس 9-1 و 9-2.

إجابات إضافية

79. الإجابة النموذجية: المتسلسلة الحسابية هي قائمة من الحدود بحيث يكون لأي زوج من الحدود المتعاقبة فرق مشترك. المتسلسلة الحسابية هي عبارة عن مجموع حدود المتتالية الحسابية.

تدريب على الاختبار المعياري

83. SAT/ACT تكون قياسات الزوايا الخاصة بأحد المثلثات متتالية حسابية. إذا كان قياس الزاوية الأصغر هو 36° فما قياس الزاوية الأكبر؟ **C**

A 54°
B 75°
C 84°
D 90°
E 97°

84. يقع مساحة مثلث ما $8 - \frac{1}{2}q^2$ ويبلغ الارتفاع $q + 4$. أي تعبير يصف قاعدة المثلث على نحو أدق؟ **J**

F $q + 1$ H $(q - 3)$
G $q + 2$ J $(q - 4)$

85. التعبير $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$ يساوي **A**

A $\sum_{k=1}^3 k^{\frac{1}{2}}$ C $\sum_{k=1}^3 k^{-2}$
B $\sum_{k=1}^3 k^k$ D $\sum_{k=1}^3 \sqrt{k}$

86. الإجابة المختصرة: يستطيع أحمد كتابة مقال يتألف من 200 كلمة خلال 6 ساعات. ويمكن لحسام كتابة نفس المقال خلال $\frac{3}{2}$ ساعات. إذا عملا معاً، ما إجمالي عدد الساعات التي سيضربانها في كتابة المقال؟ **27**

مراجعة شاملة

- حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية أم لا. اكتب نعم أو لا. (التمرين 9-1)
87. نعم ... -6, 4, 14, 24, ...
88. نعم ... $2, \frac{7}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \dots$
89. لا ... 10, 8, 5, 1, ...
- أوجد حل كل نظام من أنظمة المتباينات باستخدام التمثيل البياني. 90-92. انظر ملحق إجابات الوحدة 9.
90. $x + 2y > 1$
 $x^2 + y^2 \leq 25$
91. $x + y \leq 2$
 $4x^2 - y^2 \geq 4$
92. $x^2 + y^2 \geq 4$
 $4x^2 + 9y^2 \leq 36$

93. **الغيزياء** ترتبط المسافة التي يمتدها الزنبرك بالكتلة المعلقة به. ويرمز إلى ذلك بالمعادلة $d = km$ حيث d هو المسافة و m هو الكتلة و k هو ثابت الزنبرك. عند ربط زنبركين التاميين الخاصين بهما هما k_1 و k_2 يسلمت. فإنه يمكن إيجاد ثابت الزنبرك k باستخدام المعادلة $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

a. إذا كان هناك زنبرك ثابت يبلغ 12 سنتيمتراً لكل جرام معلق في سلسلة مع زنبرك آخر ثابت يبلغ 8 سنتيمترات لكل جرام، فأوجد ثابت الزنبرك الناتج. **4.8 cm/g**

b. إذا كان هناك جسم بوزن 5 جرامات معلق بسلسلة الزنبركين، فلأي مدى سينتد الزنبركان؟ وهل هذه الإجابة معقولة في هذا السياق؟ **انظر الهامش.**

مثل كل دالة بيانياً. واذكر المجال والعمد. 94-96. انظر ملحق إجابات الوحدة 9.

94. $f(x) = \frac{2}{3}(2^x)$ 95. $f(x) = 4^x + 3$ 96. $f(x) = 2\left(\frac{1}{3}\right)^x - 1$

مراجعة المهارات

- أوجد حل كل معادلة. قرب لأقرب جزء من عشرة آلاف.
97. $5^x = 52$ **2.4550** 98. $4^{3p} = 10$ **0.5537** 99. $3^n + 2 = 14.5$ **0.4341** 100. $16^d - 4 = 3^2 - d$ **3.7162**

82. صيغة المجموع العامة $S_n = (a_1 + a_n) \cdot \left(\frac{n}{2}\right)$
صيغة الحد النوني $a_n = a_1 + (n - 1)d$
التعويض $S_n = [a_1 + a_1 + (n - 1)d] \cdot \left(\frac{n}{2}\right)$
بسط $S_n = [2a_1 + (n - 1)d] \cdot \left(\frac{n}{2}\right)$

93b. 24 cm، الإجابة منطقيّة. يمدد الجسم الزنبرك الأول بمقدار 60 cm ويمدّد الزنبرك الثاني بمقدار 40 cm. وسيمدّد الجسم الزنبركين معاً بمقدار أقل من تمديد لكل زنبرك على حدة.



الدرس 9-3

1 التركيز

المتتاليات والمتسلسلات الهندسية

السابق
الحالي
لماذا؟

حدثت ما إذا كانت المتتالية هندسية أم لا.

1 استخدام المتتاليات الهندسية.

2 إيجاد مجموع المتسلسلات الهندسية.

لماذا؟
 رأى حسن كتاباً جديداً في المكتبة وأرسل رسالة إلكترونية يربط للموقع الإلكتروني لمؤلف الكتاب إلى خمسة من أصدقائه ثم أعاد أسدقائه توصية الرابط بنفس النمط. كم عدد الأشخاص الذين سيظفون الرابط في الجولة التاسعة من الرسائل الإلكترونية؟

المفاهيم الأساسية الحد النوني لمتتالية هندسية

يتم الحصول على الحد النوني a_n لمتتالية هندسية يكون الحد الأول فيها هو a_1 والنسبة المشتركة هي r . من خلال الصيغة التالية، حيث n هو أي عدد طبيعي.

$$a_n = ar^{n-1}$$

سأشرح عن هذه الصيغة في التدريب 68.

المشروبات الجديدة
 أوساط هندسية
 geometric means
 متسلسلة هندسية
 geometric series

ممارسات في الرياضيات
 البحث عن النماذج في الاستنتاجات المتكررة والتعمير عن ذلك.

1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 9-3 لقد حددت إذا ما كانت المتتالية هندسية أم لا.

الدرس 9-3 استخدام المتتاليات الهندسية، وإيجاد مجموع المتسلسلات الهندسية.

بعد الدرس 9-3 إيجاد مجموع المتسلسلات الهندسية اللا نهائية.

2 التدريس

الأسئلة الداعية

اطلب من الطلاب قراءة قسم لماذا؟ الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

- ما الحدود الثلاثة الأولى للتسلسل؟
 $5, 25, 125$
- لماذا لا تعد هذه المتتالية متتالية حسابية؟ لأنه لا يوجد فرق مشترك بين الحدود.
- ما النسبة المشتركة في المتتالية؟
 $r = 5$
- قارن بين الفرق المشترك والنسبة المشتركة. الأول يتضمن الجمع، والثاني يتضمن الضرب.

562 | الدرس 9-3

472 / 53



1 المتتاليات الهندسية

المثال 1 يبين كيفية إيجاد حد في متتالية هندسية بمعرفة الحد الأول والنسبة المشتركة. ووضح **المثال 2** كيفية كتابة معادلة الحد النوني في متتالية هندسية. وبين **المثال 3** كيفية إيجاد الأوساط الهندسية بين عددين معطيين.

التقييم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمعاهيم.

أمثلة إضافية

- 1** أوجد الحد السادس لمتتالية هندسية، فيها $a_1 = -3$ و $r = -2$.
 $a_6 = 96$
- 2** اكتب معادلة الحد النوني لكل متتالية هندسية.
a. 5, 10, 20, 40, ...
 $a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$
b. $a_5 = 4$ و $r = 3$
 $a_n = \frac{4}{81} (3^{n-1})$
- 3** أوجد الأوساط الهندسية الثلاثة بين 3.12 و 49.92.
6.24, 12.48, 24.96 أو 24.96, 12.48, 6.24

انتبه!

تجنب الأخطاء شجع الطلاب على البدء في مسألة المتتالية الهندسية بكتابة القيم المعروفة لكل متغير من المتغيرات n و a و r .

إذا أعطيت بعض الحدود الخاصة بمتتالية هندسية ما، فيمكنك تحديد معادلة لإيجاد الحد النوني للمتتالية.

مثال 2 اكتب معادلة للحد النوني

اكتب معادلة للحد النوني لكل متتالية هندسية.

a. 0.5, 2, 8, 32, ...

$a_n = a_1 r^{n-1}$ الحد النوني لمتتالية هندسية
 $a_1 = 0.5(4)^{n-1}$ $r = 4$ و $a_1 = 0.5$

$r = 8 + 2$ أو $r = 0.5$ هو الحد الأول.

b. $a_4 = 5$ و $r = 6$

$a_n = a_1 r^{n-1}$ الحد النوني لمتتالية هندسية
 $5 = a_1(6^{4-1})$ $r = 6$ و $n = 4$
 $5 = a_1(216)$ أوجد قيمة a_1 .
 $\frac{5}{216} = a_1$ أوجد الطرفين على 216.

المحور 1 أوجد a_1 .

$a_n = a_1 r^{n-1}$ الحد النوني لمتتالية هندسية
 $a_4 = \frac{5}{216}(6)^{4-1}$ $r = 6$ و $a_1 = \frac{5}{216}$

المحور 2 اكتب المعادلة.

تمرين موجه **2A.** $a_n = -0.25(-8)^{n-1}$
اكتب معادلة للحد النوني لكل متتالية هندسية.

2A. -0.25, 2, -16, 128, ...

2B. $a_3 = 16$, $r = 4$ $a_n = 1(4)^{n-1}$

كما هو الحال في الأوساط الحسابية، فإن **الأوساط الهندسية** هي الحدود الموجودة بين حدين غير متجانسين لمتتالية هندسية، ويمكن استخدام النسبة المشتركة r لإيجاد الأوساط الهندسية.

مثال 3 إيجاد الأوساط الهندسية

أوجد ثلاثة أوساط هندسية بين 2 و 1250.

المحور 1 بما أن هناك ثلاثة حدود بين الحد الأول والحد الأخير، فهناك 2 + 3 أو 5 حدود إجمالية، إذا $n = 5$.

المحور 2 أوجد قيمة r .

$a_n = a_1 r^{n-1}$ الحد النوني لمتتالية هندسية
 $1250 = 2r^{5-1}$ $n = 5$ و $a_1 = 2$ و $a_n = 1250$
 $625 = r^4$ أوجد الطرفين على 4.
 $\pm 5 = r$ أوجد الجذر الرابع للطرفين.

المحور 3 استخدم r لإيجاد الأوساط الحسابية الأربعة.

$2 \quad -10 \quad 50 \quad -250 \quad 1250$ أو $2 \quad 10 \quad 50 \quad 250 \quad 1250$
 $\times -5 \quad \times -5 \quad \times -5 \quad \times -5$ $\times 5 \quad \times 5 \quad \times 5 \quad \times 5$


الأوساط الهندسية هي 10 و 50 و 250 أو -10 و 50 و -250.

تمرين موجه

3. أوجد الأوساط الهندسية الأربعة التي تقع بين 0.5 و 512.

الربط بتاريخ الرياضيات
أرخميدس (287-212 قبل الميلاد) كتب دراسة المتتاليات الهندسية أو المتجانسات الهندسية لأول مرة بواسطة عالم الرياضيات اليوناني أرخميدس. وجاهد دراساته لهندسة المتتاليات بسبب شغفه بالوسيقى والأشكال الهندسية.

قراءة في الرياضيات
الأوساط الهندسية يمكن تمثيل الوسط الهندسي بطريقة هندسية أيضاً في الشكل التالي، يمثل h الوسيط الهندسي الذي يقع بين x و y .



التركيز على محتوى الرياضيات

زيادة أو نقص المتتاليات الهندسية العديد من المتتاليات في هذا الدرس إما تزداد أو تقل. والنسبة المشتركة لهذه المتتاليات موجبة. إلا أنه إذا كانت النسبة المشتركة في متتالية هندسية سالبة، فلن تزداد أو تقل.





2 المتسلسلة الهندسية المتسلسلة الهندسية هي مجموع حدود المتتالية الهندسية. ويرمز إلى مجموع الحدود النونية الأولى في المتسلسلة بالرمز S_n . يمكن استخدام الصيغ التالية لإيجاد المجموع الجزئي S_n للحدود النونية الأولى للمتسلسلة الهندسية.

المفهوم الأساسي: المجموع الجزئي لمتسلسلة هندسية	
المعطيات	مجموع S_n لحدود النونية الأولى يساوي:
n و a_1	$S_n = \frac{a_1 - a_n r^n}{1 - r}, r \neq 1$
a_n و a_1	$S_n = \frac{a_1 - a_n}{1 - r}, r \neq 1$

مثال 4: من الحياة اليومية: إيجاد مجموع متسلسلة هندسية
موسيقى راجع بداية الدرس. إذا استمر التمثيل، فما إجمالي عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسل في الجولات الثمانية؟
 يتم إرسال خمس رسائل بريد إلكتروني في الجولة الأولى وهناك ثلثي جولات من عملية إرسال رسائل البريد الإلكتروني.
 إذا: $a_1 = 5$ و $r = 5$ و $n = 8$.

صيغة المجموع: $S_n = \frac{a_1 - a_n r^n}{1 - r}$
 $S_8 = \frac{5 - 5 \cdot 5^8}{1 - 5}$
 $S_8 = \frac{-1,953,120}{-4}$
 $S_8 = 488,280$
 سيكون هناك 488,280 رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها بعد الجولات الثمانية.

تمرين هجوه
 أوجد مجموع كل متسلسلة هندسية.
 4A. $a_1 = 2, n = 10, r = 3$ **59,048** 4B. $a_1 = 2000, a_n = 125, r = \frac{1}{2}$ **3875**

كما هو الحال مع المتسلسلة الحسابية، يمكن استخدام الرمز S_n أيضاً لتمثيل المتسلسلة الهندسية.

مثال 5: المجموع في الرمز سيجما
 أوجد قيمة $\sum_{k=3}^{10} 4(2)^{k-1}$
 أوجد قيم a, r و n في الحد الأول: $k = 3$ و $a = 4 \cdot 2^{3-1} = 16$ لذا عدد المرات
 الأسية هي $r = 2$ إذاً $r = 2$ هناك $10 - 3 + 1 = 8$ حدود إذاً $n = 8$.
 $S_n = \frac{a_1 - a_n r^n}{1 - r}$
 $S_8 = \frac{16 - 16(2)^8}{1 - 2}$
 $= 4080$
 استخدم الحاسبة.

تمرين هجوه
 أوجد مجموع كل مما يلي.
 5A. $\sum_{k=4}^{12} \frac{1}{4} \cdot 3^k - 1$ **66,426.75** 5B. $\sum_{k=3}^8 \frac{2}{3} \cdot 4^{k-1} - 1$ **58,253.333**

اقتبه!
 الرمز سيجما لا يسهل أنه يعطيك منك في المثال 5 إيجاد قيمة المجموع من الحد الثالث إلى الحد العاشر.

نصيحة للمعلمين الجدد
الاستنتاج المنطقي قد ترغب في أن تجعل الطلاب يتوسمون بحساب مجموع واحد أو أكثر بدون استخدام الصيغة للتحقق منها. وهذا من شأنه أيضاً أن يوضح فعالية الصيغة.

اقتبه!
 تجنب الأخطاء أكد على أهمية كتابة كل خطوة من حسابات المعادلة، حتى تُحدد كل قيمة عددية يتم إيجادها أثناء العملية بوضوح.

2 المتسلسلات الهندسية
المثال 4 يوضح كيفية إيجاد مجموع الحدود n الأولى في المتسلسلة الهندسية. وبيّن **المثال 5** كيفية تقييم مجموع مكتوب بترميز سيجما. وبيّن **المثال 6** كيفية إيجاد الحد الأول في متسلسلة هندسية بمعرفة مجموع عدد محدد من حدودها والنسبة المشتركة لها.

أزمة إضافية
4 الموسيقى استخدم المعلومات المتوفرة في المثال 4. كم عدد رسائل البريد الإلكتروني التي سترسل بعد الجولة السادسة؟ **19,530**
5 أوجد قيمة $\sum_{n=1}^{12} 3 \cdot 2^{n-1}$. **12,285**

التدريس المتميز

إذا كنت تعتقد أن الطلاب قد يهتمون بتعلم كيفية تطبيق هذا الدرس على حالات في الحياة اليومية.
اكتشف اطلب من الطلاب البحث عن كيفية استخدام علماء البيئية والبيولوجيا المتسلسلة الهندسية في عملهم لإحصاء تغيرات التعداد والتنمؤ بها في مختلف الكائنات الحية.



مثال إضافي

6 أوجد قيمة a_1 في متسلسلة هندسية حيث $S_8 = 765$ و $r = 2$ و $n = 8$

التركيز على محتوى الرياضيات

صيفتان تُستخدم صيغة المجموع للمتسلسلة الهندسية $S_n = \frac{a_1 - a_n r^n}{1 - r}$

عندما يكون عدد الحدود غير معطى وإذا كانت n معروفة، فيمكن استخدام الصيغة $S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$ لأنه في هذه الحالة ليس من الضروري حساب a_n .

التدريس باستخدام التكنولوجيا

كاميرا المستندات خصص العديد من التمارين للصف الدراسي. وامنح الطلاب الوقت للتعلم على حلها باستقلالية، بعد ذلك، اختر طلاباً لمشاركة وشرح حله أما الصف.

3 التمرين

التويم التكويني

استخدم التمارين 1-16 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

تدريس الممارسات في الرياضيات

التوافق يلاحظ الطلاب المتفوقون في الرياضيات تكرار العمليات الحسابية إن وجدت ويبحثون عن الطرق العامة والمختصرة معاً ويحافظ الطلاب المتفوقون في الرياضيات على مراقبة العملية أثناء العمل على حل المسألة مع الانتباه إلى التفاصيل.

يمكن استخدام الصيغة المتعلّقة بجمع المتسلسلة الهندسية للمساعدة في إيجاد حد معين للمتسلسلة.

مثال 6 إيجاد الحد الأول للمتسلسلة

أوجد قيمة a_1 في متسلسلة هندسية فيها $S_8 = 13,116$ و $r = 3$ و $n = 7$

$S_n = \frac{a_1 - a_n r^n}{1 - r}$	صيغة المجموع
$13,116 = \frac{a_1 - a_7(3^7)}{1 - 3}$	$n = 7$ و $r = 3$ و $S_n = 13,116$
$13,116 = \frac{a_1(1 - 3^7)}{1 - 3}$	خاصية التوزيع
$13,116 = \frac{-2186a_1}{-2}$	اطرح
$13,116 = 1093a_1$	بسط
$12 = a_1$	اقسم الطرفين على 1093

تمرين فوجوه

6. أوجد قيمة a_1 في متسلسلة هندسية فيها $S_8 = -26,240$ و $r = -3$ و $n = 8$

التحقق من فهمك

1. الانقسام برسم إسماعيل شجرة عائلة لجدّه. وقد تمكن من تتبع العديد من الأجيال. وإذا استنسخ إسماعيل تتبع 10 أجيال سابقة من عائلته، بدءاً من والديه، فكم عدد الأسلاف الذين سيتمكن من تتبعهم؟ **2046**
2. اكتب معادلة للحد النوني لكل متتالية هندسية.
 3. $a_n = 18\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$
 2. 2, 4, 8, ... $a_n = 2 \cdot 2^{n-1}$
 3. 18, 6, 2, ... $a_n = -4(-4)^{n-1}$
 4. -4, 16, -64, ... $a_n = 12(-8)^{n-1}$
 5. $a_2 = 4, r = 3$ $a_n = \frac{4}{3}(3)^{n-1}$
 6. $a_1 = \frac{1}{8}, r = \frac{3}{4}$ $a_n = \frac{128}{243}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$
 7. $a_2 = -96, r = -8$ $a_n = 12(-8)^{n-1}$
3. أوجد الأوساط الهندسية لكل متتالية.
 8. 0.25, $\frac{1}{2}, 2, 2, 64$ أو **1.4, 16** أو **-1.4, -16**
 9. 0.20, $\frac{1}{2}, 2, 125$ أو **1.5, 25** أو **-1.5, -25**
4. الألعاب ترتب من بعض صفوف قطع الدومينو بحيث عندما تعزب أول قطعة منها، تتناقص كل قطعة على قطعتين أخريين عندما تتوقف. وإذا كانت هناك عشرة صفوف، فكم عدد قطع الدومينو التي ستستخدمها؟ **1023**
5. أوجد مجموع كل متسلسلة هندسية.
 11. $\sum_{k=1}^6 3(4)^{k-1}$ **4095**
 12. $\sum_{k=1}^8 4\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$ **796875**
6. أوجد a_1 في كل متسلسلة هندسية موضحة.
 13. $S_6 = 85\frac{5}{16}, r = 4, n = 6$ **$\frac{1}{16}$**
 14. $S_8 = 91\frac{1}{12}, r = 3, n = 7$ **$\frac{1}{12}$**
 15. $S_2 = 1020, a_1 = 4, r = \frac{1}{2}$ **512**
 16. $S_2 = 121\frac{1}{3}, a_n = \frac{1}{3}, r = \frac{1}{3}$ **81**






إجابة إضافية

72. إجابة نموذجية: تكون المتسلسلة حسابية إذا كان كل زوج من الحدود المتتالية يشترك في فرق مشترك. وتكون المتسلسلة هندسية إذا كان كل زوج من الحدود المتتالية يشترك في نسبة مشتركة. إذا أظهرت المتسلسلة كلتا الخاصيتين، فإنها تكون حسابية وهندسية. وإذا لم تظهر المتسلسلة أيًا منهما، فهي ليست حسابية ولا هندسية.

57. العلوم ارتفع بالون متناظر بإفراز لمسافة 100 متر بعد دقيقة من إطلاقه. وفي كل دقيقة بعد ذلك، يرتفع البالون 50% خطف من المسافة التي ارتفعها في الدقيقة السابقة. ما المسافة التي سيرتفع إليها بعد مرور 5 دقائق؟ **193.75 m**

58. الكيمياء يبلغ نصف عمر عنصر الرادون حوالي 4 أيام. وهذا يعني أنه كل 4 أيام تقريباً، تتحلل نصف كتلة عنصر الرادون إلى عنصر آخر. فكم جراماً من الرادون سيتبقى من 60 جراماً موجودين من البداية بعد 4 أسابيع؟ **حوالي 0.46875 g**

59. التبرير ينظر العيرون في حاسوب مصصيا الملعقات. وإذا أصيب ملف في باور الأمر مع تضاعف عدد الملعقات لحماية كل دقيقة، فكم عدد الملعقات التي ستحتاج بعد 20 دقيقة؟ **524,288**



60. الهندسة في الشكل، تقع أضلاع كل مثلث متساوي الأضلاع ضعف حجم أضلاع المثلث المحاط الخاص به. وإذا استمر النمط، فأوجد مجموع محيطات أول ثمانية مثلثات. **حوالي 119.5 cm**

61. الهندسة تبلغ المسافة المقطوعة لحركة الأرجحة الأولى للبدول 30 سنتيمتراً. وإذا بلغت مسافة كل حركة أرجحة بالية 95% من حركة الأرجحة السابقة، فأوجد المسافة الكلية التي يقطعها البدول بعد الأرجحة الثلاثين. **حوالي 471 cm**

62. سلاسل الاتصالات أُنشأت إحدى المدارس سلسلة اتصالات بحيث يمكن لكل موظف الاتصال بأثنين آخرين من الموظفين لإخبارهم بواجبهم. إتمام إلقاء المدرسة بسبب أحوال الطقس. وبدأت الجولة الأولى من الاتصالات عندما اتصل المشرف بكل مديري المدرسة. فإذا كان عدد الموظفين إجمالاً بلغ 94 موظفاً بالمدرسة، فكم جولة من الاتصالات ستتم في هذا الخصوص؟ **7**

63. أجهزة التلفاز تفتن إحدى شركات الإلكترونيات الكبرى عن طرحها خطة تقسيط أسبوعية يمكن بموجبها شراء جهاز من علامة تجارية شهيرة من أجهزة التلفاز عالية الدقة. ويدفع المشتري 15 AED في نهاية الأسبوع الأول، و 16.50 AED في نهاية الأسبوع الثاني، و 18.15 AED في نهاية الأسبوع الثالث. وهكذا لمدة عام. افترض أن عامًا واحدًا = 52 أسبوعًا.

63a. AED 35.37,
AED 91.74,
AED 617.16

63c. تم تقريب كل عملية دفع إلى أقرب قس، لذا سيصبح مجموع المدفوعات في الواقع أكثر من المجموع الوارد في الجزء b.

63b. أوجد التكلفة الإجمالية لجهاز التلفاز. **AED 21256.45**

63a. كم مبلغ المدفوعات في نهاية الأسبوع العاشر والعشرين والأربعين؟

63c. أليذا تعتبر التكلفة الموجودة في الجزء b غير دقيقة كلياً؟

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

64. البرهان اثبت صحة المجموع العامة باستخدام صحة المجموع البديلة. **انظر الهامش.**

65. البرهان اثبت صحة مجموع لا تشيل وه. **انظر الهامش.**

66. الإجابة النموذجية:
 $256 + 192 + 144 + 108 + 81 + \frac{243}{4}$


66. مسألة غير محددة الإجابة اكتب متسلسلة هندسية بحيث يكون $t = \frac{3}{4}$ و $n = 6$.

67. التبرير اشرح كيف أن $\sum_{k=1}^n 3(2)^{k-1} = 3(2^n - 1)$ تحتاج إلى التفسير للإشارة إلى نفس المتسلسلة إذا تغير $k = 0$ إلى $k = 1$. اشرح استنتاجك. **انظر ملحق إجابات الوحدة 9.**

68. البرهان برهن الصيغة المتعلقة بالحد النوني لمتتالية هندسية. **انظر ملحق إجابات الوحدة 9.**

69. تحد الحد الخامس لمتتالية هندسية هو الحد رقم $\frac{1}{2}$ للحد الثامن. إذا كان الحد التاسع يساوي 720 فما قيمة الحد الثامن؟ **234**

70. تحد استخدم حقيقة أن h يمثل الوسط الهندسي x و y في الشكل الموجود على اليسار لإيجاد h^4 بدلالة كل من x و y . **تحويل**



71. مسألة غير محددة الإجابة اكتب متسلسلة هندسية بها 6 حدود ومجموع يساوي 252. **الإجابة النموذجية: 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4**


72. كتابة في الرياضيات كيف يمكنك تصنيف متتالية؟ وضع استنتاجك. **انظر الهامش.**





تدريب على الاختبار المعياري

76. SAT/ACT ما الدالة التي قد يكون المنحنى أدناه جزءاً من التمثيل البياني لها؟ **E**



A $y = \sqrt{x}$
 B $y = x^2 - 5x + 4$
 C $y = -x + 20$
 D $y = \log x$
 E $xy = 4$

77. أي من التالي يعد الأقرب إلى $\sqrt{7.32}$ ؟ **B**

A 1.8
 B 1.9
 C 2.0
 D 2.1

78. الحد الأول لتسلسلة هندسية هو 5، والنسبة المشتركة هي -2. كم عدد الحدود في التسلسلة إذا كان مجموعها يساوي -6825؟ **J**

F 5
 G 9
 H 10
 J 12

79. الإجابة المختصرة لدى عائشة حساب ادخار خاص بها، وهي تسحب نصف مضمونات الحساب كل عام. وبعد 4 أعوام، تبقى لديها AED 2000، فكم كان لديها في حساب الادخار في الأصل؟ **AED 32,000**

مراجعة شاملة

77. الهياك اشترت منال جهاز تلفزيون LCD عالي الدقة من متجر الإلكترونيات، ودفعت AED 800 على الفور و AED 300 شهرياً لمدة عام ونصف، فكم دفعت منال إجمالاً مقابل التلفاز؟ **الدرس 2-19**
AED 6200

78. حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية، أم هندسية، أم غير ذلك. اشرح استنتاجك. **الدرس 1-19**

79. $\frac{7}{25}, \frac{11}{50}, \frac{6}{25}, \frac{11}{50}, \dots$
 80. $\frac{22}{1}, \frac{68}{9}, \frac{208}{27}, \frac{632}{81}, \dots$

78. $\frac{1}{30}, \frac{3}{5}, \frac{7}{20}, \frac{17}{20}, \dots$

أوجد مركز كل دائرة ونصف قطرها. ثم ارمز الدائرة بيانياً. **81-83. انظر الهامش.**

81. $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 25$
 82. $(x+3)^2 + (y+7)^2 = 81$
 83. $(x-3)^2 + (y+7)^2 = 50$

84. افترض أن y تتغير بشكل مشترك مع x و z . أوجد y عندما يكون $x = 9$ و $z = -5$ إذا كان $y = -90$ عندما يكون $x = 15$ و $z = -6$ و $x = -45$.

85. التسوق اكتشف متجر ما أن عدد العملاء الذين مسحروا تخفيضات لبيع بأسعار يمكن تسليطهم باستخدام $N = 125\sqrt{1000P}$ ، حيث N تمثل العدد المتوقع للعملاء، و P النسبة المئوية للتخفيض. و t عدد ساعات سريان الخصم. أوجد عدد العملاء الذين يتوقع المتجر حضورهم لهذه التخفيضات التي تستمر نسبتها إلى 50% وتستمر أربع ساعات. **731 عميلاً**

مراجعة المهارات

أوجد قيمة كل تعبير إذا كان $a = -2$ و $b = \frac{1}{3}$ و $c = -12$.




86. $\frac{3ab}{c} = \frac{1}{6}$
 87. $\frac{a-c}{a+c} = \frac{5}{7}$
 88. $\frac{a^2-c}{b^2} = 36$
 89. $\frac{c+3}{ab} = \frac{27}{2}$

568 | الدرس 9-3 | المتتاليات والتسلسلات الهندسية

4 التقويم

الكرة البلورية اطلب من الطلاب وصف ما يعتقدونه حول كيف لمعرفة مجاميع المتسلسلات الهندسية أن تساعدهم في تعلم مجاميع متسلسلات هندسية لانهاية في الدرس التالي.

إجابات إضافية



التدريس المتميز

التوسع اكتب تعبيراً للحد n في المتتالية الهندسية $a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$ على اللوحة. واطلب من الطلاب كتابة تعبير للحد التالي، برقم الحد $(n+1)$. باستبدال n بـ $(n+1)$ في التعبير ar^{n-1} ، ثم اطلب منهم إيضاح أن $\frac{ar^n}{ar^{n-1}} = r$ يساوي النسبة المشتركة r . $a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$



الاكتشاف 4-9
مختبر الجبر
المساحة تحت المنحنى

1 التركيز

الهدف تقريب المساحة أسفل المنحنى خلال فترة محددة، واستخدام مجموع المساحات المستطيلة أسفل المنحنى.

المواد الخاصة لكل مجموعة
 • ورق رسم بياني

وسائل تعليمية يدوية سهلة التشكيل
 تدريس الجبر باستخدام قوالب الوسائل التعليمية اليدوية الخاصة بـ:

• ورق رسم بياني، ص. 1

نصيحة للتدريس

ينبغي أن يتعرف الطلاب على كيفية إيجاد مساحة الأشكال غير المنتظمة. وفي هذا الصدد، فإن هذا الدرس يتناول أيضًا كيفية إيجاد مساحة شكل غير منتظم. وينبغي أن تكون المستطيلات التي يقوم الطلاب بتقسيم المساحة إليها بالعرض ذاته. ويمكنك أن تقترح على الطلاب ترفيق المستطيلات التي يرسمونها أسفل المنحنى من 1 إلى 8.


2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

قسّم الطلاب ذوي القدرات المختلفة إلى مجموعات ثنائية. وأطلب منهم حل خطوات كل من الطريقة 1 والطريقة 2 في النشاط. ثم الإجابة عن التمارين 1-4.

اطرح السؤال التالي:

- ماذا يمثل عرض كل شبكة في تمثيلك البياني؟ **متر واحد**
- في الطريقة 1، هل استخراج المستطيلات عن نطاق التمثيل البياني للمعادلة التربيعية؟ **لا**
- كيف يمكنك إيجاد ارتفاع كل مستطيل؟ **استخدم قيم x و y الموجودة في الجدول من الخطوة 1.**



بم إمامة تصميم إستانة لكرة القدم بحيث يكون هناك متر على شكل قوس في المدخل الرئيسي. ولم وضع مخراس رسم لهذا المتر بحيث يمثل كل خط على ورقة الرسم البياني متر واحد على المتر الحقيقي. وقام التمسو بتشكل قبة الشكل باستخدام المعادلة التربيعية $y = -0.25x^2 + 3x$


النشاط

أوجد مساحة الفتحة تحت القوس.

الطريقة 1

المجموعة 1 انشئ جدولاً لقيم $y = -0.25x^2 + 3x$ ثم مثل المعادلة بيانياً.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y	0	2.75	5	6.75	8	8.75	9	8.75	8	6.75	5	2.75	0



المجموعة 2 قسّم الشكل إلى عدة مناطق.

لتقدير مساحة المنطقة الواقعة داخل القوس، يمكنك قسمة القوس على المستطيلات كما هو موضح بالكون الأزرق. نظراً لأن الطرفين الأيسر والأيمن للقسر القوسي يتعان على ارتفاع 5 أمتار و $y = 5$ إذا كان $x = 2$ وإذا كان $x = 10$ فإن قسمة المدخل شدة من 2 إلى 10 x .

المجموعة 3 أوجد مساحة هذه المناطق.

المستطيل	1	2	3	4	5	6	7	8
العرض (m)	1	1	1	1	1	1	1	1
الارتفاع (m)	5	6.75	8	8.75	8.75	8	6.75	5
المساحة (m ²)	5	6.75	8	8.75	8.75	8	6.75	5

المساحة التقريبية للقوس تساوي مجموع مساحات المستطيلات.
 $5 + 6.75 + 8 + 8.75 + 8.75 + 8 + 6.75 + 5 = 57 \text{ m}^2$

(ي تتبع في الصفحة التالية)





مختبر الجبر المساحة تحت المنحنى

الاكتشاف 9-4

التمرين اطلب من الطلاب إكمال التمارين 5-7.

3 التقييم

التقييم التكويني

استخدم التمرين 5 لتقييم مدى قدرة الطلاب على تقريب المساحة أسفل المنحنى خلال فترة محددة.


من العملي إلى النظري

اطلب من الطلاب تكرار النشاط. بحيث يمثل كل شبكة 0.5 متر بدلاً من متر واحد. ومن ثم استخدام 16 مستطيلاً بدلاً من 8. اسأل الطلاب ما إذا كانوا يعتقدون أن النتائج أقرب إلى المساحة الفعلية أسفل المنحنى. ثم اسألهم كيف يمكنهم الاقتراب أكثر من العدد الفعلي للأمتار المربعة الموجودة أسفل المنحنى.

إجابات إضافية

المستطيل	1	2	3	4
العرض (m)	1	1	1	1
الارتفاع (m)	6.75	8	8.75	9
المساحة (m ²)	6.75	8	8.75	9

4. فتر المساحة، $2(13.5 + 18) = 63 \text{ m}^2$. سيكون التقدير أكبر من المساحة الفعلية. حيث تقع 4 أجزاء من المستطيلات خارج المساحة أسفل المنحنى وجزءان من المساحة أسفل المنحنى لا يقعان في نطاق المستطيلات. وبعد هذا التقدير أكثر دقة من التقديرين الآخرين.



الطريقة 1 ارسو النماذج البياني الثاني للعبادة والتمهيد إلى مناطق الحجم المر القوسي إلى مستطيلات كما هو موضح باللون الأزرق.

الطريقة 2 أوجد مساحة هذه المناطق.


المستطيل	1	2	3	4	5	6	7	8
العرض (m)	1	1	1	1	1	1	1	1
الارتفاع (m)	6.75	8	8.75	9	9	8.75	8	6.75
المساحة (m ²)	6.75	8	8.75	9	9	8.75	8	6.75

المساحة التقريبية للمر القوسي تساوي مجموع مساحات المستطيلات.
 $6.75 + 8 + 8.75 + 9 + 9 + 8.75 + 8 + 6.75 = 65 \text{ m}^2$

توضح الطريقتان 1 و 2 كيفية تقريب المساحة الواقعة أسفل منحنى وعلى فترة محددة.

تحليل النتائج

- هل مساحة المناطق التي تم حسابها باستخدام الطريقة 1 أكبر أم أصغر من المساحة الحقيقية للمر القوسي؟ اشرح استنتاجك.
- هل مساحة المناطق التي تم حسابها باستخدام الطريقة 2 أكبر أم أصغر من المساحة الحقيقية للمر القوسي؟ اشرح استنتاجك.
- قارن بين تقديرات المساحات بالنسبة للطريقتين. كيف يمكنك إيجاد أفضل تقدير للمساحة الواقعة داخل المر القوسي؟ اشرح استنتاجك.
- يوضح الرسم التخطيطي طريقة لثلاثة لإيجاد تقدير لمساحة المر القوسي. هل هذا التقدير للمساحة أكبر أم أصغر من المساحة الفعلية؟ ما وضع هذا التقدير عند مقارنته بالتقديرين الآخرين للمساحة؟ انظر الهاش.



- أقل: الإجابة النموذجية: تقع المستطيلات داخل القوس وتترك بعض المساحات مجهولة.
- أكبر: الإجابة النموذجية: تتضمن المستطيلات مساحة خارج القوس.
- الإجابة النموذجية: أوجد وسط التقديرات، $61 = (65 + 57) \div 2$.

التمارين

قدر المساحة التي توصلت إليها كل طريقة. وأضن جدولاً بالقيم. وارسم تخطيطات بيانية بالمستطيلات. واستخدم الجدول لتسجيل قيم مساحات المستطيلات. قارن بين كل تقدير والمساحة الفعلية. 5-7 انظر ملحق إجابات الفصل 9.

- مساحة المنطقة الواقعة تحت المنحنى بالنسبة لـ $x = -2$ إلى $x = 2$ وفوق المحور x .
- مساحة المنطقة الواقعة تحت المنحنى بالنسبة لـ $x = 2$ إلى $x = 4$ وفوق المحور x .
- مساحة المنطقة الواقعة تحت المنحنى بالنسبة لـ $x^2 = 4 - y$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ وفوق المحور x .
- مساحة المنطقة الواقعة تحت المنحنى بالنسبة لـ $x^2 = 3 - y$ من $x = -3$ إلى $x = 3$ وفوق المحور x .





الدرس 4-9

1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 4-9 إيجاد مجاميع المتسلسلات الهندسية اللانهاية.

الدرس 4-9 إيجاد مجاميع المتسلسلات الهندسية اللانهاية، وكتابة الكسور العشرية المتكررة في صورة كسور اعتيادية.

بعد الدرس 4-9 كتابة الصيغ التكرارية للمتسلسلات.

2 التدريس

الأسئلة الداعية

اطلب من الطلاب قراءة قسم **لماذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

- لكتابة متسلسلة هندسية تمثل هذا الموقف، ماذا سيكون الحد الأول؟ 5
- ماذا سيكون الحد الثاني؟ 2.5
- اكتب الحدود الأربعة الأولى في المتسلسلة.
- لماذا تسمى هذه المتسلسلة متسلسلة لا نهائية؟ الإجابة النموذجية: إنها تستمر إلى ما لا نهاية.

المتسلسلة الهندسية اللانهاية

لماذا؟

في مباراة لكرة القدم الأمريكية، كان الضمب يطف على خط العشر يارات، وملك معاقبة الدفاع نصف المسافة إلى إحراز الهدف، وكانت الكرة موضوعة على خط الخمس يارات. أين استروا في تلقى المعاقبات بعدة الطريقة، أين سيام وضع الكرة في النهاية؟ وما إجمالي عدد يارات المعاقبة التي سوف يتكدها الدفاع؟ يمكن الإجابة على هذين السؤالين من خلال الاطلاع على المتسلسلة الهندسية اللانهاية.

الحالي

1 إيجاد مجاميع المتسلسلات الهندسية اللانهاية.

2 كتابة الكسور العشرية المتكررة في صورة كسور اعتيادية.

المسابق

• لقد أوجدت مجاميع المتسلسلات الهندسية المتناهية.

المفردات الجديدة



المتسلسلة الهندسية اللانهاية
infinite geometric series
متسلسلة تقاربية
convergent series
متسلسلة تتباعدة
divergent series
لانهاية infinity

ممارسات في الرياضيات

مراجعة الدقة
البحث عن التوافق في الاستنتاجات المتكررة والتعبير من ذلك.

1 المتسلسلة الهندسية اللانهاية يوجد لدى **المتسلسلة الهندسية اللانهاية** عدد لا يحصى من الحدود، ويطلق على المتسلسلة التي لها مجموع **متسلسلة تقاربية**. وذلك لأن مجموعها يتقرب من قيمة محددة. أما المتسلسلة التي ليس لها مجموع، فيطلق عليها **متسلسلة تتباعدة**.

عندما تقوم بتقريب المجموع S_n لمتسلسلة هندسية لانهاية للحدود البونية الأولى، فأنت تلاحظ المجموع الجزئي للمتسلسلة، ومن الممكن كذلك إيجاد مجموع متسلسلة كاملة في التطبيق الوارد أملاه، يبدو أن الكرة ستصل في النهاية خط إحراز الهدف، ويستبدد الدفاع عقوبة بأجمالي 10 يارات، وهذه القيمة هي المجموع الفعلي للمتسلسلة اللانهاية $5 + 2.5 + 1.25 + \dots$ موضح على البيان أدناه التمثيل البياني لـ S_n حيث $1 \leq n \leq 10$ ، وكلما زاد n ، يتقرب S_n من العدد 10.

المفهوم الأساسي المتسلسلات التقاربية والتباعدة	
متسلسلة تتباعدة	متسلسلة تقاربية
<p>الشرح</p> <p>لا يتقرب المجموع من قيمة نهائية.</p> <p>النسبة</p> <p>$r \geq 1$</p> <p>مثال</p> <p>$\frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \dots$</p> 	<p>الشرح</p> <p>يتقرب المجموع من قيمة نهائية.</p> <p>النسبة</p> <p>$r < 1$</p> <p>مثال</p> <p>$5 + 2.5 + 1.25 + \dots$</p> 

مثال 1 المتسلسلات التقاربية والتباعدة

حدد ما إذا كانت كل متسلسلة هندسية لانهاية تقاربية أم تتباعدة.

a. $54 + 36 + 24 + \dots$

أوجد قيمة r .

$r = \frac{36}{54}$ أو $r = \frac{2}{3}$ ، حيث $|\frac{2}{3}| < 1$. المتسلسلة تقاربية.

571

472 / 62

Scanned by CamScanner



b. $8 + 12 + 18 + \dots$

$r = \frac{12}{8} = 1.5$ أو نظراً لأن $1.5 > 1$ فإن المتسلسلة المتعادلة.

تمرين موجه

1A. $2 + 3 + 4.5 + \dots$ **تقريبية**

1B. $100 + 50 + 25 + \dots$ **تقريبية**

عندما يكون $|r| < 1$ فإن قيمة r^n سوف تقترب من الصفر مع زيادة n . إذاً ستقترب المجاميع الجزئية للمتسلسلات الهندسية اللانهائية من $\frac{a_1}{1-r}$ أو $\frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$.

نصيحة دراسية
القيمة المطلقة للرقم r هي $|r|$ وهي $|r| < 1$.

المفهوم الأساسي مجموع المتسلسلات الهندسية اللانهائية
يمكن إيجاد مجموع S لمتسلسلة هندسية لانهائية عند $|r| < 1$ باستخدام $S = \frac{a_1}{1-r}$
إذا كان $|r| \geq 1$ فإن المتسلسلة لا يوجد لها مجموع.

n	S_n
5	1364
10	1,398,100
15	1,431,655,764

عندما تكون متسلسلة هندسية لانهائية متعادلة، فإن $|r| \geq 1$ ولا يكون للمتسلسلة أية مجموع. نظراً لأن القيمة المطلقة لـ r^n سوف تزداد بشكل لانهائي بزيادة n .

يوضح الجدول على اليسار المجاميع الجزئية للمتسلسلة المتعادلة $4 + 16 + 64 + \dots$. عندما تزداد قيمة n فإن قيمة r^n تزداد بسرعة وإلى ما لا نهاية.

مثال 2 مجموع متسلسلة لانهائية
أوجد مجموع كل متسلسلة لانهائية. إن وجد.
حدد ما إذا كانت كل متسلسلة هندسية لانهائية تقريبية أم متعادلة.

a. $\frac{2}{3} + \frac{6}{15} + \frac{18}{75} + \dots$

$r = \frac{6/15}{2/3} = \frac{2}{3}$ أو $\frac{18/75}{6/15} = \frac{2}{3}$

$S = \frac{2/3}{1-2/3} = 2$

$= \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \dots$

b. $6 + 9 + 13.5 + 20.25 + \dots$

$r = \frac{9}{6} = 1.5$ أو نظراً لأن $1.5 \geq 1$ فإن المتسلسلة تتباعد ولا يوجد مجموع.

2A. $4 - 2 + 1 - 0.5 + \dots$ **تقريبية**

2B. $16 + 20 + 25 + \dots$ **لا يوجد مجموع**

نصيحة دراسية
التقارب والتباعد: تقارب المتسلسلة عندما تكون القيمة المطلقة للحد أسفر من القيمة المطلقة للحد السابق وبذلك ستكون المتسلسلة الحسابية اللانهائية ذاتها متعادلة.

1 المتسلسلات الهندسية اللانهائية

المثال 1 يبين كيفية تحديد ما إذا كانت المتسلسلة الهندسية اللانهائية تقريبية أم متعادلة. وبين **المثال 2** كيفية إيجاد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية. بينما يوضح **المثال 3** الأمر ذاته للمتسلسلة بمعرفة الرمز سيجما.

التقويم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

أمثلة إضافية

1 حدد ما إذا كانت كل متسلسلة هندسية لانهائية تقريبية أم متعادلة.

a. $729 + 243 + 81 + \dots$

متقاربة

b. $2 + 5 + 12.5 + \dots$

متباعدة

2 أوجد مجموع كل متسلسلة هندسية لانهائية. إن وجد.

a. $-\frac{4}{3} + 4 - 12 + 36 - 108 + \dots$

لا يوجد مجموع

b. $3 - \frac{3}{2} + \frac{3}{4} - \frac{3}{8} + \dots$ **2**

نصيحة للمعلمين الجدد

الاستنتاج تأكد من قدرة الطلاب على تفسير لماذا يمكن كتابة $|r| < 1$ في صورة $-1 < r < 1$ أيضاً. وقد يساعد التمثيل البياني لهذه المتباينة على خط الأعداد في فهم الطلاب المحصود من هذين الترميزين الرياضيين المختلفين.

التركيز على محتوى الرياضيات

مجموع المتسلسلات الهندسية اللانهائية يعتمد وجود مجموع للمتسلسلات الهندسية اللانهائية من عدمه على ناتج أي حد والنسبة المشتركة r . وستظل القيمة المطلقة لناتج أي عدد وكسر بين -1 و 1 دائماً أقل من القيمة المطلقة للعدد الأصلي. ومن ثم سيكون للمتسلسلات مجموع إذا كان $|a_n| > |a_{n+1}|$.





مثال إضافي

3 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{10} 5\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$

انتبه!

تجنب الأخطاء اطلب من الطلاب كتابة بضع حدود للمتسلسلة في المثال 3 للتأكد من قدرتهم على كتابة الترميز.

2 الكسور العشرية المتكررة

المثال 4 بين كيفية كتابة كسر عشري متكرر في صورة كسر اعتيادي.

مثال إضافي

4 اكتب $0.\overline{25}$ في صورة كسر اعتيادي. $\frac{25}{99}$

تدريس الممارسات في الرياضيات

الاستنتاج المنطقي يبدأ الطلاب المتفوقون في الرياضيات بشرح معنى المسألة لأنفسهم والبحث عن نقاط بدء الحل. شجّع الطلاب على تحديد طريقة لحل المسألة تبدو منطقية لهم.

التدريس باستخدام التكنولوجيا

الرسائل الفورية اجعل الطلاب يميلوا في مجموعات ثنائية. يقوم الطالب الأول بإرسال رسالة تحتوي على كسر عشري متكرر. ومن ثم، يقوم الطالب الثاني بكتابة الكسر العشري في صورة كسر اعتيادي. واجعل الطلاب يتبادلوا الأدوار ويكرروا العملية.

يمكن استخدام الرمز \sum لكتابة المتسلسلة الانتهائية. إذا كانت متتالية لانتهائية، فإنها تستمر من نهاية ووضع رمز الانتهائية ∞ فوق رمز \sum لتوضيح أن المتسلسلة لانتهائية.

مثال 3 المتسلسلة الانتهائية في الرمز سيحسا

أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{\infty} 18\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$

صيغة المجموع $S = \frac{a_1}{1-r}$
 $r = \frac{1}{3}$ و $a_1 = 18$
 $S = \frac{18}{1-\frac{1}{3}} = \frac{18}{\frac{2}{3}} = 18 \cdot \frac{3}{2} = 27$

تمرين موجه
 3. أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{\infty} 12\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$

2 الكسور العشرية المتكررة الكسر العشري المتكرر هو مجموع المتسلسلة الهندسية الانتهائية. على سبيل المثال... $0.45 = 0.454545... = 0.45 + 0.0045 + 0.000045 + \dots$ ويمكن استخدام صيغة مجموع المتسلسلة الانتهائية هذه لتحويل الكسر العشري إلى كسر اعتيادي.

مثال 4 اكتب كسرا عشريا متكررا في صورة كسر اعتيادي.

اكتب $0.\overline{63}$ في صورة كسر اعتيادي.

الطريقة 1 استخدم مجموع المتسلسلة الانتهائية.

$0.\overline{63} = 0.63 + 0.0063 + \dots$
 $= \frac{63}{100} + \frac{63}{10,000} + \dots$
 $S = \frac{a_1}{1-r}$
 $r = \frac{1}{100}$ و $a_1 = \frac{63}{100}$
 $S = \frac{\frac{63}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{63}{99} = \frac{7}{11}$

صيغة المجموع

$r = \frac{1}{100}$ و $a_1 = \frac{63}{100}$

بسط

الطريقة 2 استخدم الخواص الجبرية.

بفرض أن $x = 0.\overline{63}$
 اكتب في صورة كسر عشري متكرر.
 اضرب الطرفين في 100
 اطرح x من $100x$ واطرح $0.\overline{63}$ من $63.\overline{63}$
 اطرح الطرفين على 99

$x = 0.\overline{63}$
 $x = 0.636363...$
 $100x = 63.636363...$
 $99x = 63$
 $x = \frac{63}{99} = \frac{7}{11}$

تمرين موجه
 4. اكتب $0.\overline{27}$ في صورة كسر اعتيادي. $\frac{7}{33}$

نصيحة في حل المسائل
 الاستنتاج المنطقي في العديد من الحالات، يمكن حل مسألة بأكثر من طريقة. استخدم الطريقة التي تشعر معها براحة أكبر.

نصيحة دراسية
 الكسور العشرية المتكررة كل كسر عشري متكرر هو عبارة عن عدد نسبي ويمكن كتابته في صورة كسر اعتيادي.

التدريس المتميز

المتعلمون أصحاب النمط المنطقي اطلب من الطلاب إجراء بحث والقراءة عن أحيوية الرياضيات الشهيرة "مجازفة زينو". واجعلهم يناقشوا قصة سباق السلحفاة من منظور محنوي هذا الدرس.






التحقق من فهمك

1. $16 - 8 + 4 - \dots$ **تقريبية** ... **تقريبية** ... **تقريبية** ... **تقريبية** ...
2. $32 - 48 + 72 - \dots$ **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ...
3. $0.5 + 0.7 + 0.98 + \dots$ **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ...
4. $1 + 1 + 1 + \dots$ **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ...
5. $440 + 220 + 110 + \dots$ **880** ... **880** ... **880** ... **880** ...
6. $520 + 130 + 32.5 + \dots$ **693.5** ... **693.5** ... **693.5** ... **693.5** ...
7. $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{9}{16} + \dots$ **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...
8. $\frac{32}{9} + \frac{26}{3} + 8 + \dots$ **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...
9. **التبرير المنطقي** يبلغ عمر النصف لدواء معين 8 ساعات قبل تناول المريض له. ما النسبة المتبقية للدواء الموجودة داخل جسم المريض بعد مرور 24 ساعة؟ **12.5%**
10. $\sum_{k=1}^5 5 \cdot 4^{k-1}$ **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...
11. $\sum_{k=1}^5 (-2) + (0.5)^{k-1} - 4$... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...
12. $\sum_{k=1}^5 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$ **15** ... **15** ... **15** ... **15** ...
13. $\sum_{k=1}^5 \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$ **2** ... **2** ... **2** ... **2** ...
14. $0.35 \frac{35}{99}$... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...
15. $0.642 \frac{214}{333}$... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...

التدريب وحل المسائل

16. $21 + 63 + 189 + \dots$ **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ...
17. $480 + 360 + 270 + \dots$ **تقريبية** ... **تقريبية** ... **تقريبية** ... **تقريبية** ...
18. $\frac{3}{4} + \frac{9}{8} + \frac{27}{16} + \dots$ **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ...
19. $\frac{5}{6} + \frac{30}{9} + \frac{40}{27} + \dots$ **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ...
20. $0.1 + 0.01 + 0.001 + \dots$ **تقريبية** ... **تقريبية** ... **تقريبية** ... **تقريبية** ...
21. $0.008 + 0.08 + 0.8 + \dots$ **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ... **تقاعدية** ...
22. $18 + 21.6 + 25.92 + \dots$ **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...
23. $-3 - 4.2 - 5.88 - \dots$ **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...
24. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ **3/4** ... **3/4** ... **3/4** ... **3/4** ...
25. $\frac{12}{5} + \frac{6}{5} + \frac{3}{5} + \dots$ **24/5** ... **24/5** ... **24/5** ... **24/5** ...
26. $21 + 14 + \frac{28}{3} + \dots$ **63** ... **63** ... **63** ... **63** ...
27. $32 + 40 + 50 + \dots$ **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ... **لا يوجد مجموع** ...



28. **أرجوحات** إذا لم يدفع حسن الأرجوحة مره أخرى بعد الأرجحة الأولى، فإن المسافة التي تنقطعها في الأرجحة الواحدة سوف تتناقص بمقدار 10% مع كل أرجحة. إذا كانت في الأرجحة الأولى قد قطعت مترين، فأوجد إجمالي المسافة التي قطعها الأرجوحة عند استقرارها. **20 m**

574 | الدرس 9-4 | المتسلسلة الهندسية اللانهائية

خيارات الواجب المنزلي المتميزة

المستوى	الواجب	خيار اليومين
AL مبتدئ	16-40, 60, 61, 63-76	60, 61, زوجي 40-60, 63-67, 72-76
OL أساسي	17-39, 41-43, 45-49, 63-76	16-40, 68-71, 41-61, 63-67, 72-76
EL متقدم	41-73, (74-76 اختياري)	

574 | الدرس 9-4 | المتسلسلة الهندسية اللانهائية





التمثيلات المتعددة

في التمرين 50. يستخدم الطلاب التمثيل بالنماذج والتحليل العددي والوصف اللفظي لتمثيل متسلسلة لا نهائية ومجموعها.

مثال 3

مثال 4

- أوجد مجموع كل متسلسلة لا نهائية. إن وجد، γ يوجد مجموع.
29. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$ 30. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot 3^{k-1}$ 31. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - \frac{1}{12}$
32. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$ 33. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - 16$ 34. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - 1 - \frac{3}{22}$
- اكتب كل كسر عشري متكرر في صورة كسر اعتيادي.
35. $0.03\overline{31}$ 36. $0.14\overline{3}$ 37. $2.\overline{18}$ 38. $4.\overline{36}$ 39. $0.12\overline{14}$ 40. $0.43\overline{36}$

41. **المراوح** تدور مروحة بسرعة 10 دورات في الثانية. وبعد إيقاف تشغيلها، تتناقص سرعتها بمعدل 75% في الثانية، حده عدد الدورات التي تكتملها المروحة بعد إيقاف تشغيلها $\frac{40}{3}$.
42. **الدقة** أودعت سالي مبلغاً قدره AED 5000 في حساب مصرفي في بداية العام. ويسدد المصرف لها 8% كل عام كنسبة مزايدة.
- a. ما مقدار المال الذي سيكون في الحساب بعد 20 عاماً؟ (اشرح افتراض أن $5000(1 + 0.08)^t$ يمثل نهاية العام الأول.) **AED 23,304.79**
- b. هل هذه المتسلسلة تقاربية أم متباعدة؟ اشرح. **هذه متسلسلة تباعدية. النسبة هي 1.08 وهي أكبر من 1.**
43. **بطاريات قابلة للشحن** تم الدروع لنوع من البطاريات القابلة للشحن على أنها يمكن شحنها بنسبة 99.9% من سعتها السابقة في كل شحن. إذا كانت السعة الأصلية هي 8 ساعات من التشغيل، فما إجمالي الساعات التي يمكن للبطارية أن تكتملها حتى تنتهي؟ **8000 hrs**

- أوجد مجموع كل متسلسلة لا نهائية. إن وجد، γ يوجد مجموع.
44. $\frac{7}{5} + \frac{21}{20} + \frac{63}{80} + \dots$ 45. $\frac{15}{4} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} + \dots$ 46. $-\frac{16}{9} + \frac{4}{3} - 1 + \dots$
47. $\frac{15}{8} + \frac{5}{2} + \frac{10}{3} + \dots$ 48. $\frac{21}{16} + \frac{7}{4} + \frac{7}{4} + \dots$ 49. $-\frac{18}{7} + \frac{13}{7} - \frac{8}{7} + \dots$

50. **التمثيلات المتعددة** في هذه المسألة، سوف تستخدم مربعاً من الورق يبلغ طول ضلعه 8 سنتيمترات على الأقل.
- a. **عملياً** افترض أن المربع على وحدة واحدة. اقطع نصفاً واحداً من المربع وأطلق على هذه القطعة الحد 1. ثم اقطع نصفاً واحداً من الجزء المتبقي من الورقة. وأطلق على هذه القطعة الحد 2. استمر في قطع الجزء المتبقي من الورقة إلى النصف وأطلق عليها عدد الحدود إلى أن تنتهي الورقة. ثم أدرج الكسور التي تشكلها هذه القطع في قائمة.
- b. **عددياً** إذا كنت تستطيع قطع المربعات بشكل لا نهائي، فسيتكون لديك متسلسلة لا نهائية. أوجد مجموع هذه المتسلسلة: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$
- c. **لغظياً** كيف يرتبط مجموع المتسلسلة بالورقة الأصلية المربعة؟

50c: تبلغ مساحة المربع الأصلي 1 وحدة، ولا يمكن أن تتجاوز مساحة جميع القطع العدد 1.

51. **الجزء** في تجربة فيزياء، تتم زيادة سرعة كرة معدنية على مسار مستقيم، ثم تتدحرج بحرية بعد الدخيلة الأولى. تتحرك الكرة 120 متراً وفي كل دقيقة تقطع الكرة 40% فقط من المسافة التي قطعها خلال الدقيقة السابقة. ما المسافة التي قطعها الكرة؟ **200 m**
52. **البنشون** يقطع بندول 12 سنتيمتراً في الأرجحة الأولى و95% من المسافة التي قطعها في الأرجحة السابقة. أوجد إجمالي المسافة التي قطعها البندول عند استقراره. **240 cm**
53. **الألعاب** إذا كانت هناك كرة مطاطية تستطيع القفز بنسبة 95% من الارتفاع الأصلي، فما إجمالي المسافة العمودية التي سوف تنقطعها إذا سقطت على ارتفاع 30 متراً؟ **1170 m**
54. **السيارات** خلال فحص صيانة لسيارة، تم تزج إطارات وتدويره على آلة فحص. وعند إيقاف تشغيل الآلة، يكمل التدوير للإطارات 20 دورة في الثانية الأولى، و98% من الدورات للثانية أخرى. كم عدد الدورات التي يكتملها الإطارات قبل أن يتوقف عن الدوران؟ **1000 دورة**

* يشير المصطلح نسبة التراجيح إلى مبلغ المال الذي يتم سداده أو تلقيه عند الإقراض أو الإيداع إذا افترض حمل مبلغاً ماياً من المصرف. فانه يحدد المصروف نسبة مزايدة نظير استخدام المال من المصرف، وإذا أدرج حمل مبلغاً ماياً في حساب مصرفي، فإن المصروف يدفع له نسبة مزايدة نظير استخدام مال العميل. ويطلق على المبلغ المالي الأصلي الذي تم إقرانه أو ائجاره رأس المال. ويشكل نسبة التراجيح نسبة مئوية للمبلغ الذي يتلقاه العميل أو يسدده خلال فترة زمنية محددة. ونسبة التراجيح السميطة هي مبلغ نسبة التراجيح الذي يتلقاه العميل أو يسدده عند تطبيق نسبة التراجيح على رأس المال. هي تقع ضرب ثلاث فترات رأس المال (3) ونسبة التراجيح السنوية في صورة كسر عشري (0) والفترة الزمنية (n): $1 - P = r \cdot n$

مركز الفيزياء والعلوم - جامعة الإمارات العربية المتحدة

472 / 66


Navigation icons: back, forward, search, home, share, print, copy.



55. الاقتصاد قررت الحكومة تحفيز اقتصادها من خلال إعطاء كل شخص بالغ AED 500. وانخرعت الحكومة أن كل فرد استلم هذا المبلغ سيقتطع 80% منه على سلع استهلاكية. وسيبقى المتبقي في الحساب 80% على السلع الاستهلاكية. ما مقدار المبلغ الذي كسبه الاقتصاد نظير كل AED 500 فقمتها الحكومة؟ **AED 2500**

56. متحف العلوم يقدم معرض في متحف للعلوم فرصة للزوار باختيار حركة جسم ما على الزئيرك. سحب أحد الزوار الجسم لأسفل وأطلقه للحركة. قطع الجسم مسافة 1.2 متر لأعلى قبل الرجوع مرة أخرى للجهة المتأصلة. وفي كل مرة يغير فيها الجسم اتجاهه، نقل المسافة التي يقطعها بمقدار 20% عند مغادرتها للمسافة التي قطعها في الاتجاه السابق. أوجد إجمالي المسافة التي قطعها الجسم؟ **6 m**

63. الإجابة: حل كل تمثيل بياني بالوصف المقابل له.



57. a. متسلسلة هندسية تناهية
b. متسلسلة حسابية تناهية
58. a. متسلسلة حسابية تناهية
b. متسلسلة هندسية تناهية
59. a. متسلسلة حسابية تناهية
b. متسلسلة هندسية تناهية

متسلسلة من حد ما. وعندما تساوي النسبة المشتركة 1 أو أكبر. فإن الحدود سوف تستمر في الزيادة وتقترب من اللانهاية كلما اقترب n من اللانهاية. وفي الحدود المستقبلية التي تساوي 0 تقريباً، سيقترب مجموع المتسلسلة من حد ما. وعندما تساوي النسبة المشتركة 1 أو أكبر. فإن الحدود سوف تستمر في الزيادة وتقترب من اللانهاية كلما اقترب n من اللانهاية ولن يكون هناك حد لمجموع المتسلسلة.

مسائل مهارات التفكير العليا: استخدام مهارات التفكير العليا

60. تحليل الخطأ حاول محدد وفالج إيجاد مجموع $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ هل أحدهما على صواب؟ اشرح استنتاجك. **انظر الهامش.**

<p>فالج</p> <p>γ يوجد مجموع نظراً لأن $r \geq 1$ والمتسلسلة تتباعد.</p>	<p>محمود</p> <p>المجموع يساوي 0 نظراً لأن مجموع كل زوج من حدود المتتالية يساوي 0.</p>
---	--

61. البرهان اشرح صيغة لمجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية. **انظر الهامش.**
62. تجد ما قيمة b التي تجعل للمتسلسلة $3 + 9b + 27b^2 + 81b^3 + \dots$ مجموعاً؟ **$-\frac{1}{3} < b < \frac{1}{3}$**
63. التبرير متى يكون للمتسلسلة الهندسية اللانهائية مجموعاً؟ ومتى لا يكون لها مجموعاً؟ اشرح استنتاجك.
64. الفرضيات حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خاطئة أم دالماً أم غير صحيحة على الإطلاق. اشرح استنتاجك.
65. الإجابة النموذجية: $3 + 2 + \frac{4}{3} + \dots$
66. مسألة غير محددة الإجابة اكتب متسلسلة لانهاية بحيث يتقارب مجموعها من 9.
67. الكتابة في الرياضيات اشرح لماذا تكون المتسلسلة الحسابية دالماً متباعدة. **انظر الهامش.**

تدريس الممارسات في الرياضيات

الفرضيات يستطيع الطلاب المتفوقون في الرياضيات فهم واستخدام الفرضيات والتعريفات والناتج المشتق سابقاً في بناء الفرضيات. ويضعون فرضيات ويبنون تدفناً منطقياً للمسائل لاستكشاف حقيقة تقديراتهم. كما يمكنهم تحليل المواقف بتقسيمها إلى حالات. ويمكنهم التعرف على الأمثلة المضادة واستخدامها.

افتيه!

تحليل الخطأ في التمرين 60. ذكّر الطلاب بأن قيمة r تحدد ما إذا كانت المتسلسلة الهندسية اللانهائية تقاربية أم متباعدة.

ملاحظات لحل التمرين

الصيغة في التمرين 71. قد يحتاج الطلاب إلى تذكيرهم بأن صيغة حجم الكرة هي $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

إجابات إضافية

60. الإجابة النموذجية: فالج، النسبة المشتركة للمتسلسلة هي $r = -1$. إذا القيمة المطلقة هي $r = 1$ والمتسلسلة متباعدة.
61. الإجابة النموذجية: مجموع المتسلسلة الهندسية هو $S_n = \frac{a_1 - ar^n}{1-r}$ في المتسلسلة اللانهائية حيث $|r| < 1$. $r^n \rightarrow 0$ في صورة $n \rightarrow \infty$. ومن ثم، $S = \frac{a_1 - ar(0)}{1-r}$ أو $S = \frac{a_1}{1-r}$.
67. المتسلسلة الحسابية تحتوي على فرق مشترك. وبالتالي سيجب كل حد في النهاية إيجابياً أكثر أو سلبياً أكثر. ولكنه لن يقترب أبداً من الصفر. ومع عدم اقتراب الحدود من 0. فإن يبلغ المجموع نهاية أبداً ولا تكون المتسلسلة تقاربية.





4 التقييم

بطاقة التحقّق من استيعاب الطلاب
 جَهِّزْ عدة نسخ من كلّ واحدة من المتسلسلات الهندسية اللا نهائية الخمس المختلفة-بعضها لها مجموع وبعضها الآخر لا. امنح كل طالب نسخة من متسلسلة واحدة. وبينما يقادر الطلاب غرفة الصف الدراسي. اطلب منهم إخبارك ما إذا كانت المتسلسلات تقاربية أم تباعدية.

التقييم التكويني

تحقق من فهم الطلاب للمعاهيم في الدروس 3-9 و 4-9.

تدريب على الاختبار المعياري

70. الإجابة الشبكية ندر $\log_6 60$ إلى أقرب جزء من المئتين 1.97

71. الهندسية ذو ضرب نصف قطر كرة كبيرة في العامل $\frac{1}{3}$ لإنتاج كرة أصغر. C



القطر = $\frac{1}{3}$ نصف القطر = r

ما حجم الكرة الصغيرة مقارنة بحجم الكرة الكبيرة؟

- A. يبلغ حجم الكرة الصغيرة $\frac{1}{3}$ من حجم الكرة الكبيرة.
- B. يبلغ حجم الكرة الصغيرة $\frac{1}{27}$ من حجم الكرة الكبيرة.
- C. يبلغ حجم الكرة الصغيرة $\frac{1}{27}$ من حجم الكرة الكبيرة.
- D. يبلغ حجم الكرة الصغيرة $\frac{1}{3}$ من حجم الكرة الكبيرة.

68. SAT/ACT ما مجموع المتسلسلة الهندسية الثلاثة التي يبلغ حدها الأول 27 وتبلغ النسبة المشتركة الحاصية بها $\frac{1}{3}$ E

- A 18
- B 34
- C 41
- D 65
- E 81

69. نام كل من حارب وحيد وحسيد وحميدان بتسبيط نفس التعبير على اللوحة. ولما بقي حل كل طالب منهم وقال المعلم بأن اثنين منهما قد توصلوا إلى الإجابة الصحيحة، بينما لا يوجد سوى طالب واحد توصل إلى الاستنتاج الصحيح باستخدام الخطوات الصحيحة. H

حل حارب	حل حميد
$x^2 - 5 = \frac{x^2}{x^2}$	$x^2 - 5 = \frac{x^2}{x^2}$
$= x^2 - 5 \neq 0$	$= x^2 - 5 \neq 0$
حل حميدان	حل حميد
$x^2 - 5 = \frac{x^2}{x^2}$	$x^2 - 5 = \frac{x^2}{x^2}$
$= x^2 - 5 \neq 0$	$= x^2 - 5 \neq 0$

أي حل يمثل التبسيط الدقيق بالكامل؟
 حل حارب H حل حميد
 حل حميدان G حل حارب

مراجعة شاملة

72. المعاملات تعدد تجارب أداء لمسابقة تلفزيونية. وفي نهاية كل جولة، يتم استبعاد نصف المرشحين المتبقين من المسابقة. وفي يوم محدد، يبدأ 542 متسابقاً تجارب الأداء. **التدريسي 19-3**

- a. اكتب معادلة لإيجاد عدد المتسابقين المتبقين بعد عدد n من الجولات.
- b. باستخدام هذه الطريقة، هل عدد المتسابقين الذين سيتم استبعادهم سيكون دائماً عبارة من عدد كلي؟ اشرح.
- 73. في نهاية الجولة الثالثة، سيكون هناك 131 متسابقاً ونصف هذا العدد يساوي 65.5.**
- النوايا يتكون ناد لحياطة التحف من 9 أعضاء. كل أسبوع، يجب على كل عضو أن يحضر معه مربعاً من لحاف قد انتهى من خياطته. **التدريسي 19-2**
- a. أوجد الحدود الثمانية الأولى للمتتالية التي تصف إجمالي عدد التحف المربعة التي تبت خياطتها بعد كل اجتماع **9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72**
- b. هناك لحاف واحد نال إعجاب 144 ستيثيرا في 168 ستيثيرا. ويتم تصميجه باستخدام مربعات طول ضلعها 8 ستيثيرات. بعد كم اجتماع سيتم الانتهاء من خياطة اللحاف؟ **42 اجتماعاً**

مراجعة المهارات

- أوجد قيمة كل دالة.
- 74. $f(x) = 5x - 9, f(6)$ 21
- 75. $g(x) = x^2 - x, g(4)$ 12
- 76. $h(x) = x^2 - 2x - 1, h(3)$ 2

التدريسي المتميز

التوسع اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية وتبادل الأدوار في كتابة الكسور العشرية المتكررة وتحدي زملاء في التعبير عنها في صورة كسور اعتيادية.



مختبر تقنية التمثيل البياني الحدود

9-4

التوسع 9-4

قد تكون لاحظت أنه في بعض المتتاليات الهندسية، كلما اقترب حد المتتالية من النهاية، اقترب أكثر من الصفر. هناك طريقة أخرى لوصف هذا الأمر وهي أنه كلما زاد n ، اقترب a_n من الصفر. واقترب قيمة حد المتتالية في هذه الحالة من الصفر. ويطلق عليه **المتتالية**. قد يكون هناك حدود لمتتاليات أخرى لانهائية. إذا كانت حدود متتالية لا تقترب من القيمة المحددة، يمكننا القول بأن حد المتتالية غير موجود. يمكنك استخدام حاسبة التمثيل البياني من نوع TI-83/84 Plus لتساعدك على إيجاد حدود المتتاليات اللانهائية.

النشاط

أوجد حد المتتالية الهندسية ... $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$

المطرح

أدخل المتتالية

صيغة المتتالية هي $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

ضع المؤشر على L1 في شاشة STAT EDIT 1: Edit... وأدخل الصيغة seq(N,N,1,10,D) وستظهر أمامك القيم 1, 2, ... 10 للمؤشر N

خطوات العملية على الحاسبة: STAT ENTER 2nd ISTATI 5 X,T,θ,n X,T,θ,n 1 10 1 ENTER

ضع المؤشر على L2 وأدخل الصيغة seq((1/4)^(N-D),N,1,10,D) وستظهر أمامك الحدود العشرة الأولى من المتتالية.

خطوات العملية على الحاسبة: 2nd STATI 5 1 4 X,T,θ,n X,T,θ,n 1 10 1 ENTER



10, 100 scl: 1 by 10, 11 scl: 0.1

لاحظ أنه كلما ازداد n ، تصبح حدود المتتالية المعطاة أقرب وأقرب إلى الصفر. وإذا قمت بالتنمير لأسفل، فستدري أنه عندما يكون $n \geq 6$ ، تصبح الحدود أقرب ما تكون إلى الصفر بحيث تغير معناها الحاسمة بالرموز العلمية. ويرمز هذا حد المتتالية على أنه يساوي 0.

المطرح

مثل المتتالية بيانياً.

استخدم خيار STAT PLOT لتمثيل المتتالية بيانياً، واستخدم L1 على أنه Xlist و L2 على أنه Ylist.

وضح التمثيل البياني كذلك أنه كلما ازداد n ، تقترب الحدود من الصفر. وفي الحقيقة بالنسبة لـ $n \geq 3$ ، يبدو أن العلامات تقع على المحور الأفقي. ويقترح هذا بشدة أن حد المتتالية يساوي 0.

التدريبات

أوجد حد كل متتالية.

1. $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ 0

2. $a_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n$ 0

3. $a_n = 5^n$ غير موجود

4. $a_n = \frac{1}{n^2}$ 0

5. $a_n = \frac{3^n}{3^n - 2}$ 1

6. $a_n = \frac{n!}{n+2}$ غير موجود

578 | التوسع 9-4 | المختبر، مختبر تقنية التمثيل البياني

1 التركيز

الهدف استخدام حاسبة التمثيل البياني لاستكشاف حدود المتسلسلات.

المواد

• حاسبة التمثيل البياني TI-83/84 Plus
• أو حاسبة تمثيل بياني من نوع آخر

نصيحة للتدريس

يتم تمثيل المخطط الإحصائي للمتتاليات بيانياً بنفس طريقة أي مخطط إحصائي. ومن الضروري أن تحتوي الفوائض L_1 و L_2 على نفس عدد العناصر.

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية بحيث يمكنهم مساعدة بعضهم البعض في تصحيح أخطاء خطوات العملية على الحاسبة. ثم اطلب منهم المخطوتين 1-2 في النشاط والتدريبين 1-2.

• إذا واجه الطلاب صعوبة في إعداد قائمة المتتالية، فتأكد من أنهم يضعون السهم على اسم القائمة. وليس على أول عنصر فيها.

• وقد يحتاج الطلاب إلى تذكيرهم بكيفية قراءة الترميز العلمي كما يظهر في الحاسبة (مثلاً، $4.572E-4$ تمثل العدد 4.572×10^{-4}).

• احرص على إدراك الطلاب أنه حتى يكون للمتتالية حد، فيجب أن تستمر قيم الحدود المتعاقبة في الاقتراب أكثر من القيمة المحددة.

التعزيز اطلب من الطلاب إكمال التمارين 3-6.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمرين 6 لتقويم ما إذا استوعب الطلاب كيفية تمييز عدم وجود حد للمتتالية.

من العملي إلى النظري

اطلب من الطلاب فحص المتتالية

$a_n = \frac{3^n}{3^n - 1}$ في التمرين 5. واجعلهم يفسروا

البسط والمقام على 3^n واطلب منهم استخدام النتيجة لتفسير لماذا يجب أن يساوي حد المتتالية 1.

578 | التوسع 9-4 | مختبر تقنية التمثيل البياني



472 / 69





الوحدة 9 اختبار نصف الوحدة

التقييم التكويني

استخدم اختبار نصف الوحدة لتقييم مدى تقدم الطلاب في النصف الأول من الوحدة.

بالنسبة للمسائل المجاب عنها بشكل خاطئ، كَتَّف الطلاب بمراجعة الدروس المشار إليها بين الأقواس.

المشكلات منظم الدراسة

المحتويات دينا زاك

قبل أن ينتهي الطلاب من اختبار نصف الوحدة، شجعهم على مراجعة معلومات الدروس من 9-1 إلى 9-4 المكتوبة في ملفاتهم.

إجابات إضافية

- 3a. لا، سيتبقى لديها 11 منزلاً لبيعهم خلال 4 أشهر. وإذا باعت منزلين في الشهر طوال الأشهر الأربعة المتبقية، فستبيع 8 منازل أخرى فقط.
- 4b. نعم، إذا كان $2n + 2 = 84$ ، $n = 41$ في الشكل 41، سيكون هناك 84 مربعا أبيض.

اختبار نصف الوحدة
الدروس من 9-1 إلى 9-4

10. الاختبار من متعدد ما مجموع أول 50 عدداً فردياً؟
الدرس 19-2 B

- A 2550
- B 2500
- C 2499
- D 2401

أوجد الحد الموضوح لكل متتالية هندسية. (الدرس 19-3)

- 11. $a_1 = 8, r = 2, a_n = 7$ 512
- 12. $a_1 = 0.5, r = 8, a_n = 7$ 1,048,576

13. الاختبار من متعدد ما الأوساط الهندسية للمتتالية الواردة أدناه؟ (الدرس 19-3) J

- 0.5, _____, _____, 2048
- F 512, 375, 1024, 25, 1536, 125
- G 683, 1365.5, 2048
- H 2, 8, 32
- J 4, 32, 256

14. الدخل يعمل فهد في شركة لتشييد المنازل لمدة 4 أشهر كل عام. وقد بدأ بتقاضى AED 9000 في الشهر، وفي نهاية كل شهر، يزداد راتبه بمقدار 5% ما مقدار المال الذي سيتقاضاه خلال الأربعة أشهر؟ (الدرس 19-3) AED 38,791.13

أوجد قيمة مجموع كل متسلسلة هندسية. (الدرس 19-3)

- 15. $\sum_{k=1}^8 3 \cdot 2^{k-1}$ 765
- 16. $\sum_{k=1}^5 4 \cdot (-\frac{1}{2})^{k-1}$ 4
- 17. $\sum_{k=1}^{10} -2 \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$ -5.998

أوجد مجموع كل دالة لانهاية، إن وجد. (الدرس 19-4)

- 18. $\sum_{k=1}^{\infty} 9 \cdot 2^{k-1}$ لا يوجد مجموع
- 19. $\sum_{k=1}^{\infty} (6) \cdot (0.5)^{k-1}$ 8
- 20. $\sum_{k=1}^{\infty} 12 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$ 36

579

حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية، أم هندسية، أم غير ذلك. اشرح استنتاجك. (الدرس 19-1)

- 1. 5, -3, -12, -22, -33... ليست أي منهما، لا توجد نسبة مشتركة أو فرق مشترك
- 2. $\frac{1}{5}, \frac{2}{10}, \frac{6}{10}, \frac{12}{10}, \frac{18}{10}, \dots$ حسابية، الفرق المشترك يبلغ $\frac{1}{5}$

3. الإسكان تملك سبع وكيلة عقارات. يجب عليها بيع 15 منزلاً خلال 6 أشهر. (الدرس 19-1)

- a. نهاية أول شهرين، كانت قد باعت 4 منازل. إذا باعت منزلين كل شهر خلال ما تبقى من السنة أشهر، فهل ستبلغ الهدف المحدد لها؟ اشرح انظر الهامش.
- b. إذا باعت 5 منازل نهاية الشهر الأول، فما متوسط عدد المنازل التي عليها بيعها كل شهر لبلوغ الهدف المحدد لها؟ منزلان

4. الهندسة توضح الأشكال التالية ضغط من المربعات المظلمة والمربعات البيضاء. (الدرس 19-1)



- a. اكتب معادلة تمثل العدد التوتوني في هذا النمط، حيث n هو عدد المربعات البيضاء. $a_n = 2n + 2$
- b. هل من الممكن الحصول على 84 مربعا أبيض تماماً في ترتيب ما؟ اشرح انظر الهامش.

أوجد الحد الموضوح لكل متتالية حسابية. (الدرس 19-2)

- 5. $a_1 = 10, d = -5, a_n = 5$ -30
- 6. $a_1 = -8, d = 4, n = 99$ 384

أوجد مجموع كل متسلسلة حسابية. (الدرس 19-2)

- 7. $-15 + (-11) + (-7) + \dots + 53$ 342
- 8. $a_1 = -12, d = 8, n = 22$ 1584
- 9. $\sum_{k=1}^{10} (-3k + 5)$ -3620

مركز التعليم والتدريب - مؤسسة تعليمية حكومية



التكرار والإعادة 9-5

لماذا؟

تولد أي شيء مثل العمل عندما تتراوح المثلثة مع ذكر مثل. ويكون للأشياء والذين وهذا الأب والأم إلا أن ذكر مثل العمل يولد من مثل المثلثة غير المحسب، وبذلك يكون لديه والد واحد فقط وهو الآخر وتصبح شجرة عائلة مثل العمل متناهية خاصة

الجيل	1	2	3	4	5	6
الأفراد	1	1	2	3	5	8

التالي

- 1 التعرف على المتتاليات الخاصة واستخدامها.
- 2 دوال التكرار.

السابق

- لقد قمت باكتشاف مكونات الدوال.
- التعرف على المتتاليات الخاصة واستخدامها، وإعادة الدوال.

1 التركيز

التخطيط الواسي

قبل الدرس 9-5 استكشف تركيب الدوال.

الدرس 9-5 التعرف على المتتاليات الخاصة واستخدامها، وإعادة الدوال.

بعد الدرس 9-5 استخدام الاستقراء الرياضي لإثبات العبارات.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة قسم لماذا؟ الوارد في هذا الدرس.

اطرح السؤال التالي:

ما العدد الذي يأتي بعد 8 في هذه المتتالية؟ 13

هل هذه المتتالية متناهية حسابية؟ لا

هل هي متناهية هندسية؟ لا اشرح. لأنه لا يوجد فرق مشترك ولا نسبة مشتركة.

1 المتتاليات الخاصة

المثال 1 يبين كيفية استخدام الصيغة التكرارية لإيجاد حدود المتتالية. وبيّن

المثال 2 كيفية كتابة صيغة تكرارية (ضمنية). وبيّن المثال 3 كيفية

استخدام صيغة تكرارية (ضمنية) لتمثل موقفًا من الحياة اليومية.

المفردات الجديدة

- متتالية فيبوناتشي Fibonacci sequence
- متتالية تكرارية recursive sequence
- صيغة صريحة explicit formula
- صيغة تكرارية recursive formula
- التكرار iteration

ممارسات في الرياضيات
براعة الدقة
البحث عن التوافق في الاستنتاجات المتكررة والتعبير عن ذلك.

1 المتتاليات الخاصة

لاحظ أن كل حد موجود في قائمة الأعداد يساوي مجموع الحدين السابقين. ويطلق على هذه المتتالية الخاصة **متتالية فيبوناتشي** وتوجد في العديد من الأمثلة في الطبيعة. ولقد متتالية فيبوناتشي مثالًا على **المتتالية التكرارية** في المتتالية التكرارية. يتم تحديد كل حد باستخدام حد واحد أو أكثر من الحدود السابقة.

تدرج الصيغ التي استخدمتها حتى الآن في المتتاليات تحت الصيغ الصريحة. تنتج **الصيغة الصريحة** a_n في صورة دالة n . مثل $a_n = 3n + 1$. بعد الصيغة التي تصف متتالية فيبوناتشي، $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$.

صيغة تكرارية

وهذا يعني أن كل حد سيتم تحديده باستخدام حد واحد أو أكثر من الحدود السابقة. ويجب أن تحصل على الحد الأولي في الصيغة التكرارية.

المفهوم الأساسي: الصيغ التكرارية للمتتاليات

المتتالية الحسابية	$a_n = a_{n-1} + d$ ، حيث d هو الفرق المشترك
المتتالية الهندسية	$a_n = r \cdot a_{n-1}$ ، حيث r هو النسبة المشتركة

مثال 1 استخدام صيغة تكرارية

أوجد الحدود الخمسة الأولى للمتتالية التي فيها $a_1 = -3$ و $a_n = 4a_{n-1} - 2$ ، إذا كان $n \geq 1$.

صيغة تكرارية	$a_n = 4a_{n-1} - 2$
$n = 1$	$a_1 = -3$
$a_2 = -14$	$a_2 = 4(-3) - 2 = -14$
$a_3 = -58$	$a_3 = 4(-14) - 2 = -58$
$a_4 = -234$	$a_4 = 4(-58) - 2 = -234$
$a_5 = -938$	$a_5 = 4(-234) - 2 = -938$

الحدود الخمسة الأولى للمتتالية هي -3 ، -14 ، -58 ، -234 ، و -938 .

تمرين موجّه

1. أوجد قيمة الحدود الخمسة الأولى للمتتالية التي يكون فيها $a_1 = 8$ و $a_n = 3a_{n-1} + 6$ ، إذا كان $n \geq 1$.
8, -18, 60, -174, 528





التقييم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

أمثلة إضافية

1 أوجد الحدود الخمسة الأولى في

المتتالية، حيث يكون $a_1 = 5$

و $a_{n+1} = 2a_n + 7$ و $n \geq 1$.

5, 17, 41, 89, 185

2 اكتب صيغة تكرارية (ضمنية) لكل متتالية.

a. 3, 10, 17, 24, 31, ...

$a_1 = 3; a_n = a_{n-1} + 7$

b. 5, 20, 80, 320, 1280, ...

$a_1 = 5; a_n = 4 \cdot a_{n-1}$

c. $a_3 = 6$ و $d = 5$

$a_1 = -4; a_n = a_{n-1} + 5$

إيجاد صيغة تكرارية. حدد أول الحد الأولي. ثم قيم النمط لإيجاد الحدود التالية. ولا تشمل الصيغة التكرارية التي تنتج متتالية على قيمة الحد الأولي.

مثال 2 كتابة الصيغ التكرارية

اكتب صيغة تكرارية لكل متتالية مما يلي.

a. 2, 10, 18, 26, 34, ...

خطوة 1 حدد ما إذا كانت المتتالية حسابية أم هندسية. المتتالية حسابية لأنه يمكن إيجاد كل حد يلي الحد الأول من خلال إضافة فرق مشترك.

خطوة 2 أوجد الفرق المشترك.

$d = 10 - 2 = 8$

خطوة 3 اكتب الصيغة التكرارية.

$a_n = a_{n-1} + d$
 $a_n = a_{n-1} + 8$

صيغة تكرارية للمتتالية الحسابية
 $d = 8$

الصيغة التكرارية للمتتالية هي $a_1 = 2$, $a_n = a_{n-1} + 8$.

b. 16, 56, 196, 686, 2401, ...

خطوة 1 حدد ما إذا كانت المتتالية حسابية أم هندسية. المتتالية هندسية لأنه يمكن إيجاد كل حد يلي الحد الأول بعد الضرب في النسبة المشتركة.

خطوة 2 أوجد النسبة المشتركة.

$r = \frac{56}{16} = 3.5$

خطوة 3 اكتب الصيغة التكرارية.

$a_n = r \cdot a_{n-1}$
 $a_n = 3.5 a_{n-1}$

صيغة تكرارية للمتتالية الهندسية
 $r = 3.5$

الصيغة التكرارية للمتتالية هي $a_1 = 16$, $a_n = 3.5 a_{n-1}$.

c. $r = 3$ و $a_4 = 108$

خطوة 1 حدد ما إذا كانت المتتالية حسابية أم هندسية. نظراً لأن r معطى، فإن المتتالية هندسية.

خطوة 2 اكتب الصيغة التكرارية.

$a_n = r \cdot a_{n-1}$
 $a_n = 3 a_{n-1}$

صيغة تكرارية للمتتالية الهندسية
 $r = 3$

الصيغة التكرارية للمتتالية هي $a_1 = 4$, $a_n = 3 a_{n-1}$.

تمرين موجه

اكتب صيغة تكرارية لكل متتالية مما يلي.

2A. 8, 20, 50, 125, 312.5, ... 2B. 8, 17, 26, 35, 44, ... 2C. $a_3 = 16$, $r = 4$

نصيحة دراسية
المتتاليات والصيغ التكرارية كما هو الحال في المتتاليات الهندسية. فإن الصيغ التكرارية تحدد الدول التي يكون فيها المجال متراً من مجموعة من الأعداد الصحيحة الموجبة. ويشار إليها بعدد الحدود n .

2A. $a_n = 2.5a_{n-1}$,
 $a_1 = 8$
2B. $a_n = a_{n-1} + 9$,
 $a_1 = 8$
2C. $a_n = 4a_{n-1}$,
 $a_1 = 1$

مركز التعليم والتدريب - جامعة الإمارات العربية المتحدة - وزارة التعليم

انتبه!

تجنب المفاهيم الخاطئة! تأكد من فهم الطلاب أنك تستخدم قيمة حد واحد لإيجاد قيمة الحد التالي عندما تكون المتتالية بالصيغة التكرارية. ووضح أن $a_n = a_1 + (n-1)d$ و $a_n = a_1 q^{n-1}$ ليست صيغاً تكرارية. تحدد هذه الصيغ الصريحة كل حد بالعدد n للحد وليس بقيمة الحد السابق له.



مثال 3 من الحياة اليومية استخدام صيغة تكرارية

المعرفة المالية كان لدى ناصر AED 15,000 في مديونية البطاقة الائتمانية عندما تخرج من الكلية. وقد ازداد الرصيد بمقدار 2% كل شهر بفعل نسبة المراجعة. ولا يمكن لناصر أن يسدد سوى AED 400 كل شهر. اكتب صيغة تكرارية لرصيد حسابه لكل شهر. ثم حدد الرصيد بعد مرور خمسة أشهر.

المطرا اكتب الصيغة التكرارية.
 يعرض أن a_n تمثل الرصيد الحساب في عدد n من الشهور. ويبلغ الرصيد الأولي a_1 AED 15,000. بعد شهر واحد تمت إضافة نسبة المراجعة وتم المساءل.

$$a_2 = a_1 + (a_1 \times 0.02) - 400$$

$$a_2 = 1.02 a_1 - 400$$

المطرا 2 أوجد الحدود الخمسة التالية.

صيغة تكرارية

$$a_1 = 15,000$$

$$a_2 = 14,900$$

$$a_3 = 14,798$$

$$a_4 = 14,693.96$$

$$a_5 = 14,587.84$$

بعد الشهر الخامس، سيسمح الرصيد AED 14,479.60

3. $a_n = 1.025 a_{n-1} - 600$; $a_1 = 10,000$;
 AED 10,000, AED 9650, AED 9291.25, AED 8923.53, AED 8546.62

3. اكتب صيغة تكرارية لدين يبلغ AED 10,000 وصية المراجعة بخصم 2.5% كل شهر. مع سداد مبلغ AED 600 كل شهر. ثم أوجد المبالغ الخمس الأولى التي كانت متوفرة في الرصيد.

2 الإعادة الإعادة في عملية تكوين دالة بشكل متكرر من عسبة تأمل الدالة x_0 . الإعادة الأولى من $f(x_0)$ ، والإعادة الثانية هي $f(f(x_0))$ ، والإعادة الثالثة هي $f(f(f(x_0)))$ وهكذا.

يمكن استخدام الإعادة في إنتاج متتالية بشكل تكراري. أيضاً بالقيمة الأولية x_0 . افترض أن $x_1 = f(x_0)$, $x_2 = f(x_1)$ وهكذا.

4 مثال إعادة الدالة

أوجد الإعادتين الأولى x_1 و x_2 و x_3 للدالة $f(x) = 5x + 4$ للقيمة الأولية التي تبلغ $x_0 = 2$.

$$x_1 = f(x_0) = 5(2) + 4 = 14$$

$$x_2 = f(x_1) = 5(14) + 4 = 74$$

$$x_3 = f(x_2) = 5(74) + 4 = 374$$

الإعادتين الأولى هي 14 و 74 و 374

4. أوجد الإعادتين الأولى x_1 و x_2 و x_3 للدالة $f(x) = -3x + 8$ للقيمة الأولية التي تبلغ $x_0 = 6$

$$x_1 = -10, x_2 = 38, x_3 = -106$$



الربط بالحياة اليومية
 في عام 2008، بلغ متوسط مديونية البطاقات الائتمانية لطلاب الكليات حوالي AED 3173.
 المصدر: مسند USA Today

مثال إضافي

3 الأحياء زرعت الدكتور حصة خلايا في أطباق مختبرية. وقد بدأت بزراعة 108 خلايا صباح يوم الاثنين. ثم أزلت 20 منها من أجل تجربتها. وفي يوم الثلاثاء، تضاعف عدد الخلايا المتبقية بمعدل 1.5 مرة. ومرة أخرى، أزلت 20. يتكرر هذا النمط كل يوم من أيام الأسبوع. اكتب صيغة تكرارية (ضمنية) لعدد الخلايا التي تجدها الدكتور حصة كل يوم قبل أن تأخذ منها لتجربتها. وبعد ذلك، حدد عدد الخلايا التي ستجدها في صباح يوم الجمعة.

$$c_{n+1} = 1.5(c_n - 20)$$

$$c_1 = 108; 303$$

التدريس باستخدام التكنولوجيا

اللوحة البيضاء التفاعلية

اشرح للطلاب كيفية حساب الحدود المتعاقبة باستخدام الصيغة التكرارية. واستخدم ألواناً مختلفة وأداة التظليل في حساباتك لتساعد في إظهار كيفية ارتباط كل حد بالحد السابق له.

2 الإعادة

المثال 4 يبين كيفية إيجاد الإعادتين الأولى، أو القيم المعادة، للدالة.

مثال إضافي

4 أوجد التكرارات الثلاثة الأولى x_1 و x_2 و x_3 للدالة $f(x) = 3x - 1$

$$f(x) = 3x - 1$$

$$x_0 = 5$$

$$14, 41, 122$$

التدريس المتميز

المتعلمون بالطريقة الحسية الحركية اطلب من الطلاب البحث. ثم لعب أحجية برج هانوي. يمثل الهدف من أحجية برج هانوي في نقل كومة من 8 أقراص بأحجام متدرجة من أحد الغضبان الثلاثة إلى قضيب فارغ في أقل عدد من الحركات من خلال القواعد التالية،

- يمكنك تحريك قرص واحد فقط في المرة الواحدة.
- يجب وضع القرص فوق القرص الآخر، وليس أسفله.
- يمكن وضع قرص أصغر فوق قرص أكبر، وليس العكس.



3 التمرين

التقييم التكويني

استخدم التمارين من 1 إلى 11 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

تدريس المهارسات في الرياضيات

المثابرة بدأ الطلاب المتفوقون في الرياضيات بشرح معنى المسألة لأنفسهم والبحث عن نقاط بدء الحل. فيحلون المعطيات والشبكات والعلاقات والأهداف. ويتكثرون فرضيات حول شكل الحل ومعناه ويخططون مسازاً للحل بدلاً من الانتفال بساطة إلى محاولة الحل.

إجابات إضافية

- 24. $a_{n+1} = 0.5a_n + 2; a_1 = 16$
- 25. $a_{n+1} = 0.25a_n + 4; a_1 = 32$
- 26. $a_{n+1} = (a_n)^2 - 1; a_1 = 4$
- 27. $a_{n+1} = (a_n)^3 + 1; a_1 = 1$
- 28. $a_{n+1} = 4a_n - 3; a_1 = 9$
- 29. $a_{n+1} = 0.25a_n + 8; a_1 = 480$
- 30. $a_{n+1} = \frac{a_n}{3} + 1; a_1 = 393$
- 31. $a_{n+1} = 2a_n - 32; a_1 = 84$
- 32b. $a_1 = \text{AED } 20,000$
 $a_2 = \text{AED } 41,600$
 $a_3 = \text{AED } 64,928$
 $a_4 = \text{AED } 90,122.24$
 $a_5 = \text{AED } 117,332.02$
 $a_6 = \text{AED } 146,718.58$
 $a_7 = \text{AED } 178,456.07$
 $a = \text{AED } 212,732.56$

التحقق من فهمك

- 1 مثال أوجد الحدود الخمسة الأولى لكل متتالية موضحة. 4, -4, -14, -34, -74, -154
- 2 مثال اكتب صيغة تكرارية لكل متتالية. 6. $a_{n+1} = 3a_n - 1; a_1 = 5$
- 3 مثال 7. التمويل الشخصي فارس أكد تصديف بقيمة 1500 AED لمساعدته على التصديف في فريق التصديف بالجامعة. ويستطيع سدأر 100 AED لخط في الشهر. وفراد العائودة بمقدار 1% بدعل نسبة المراجعة في نهاية كل شهر. $a. a_n = 1.01a_{n-1} - 100; a_1 = 1500$
- 4 مثال أوجد التكرارات الثلاثة الأولى لكل دالة بالنسبة للقيمة الأولية المعطاة.

التدريب وحل المسائل

- 1 مثال المثابرة أوجد الحدود الخمسة الأولى من كل متتالية موضحة.
- 2 مثال اكتب صيغة تكرارية لكل متتالية. 24-31. انظر الهامش.
- 3 مثال 32. المعرفة العالية يودع السيد عدنان وشركته 20,000 AED في حساب تقاعده بنهاية كل عام. ويكسب الحساب 8% كنسبة مراجعة قبل كل إيداع.
- 4 مثال أوجد التكرارات الثلاثة الأولى لكل دالة بالنسبة للقيمة الأولية المعطاة.

خيارات الواجب المنزلي المتميزة

المستوى	الواجب	خيار اليوميين
AL مبتدئ	12-42, 49, 51-69	49, 51-53, 58-69 زوجي 12-42
OK أساسي	43-49, 51-69	43-49, 51-53, 58-69
BL متقدم	43-63, (64-69 اختياري)	





43. الأنماط الهندسية المتكررة تأمل الأشكال الموجودة على اليسار. يزداد عدد المثلثات الزرقاء وفق ضغط معين.

a. اكتب صيغة تكرارية لعدد المثلثات الزرقاء في متتالية الأشكال. $a_0 = 1, a_1 = 3, a_2 = 9$

b. كم عدد المثلثات الزرقاء التي ستكون في الشكل السادس؟ 243

44. المعرفة المالية يبلغ ضغط قرض عامر الشهري AED 234.85، ونصف الصيغة التكرارية $1.005a_n - 1 = 234.85$ ، و نصف الصيغة التكرارية $1.005a_n = 1.005a_{n-1} + 234.85$ ، أوجد رصيده قرض يبلغ AED 10,000 بعد سداد كل ضغط من الأقساط الثمانية الأولى.

45. المحافظة على البيئة أحرص أن بحيرة يوجد بها 10,000 سمكة وبعد عام كانت نسبة السمك الذي نطق أوم اصطفاؤه 80% ولكن لم تحدد الحياة بالبحيرة بالدفع بمجموعة من 10,000 سمكة. إذا استمر هذا النمط. هل سيذهب السمك من البحيرة؟ إذا كانت الإجابة لا. فهل سيغرب عدد الأسماك في البحيرة إلى أي قيمة محددة؟ اشرح.



46. الهندسة تأمل الرسم البياني الموجود على اليسار.

a. اكتب متتالية إحصائي عدد المثلثات الموجودة في الأشكال الستة الأولى. 1, 4, 10, 19, 31, 46

b. اكتب صيغة تكرارية لعدد المثلثات. $a_n = a_{n-1} + 3(n-1)$

c. كم عدد المثلثات التي ستكون في الشكل العاشر؟ 136

47. أوراق البيانات تأمل المتتالية التي فيها $a_0 = 20,000$ و $a_n = 0.3a_{n-1} + 5000$.

a. أدخل x_0 في الخلية A1 بورقة البيانات العاصفة. وأدخل $=(0.3)*(A1) + 5000$ في الخلية A2، ما النتيجة التي توصلت إليها؟ 11,000

b. امسح الخلية A2، وظلل الخلايا من A3 إلى A70، والصق الخلية التي سحقتها. ماذا تلاحظ بشأن المتتالية؟ إنها تقترب من 7142.857.

c. كيف يساعد ورق البيانات على تحليل المتتاليات التكرارية؟ انظر الهامش.

48. ألعاب الفيديو لدى الوحي الأخير في لعبة هداية 100 نقطة طاقة. وخلال الحركة الأخيرة، يكتسب الوحي 10% من نقاط الطاقة لنفسه بعد مرور كل 10 ثوان. إذا استنقذت هداية إحقاق الضرر بالوحي بمحض 10 نقاط من نقاط الطاقة لديه كل 10 ثوان دون إحقاق الضرر بنفسها. فهل يمكنها قتل الوحي بهذه الطريقة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فمتى سيكتسبها ذلك؟ نعم: بين 250 و 260 ثانية

44. AED 9815.15, AED 9429.38, AED 9442.67, AED 9255.04, AED 9066.46, AED 8876.94, AED 8686.48, AED 8495.06

45. ٧٤ سجل عدد السمك إلى 12,500 كل عام، تكون هناك 20% من 12,500 أو 2500 سمكة زائده 10,000 سمكة إضافية، فيصبح المجموع 12,500 سمكة.

McGraw-Hill Education جميع الحقوق محفوظة ©

إجابات إضافية

47c. الإجابة النموذجية: إنهم يستولون تحليل المتتاليات التكرارية لأنه يمكنهم تقديم أول 100 حد على الغور، وسيستغرق حساب الحدود دونها وقتاً أطول.

51. الإجابة النموذجية، أحياناً، يمكن أن تتضمن الصيغة التكرارية الحدود الثلاثة الأولى. على سبيل المثال. $2, 2, 2, 8, 20, \dots$ متكررة مع $a_n + 3 = a_n + a_{n+1} + 20, n + 2$

مسابقات مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

49. التقيد يوجد كل من سلطان وصعيد التكرارات الثلاثة الأولى للدالة $f(x) = 5x - 3$ للقيمة الأولى لـ $x_0 = 4$ ، هل أحدهما على صواب؟ اشرح.

<p>صعيد</p> <p>$f(4) = 5(4) - 3$ أو 17</p> <p>$f(17) = 5(17) - 3$ أو 82</p> <p>$f(82) = 5(82) - 3$ أو 407</p> <p>التكرارات الثلاثة الأولى هي 17 و 82 و 407</p>	<p>سلطان</p> <p>$f(4) = 5(4) - 3$ أو 17</p> <p>$f(17) = 5(17) - 3$ أو 82</p> <p>التكرارات الثلاثة الأولى هي 4 و 17 و 82</p>
--	---

49. سعيد: أدرج سلطان x_0 مع التكرارات، وتوصل إلى أول تكرارين فقط. الإجابة النموذجية: $f(x) = 2x + 1, x_0 = 4$

- 50. تجد أوجد الصيغة التكرارية لـ 5, 23, 98, 401, ... $a_n = 4a_{n-1} + 3n, a_1 = 5$
- 51. الاستنتاج هل العبارة "إذا كانت الحدود الثلاثة الأولى لمتتالية هي نفسها، فإن المتتالية ليست تكرارية" صحيحة أحياناً أم دائماً أم غير صحيحة دائماً؟ اشرح استنتاجك.
- 52. مسألة غير محددة الإجابة اكتب دالة تكون التكرارات الثلاثة الأولى فيها هي 9 و 19 و 39 انظر الهامش.
- 53. الكتابة في الرياضيات لماذا من المفيد تمثيل متتالية بصيغة صريحة أو تكرارية؟ انظر الهامش.



انتبه!
تحليل الخطأ في التمرين 49. ذكر الطلاب أن $x_1 = f(x_0)$ حيث x_0 هي القيمة الأولية و x_1 هو إعادة الأولى. وتأكد من فهم الطلاب أن القيمة الأولية لا تحسب على أنها إعادة. ويتم إيجاد إعادة الأولى عن طريق تطبيق الدالة على القيمة الأولية.

نصيحة للمعلمين الجدد

استيعاب اللفة تأكد من فهم الطلاب للمصطلحات المستخدمة في هذا الدرس. ولا سيما إعادة (iteration) و معادة (iterate).

4 التقويم

عَيِّن مصطلح الرياضيات اطلب من الطلاب تفسير المقصود عند القول إن صيغة أو دالة تكرارية.

E المتابعة

لقد استكشف الطلاب التكرار والإعادة.

اطرح السؤال التالي:

- لماذا من المفيد تمثيل نمط عددي بصيغة؟ الإجابة النموذجية، من خلال استخدام صيغة لتمثيل نمط عددي. يمكنك إيجاد أي حد. وإذا كان لديك حد معلوم، فيمكنك استخدام الصيغة لتحديد موقع الحد في النمط. ويمكنك أيضًا تحديد الخصائص الأخرى للنمط، مثل ما إذا كانت المتتالية التي تمثل النمط خطية أو ما إذا كانت المتسلسلة التي تمثل المتتالية تقاربية أم تباعدية.

إجابة إضافية


53. الإجابة النموذجية، في المتتالية التكرارية، يُحدد كل حد بواحد أو أكثر من الحدود السابقة. وتستخدم الصيغة التكرارية في إيجاد حدود المتتالية التكرارية.

تدريب على الاختبار المعياري

54. الهندسة في الشكل الموضح.

$a + b + c = ?$ C

- A 180°
- B 270°
- C 360°
- D 450°



55. الإجابة الموضحة أطلق عمير صودجا صاروخ على مستوى الأرض. ويمكن إيجاد ارتفاع الصاروخ h بالمتر باستخدام المعادلة $h = 5t - 4.9t^2$ ، حيث t يمثل الوقت بالثانية بعد الإطلاق.

- a. ما أقصى ارتفاع سيصل إليه الصاروخ؟ **160 m**
- b. ما الفترة التي سيخضعها الصاروخ بعد إطلاقه حتى يصل إلى أعلى ارتفاع له؟ قرب إلى أقرب جزء من العشرة لثانية. **5.7 s**
- c. ما الفترة التي سيخضعها الصاروخ بعد إطلاقه حتى يهبط؟ قرب إلى أقرب جزء من العشرة لثانية.

55c. 11.4 s

مراجعة شاملة

اكتب كل كسر عشري متكرر في صورة كسر اعتيادي. (التمرين 4-19)

58. $0.\overline{7} = \frac{7}{9}$

59. $5.\overline{126} = \frac{516}{111}$

60. $6.\overline{259} = \frac{627}{27}$

61. الرياضة يتدرب عميدة لماراثون بطول حوالي 26 كيلومترًا. وبدأ بركض كيلومترين. ثم عندما بركض كل يوم آخر، فإنه بركض مسافة متعادها واحد ونصف من المسافة التي ركضها اليوم السابق. (التمرين 3-19)

- a. اكتب الحدود الخمسة الأولى لمتتالية توضح جدول التدريب الخاص به. **2, 3, 4.5, 6.75, 10.125**
- b. متى سيكمل 26 كيلومترًا في مسافة ركض واحد؟ **اليوم الثامن**
- c. متى سيكون قد ركض مسافة 100 كيلومتر في الجمل؟ **خلال اليوم التاسع**

حدد ما إذا كانت الأحداث مستقلة أم غير مستقلة.

62. إلغاء عملة نقدية ودرجة مكعب أعداد **مستقل**

63. اختيار المركزين الأول والثاني في مسابقة أكاديمية **غير مستقل**

مراجعة المهارات

أوجد كل ناتج ضرب مما يلي.

64. $(y + 4)(y + 3) = y^2 + 7y + 12$

65. $(x - 2)(x + 6) = x^2 + 4x - 12$

66. $(a - 8)(a + 3) = a^2 - 3a - 40$

67. $(4h + 5)(h + 7) = 4h^2 + 33h + 35$

68. $(9p - 1)(3p - 2) = 27p^2 - 21p + 2$

69. $(2g + 7)(5g - 8) = 10g^2 + 19g - 56$

التدريس المتمايز

التوسُّع اكتب متتالية، مثل 2, 5, 7, 12, 19, 31, ... على اللوحة وراقب ما إذا كان بإمكان الطلاب تمييز النمط. وتشبه هذه المتتالية، تسمى متتالية لوكاس، متتالية فيبوناتشي في أن كل حد، بدءًا من الحد الثالث، يساوي مجموع الحدين السابقين مباشرةً. اجعل الطلاب يكتبوا متتاليات لوكاس الخاصة بهم مستخدمين أي حدين مبدئيين.



472 / 76





مختبر ورقة البيانات تسديد القروض على أقساط

9-5

ممارست في الرياضيات
استخدام الأدوات المتقدمة بطريقة
إبداعية

عند تسديد أقساط قرض، يستخدم جزء لتسديد نسبة المراجعة التي تراكمت منذ آخر سداد. ويستخدم الباقي لتقليل رأس المال، أو مبالغ القرض الأصلي. ويطلق على هذه العملية التسديد على أقساط. يمكنك استخدام ورقة بيانات لتحليل أقساط السداد، ونسبة المراجعة، والرصيد بالنسبة لقرض ما. ويطلق على الجدول الذي يوضح مثل هذا النوع من المعلومات جدول الأقساط.

مثال
القرض اشترت نجلاء هاتفا ذكيا جديدا مقابل AED 695. ويتيح لها المصرف السداد على هيئة أقساط شهرية بقيمة AED 60.78 مع إضافة نسبة مراجعة بقيمة 9% لكل عام. ما المبلغ الذي ستكون مدينة به للمقر بعد مرور ستة أشهر؟

كل شهر، ستكون نسبة المراجعة على الرصيد المتبقي $\frac{9}{100}$ أو 0.09. ويمكنك إيجاد الرصيد بعد السداد من خلال ضرب الرصيد بعد القسط السابق في $1 + 0.0075$ أو 1.0075 ثم طرح AED 60.78.

رقم القسط	المبلغ المدفوع	الرصيد المتبقي
1	60.78	$695(1+0.09) - 60.78$
2	60.78	$(695(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78$
3	60.78	$((695(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78$
4	60.78	$((695(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78$
5	60.78	$((695(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78$
6	60.78	$((695(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78)(1+0.09) - 60.78$

في ورقة البيانات، يمثل عمود الأعداد عدد الأقساط، ويوضح العمود B الرصيد. أدخل نسبة المراجعة في القسط الشهري في الخلايا بالعمود A بحيث يمكن تحديثها بسهولة إذا تم تغيير المعلومات.

توضح ورقة البيانات على اليسار الصيغ الخاصة بالرصيد بعد سداد كل قسط لمدة ستة شهور الأولى. وبعد مرور ستة أشهر، ما زالت تدين نجلاء بمبلغ AED 355.28.

النموذج والتحليل

- افترض أن R_n هو الرصيد المتبقي من قرض نجلاء بعد مرور عدد n من الشهور. اكتب معادلة تربط بين R_n و R_{n-1} .
- بم تخصيص أجزاء كثيرة من أقساط السداد لنسبة المراجعة في بداية السداد، وذلك في مقابل تخصيص أجزاء أقل لآخر فترة في السداد، ما النسبة المئوية التي سينتج على نجلاء سدادها بعد مرور نصف عام؟ **حوالي 51%**
- قم بالتوسع في ورقة البيانات لتغطية العام بأكمله. كم يبلغ الرصيد بعد مرور 12 قسطاً من السداد؟ ولماذا لم يصل إلى 0؟ **حوالي 0.01 AED -؛ لم يصل الرصيد إلى 0 بالضبط بسبب التقريب.**
- افترض أن نجلاء قررت سداد 70 AED كل شهر. ما المدد التي ستستغرقها لسداد القرض؟ **11 شهراً**
- افترض أنه وفق المبلغ الذي يمكن لنجلاء تحمل سدادها، سوف تسدد مبلغاً مختلفاً كل شهر بالإضافة إلى 60.78 AED. اشرح مدى المرونة التي تتمتع بها ورقة البيانات ويمكن استخدامها لتتوافق مع هذا الموقف. **يمكن طرح القيمة المتغيرة بعد اخلية AS.**
- أخذ أمير قرضاً لشراء دراجة بمبلغ 12,000 AED لمدة ثلاثة أعوام. وتبلغ نسبة المراجعة السنوية 6%، ويبلغ القسط السنوي 365.06 AED. وبعد الشهر الخامس، حصل على مميزات. ويريد استخدامه في سداد هذا الدين. ما إجمالي المبلغ الذي يدين به إلى المصرف في هذا الوقت؟ **AED 7260.42**

586 | التوسع 9-5 | مختبر ورقة البيانات: تسديد القروض على أقساط

التوسع 9-5

1 التركيز

الهدف استخدام ورقة بيانات لتحليل أقساط السداد ونسبة المراجعة والرصيد بالنسبة لقرض.

المواد الخاصة لكل طالب

- ورقة بيانات حاسوبية (اختياري)

نصيحة للتدريس

افترض على الطلاب أن يكتبوا داتبا تسميات وصفية لأنواع في الخلايا المجاورة للقيم المدخلة أو المحسوبة. بالإضافة الأجزاء العلوية في الأعمدة. وهذا سيسهل عليهم فهم النتائج وتفسيرها.

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

قد ترغب في جعل الطلاب ذوي القدرات المختلفة يعملوا في مجموعات ثنائية حتى يمكنهم مساعدة بعضهم البعض في خطوات العملية على الحاسبة والأوامر. بعد ذلك، اجعل المجموعات تتبع المثال وتكمل التمرين 1-2.

قبل أن يبدأ الطلاب في هذا الاستكشاف، وضح أن ورقة البيانات يمكنها التعبير عن علاقة يتضمن فيها حساب قيمة الحد التالي استخدام قيمة الحد السابق.

اسأل الطلاب لماذا يتم ضرب الرصيد في 1.0075 وليس 0.0075. أنت تحتاج إلى إيجاد الرصيد، بالإضافة إلى نسبة المراجعة.

التمرين اطلب من الطلاب إكمال التمرين 3-6.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمرين 1 لتقويم ما إذا استوعب الطلاب كيفية الربط بين صيغة ورقة البيانات والصيغ الجبرية التي درسوها.

586 | التوسع 9-5 | مختبر ورقة البيانات: تسديد القروض على أقساط



472 / 77





دليل الدراسة والمراجعة

دليل الدراسة

المفردات الأساسية

فرضية الاستقراء induction hypothesis	أوساط حسابية arithmetic means
التسلسلة الهندسية اللانهائية infinite geometric series	متتالية حسابية arithmetic sequence
متتالية لا نهائية infinite sequence	متسلسلة حسابية arithmetic series
لا نهاية infinity	فرق مشترك common difference
إعادة الإقراء الرياضي iteration mathematical induction	نسبة مشتركة common ratio
مجموع جزئي partial sum	متسلسلة متقاربة convergent series
مثلث باسكال Pascal's triangle	متسلسلة متباعدة divergent series
صيغة تكرارية recursive formula	صيغة صريحة explicit formula
متتالية تكرارية recursive sequence	متتالية فيبوناتشي Fibonacci sequence
متتالية نهائية finite sequence	متتالية نهائية finite sequence
متسلسلة حسابية series	أوساط هندسية geometric means
الرمز سيجما sigma notation	متتالية هندسية geometric sequence
حد term	متسلسلة هندسية geometric series

مراجعة المفردات

- حدد ما إذا كانت كل جملة مما يلي صحيحة أم خاطئة، وإذا كانت خاطئة، فاستبدل المصطلح الموجود تحت خط لجعل الجملة صحيحة.
- يطلق على التسلسلة الهندسية اللانهائية التي لها مجموع متسلسلة تقارب **صحيحة**
 - الاستقراء الرياضي هو عملية تكوين دالة بشكل متكرر من صيها **خاطئة. التكرار**
 - الأوساط الحسابية لمتتالية هي الحدود التي تقع بين أي حدين غير متتاليين في متتالية حسابية **صحيحة**
 - الجذر هو قاسم أعداد بترتيب معين.
 - يطلق على مجموع حدود n الأولى لتسلسلة المجموع الجزئي **صحيحة**
 - الصيغة $a_n = a_1 + (n-1)d$ هي صيغة تكرارية **صحيحة**
 - المتتالية الهندسية هي متتالية يتحدد كل حد فيها من خلال إضافة قيمة ثابتة إلى الحد السابق **خاطئة. متتالية حسابية**
 - يطلق على التسلسلة الهندسية اللانهائية التي لا تتضمن مجموعاً الجزئي **خاطئة. متسلسلة تباعدية**
 - أحد عشر و 17 هما وسيطان هندسيان بين 5 و 23 في المتتالية 5, 11, 17, 23 **خاطئة. الأوساط الحسابية**
 - باستخدام نظرية الحد المقارن $(x-2)^4$ يمكن دقة إلى $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$ **صحيحة**

المفاهيم الأساسية

- المتتاليات والمتسلسلات الحسابية (الدرس 9-1 و 9-2)**
- الحد n في a_n من المتتالية الحسابية ذات الحد الأول a والفرق المشترك d يتم الحصول عليه بواسطة $a_n = a + (n-1)d$.
 - مجموع S_n للحدود n الأولى في متسلسلة حسابية يتم الحصول عليه بواسطة $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$ أو $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$.
- المتتاليات والمتسلسلات الهندسية (الدرس 9-3 و 9-4)**
- الحد n في a_n من المتتالية الهندسية ذات الحد الأول a والنسبة المشتركة r يتم الحصول عليه بواسطة $a_n = a \cdot r^{n-1}$ حيث $r \neq 0$.
 - مجموع S_n للحدود n الأولى في متتالية هندسية يتم الحصول عليه بواسطة $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ أو $S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1-r}$ حيث $r \neq 1$.
 - مجموع S لتسلسلة هندسية لانهائية ذات $-1 < r < 1$ يتم الحصول عليه بواسطة $S = \frac{a_1}{1-r}$.
- التكرار وإعادة التكرار (الدرس 9-5)**
- في الصيغة التكرارية، تم صياغة كل حد من حد واحد أو أكثر من الحدود السابقة.

نظرية ذات الحدود (الدرس 9-6)

نظرية ذات الحدود.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

الاستقراء الرياضي (الدرس 9-7)

- الاستقراء الرياضي هو طريقة برهانية تستخدم للبرهنة على عبارات حول الأعداد الصحيحة الموجبة.

المطلوبات منظم الدراسة



تأكد من تدوين المفاهيم الأساسية في المطويات.

التقييم التكويني

المفردات الأساسية تشير الصفحات المرجعية المذكورة بعد كل كلمة إلى الموضوع الذي ورد فيه ذلك المصطلح لأول مرة. فإذا واجه الطلاب صعوبة في الإجابة عن الأسئلة 1-10 فذكرهم باستخدام هذه الصفحات المرجعية لإعناش ذاكرتهم بشأن المفردات.

مطلوبات منظم الدراسة

المطويات @ دينا زاويك

اطلب من الطلاب إلقاء نظرة على الوحدة للتأكد من أنهم قد أضافوا بعض الأمثلة إلى مطوياتهم. واقترح عليهم إبقاء مطوياتهم بجانبهم أثناء إكمال صفحات دليل الدراسة والمراجعة، مشيرًا إلى أن المطويات تعدّ بمثابة أداة مراجعة سريعة عند المذاكرة من أجل اختيار الوحدة.





الوحدة 9 دليل الدراسة والمراجعة

مراجعة درس بدرس
 التدخل إذا كانت الأمثلة المعطاة غير كافية لعرض الموضوعات التي تتناولها الأسئلة، فذكر الطلاب بأن مراجع الدروس ترشددهم إلى مكان مراجعة الموضوع في كتبهم المدرسية.

مراجعة درس بدرس

9-1 المتتابعات كدوال

أوجد الحد المشار إليه لكل متتالية حسابية.

- 11. $a_1 = 9, d = 3, n = 14$ **48**
- 12. $a_1 = -3, d = 6, n = 22$ **123**
- 13. $a_1 = 10, d = -4, n = 9$ **-22**
- 14. $a_1 = -1, d = -5, n = 18$ **-86**

مثال 1

أوجد الحد الخامس والعشرين لمتتالية حسابية إذا كان $a_1 = -15$ و $d = 6$

صيغة الحد n : $a_n = a_1 + (n - 1)d$

$n = 25, a_1 = -15, d = 6$

بسط: $a_{25} = 45$

9-2 المتتابعات والمتسلسلات الحسابية

أوجد الأوساط الحسابية في كل متتالية.

- 15. $-12, \dots, 8, -7, -2, 3$
- 16. $15, \dots, 29, \frac{59}{3}, \frac{73}{3}$
- 17. $12, \dots, -8, 8, 4, 0, -4$
- 18. $72, \dots, 24, 60, 48, 36$
- 19. الأعمال المصرفية بدخر زايد AED 150 كل شهرين. إذا أدر هذا المعدل لمدة عامين، فكم سيكون لديه نهاية عامين؟ **AED 1800**
- أوجد S_n لكل متتالية حسابية.
- 20. $a_1 = 16, a_n = 48, n = 6$ **192**
- 21. $a_1 = 8, a_n = 96, n = 20$ **1040**
- 22. $9 + 14 + 19 + \dots + 74$ **581**
- 23. $16 + 7 + -2 + \dots - 65$ **-245**

مثال 2

أوجد الوسطين الحسابيين بين 3 و 39.

صيغة الحد n : $a_n = a_1 + (n - 1)d$

$n = 4, a_1 = 3$

$39 = 3 + 3d$ $a_4 = 39$

بسط: $12 = d$

الوسطان الحسابيان هما $12 + 3 = 15$ و $15 + 12 = 27$

مثال 3

أوجد S_n للمتسلسلة الحسابية ذات $a_1 = 18$ و $a_n = 56$ و $n = 8$

صيغة المجموع $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

$n = 8, a_1 = 18, a_n = 56$

بسط: $S_8 = 296$

مثال 4

أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{15} 5k + 1$

استخدم الصيغة $(n, r) = \frac{n}{2}(n + 1)$. يوجد 13 حد.

$a_1 = 5(3) + 1 = 16$ أو $a_{13} = 5(15) + 1 = 76$

$S_{13} = \frac{13}{2}(16 + 76) = 598$

24. الفراغا لدى ليلى أدا مسرحي بعد 12 يوما. وتخطط للتدريب على الأجزاء الخاصة بها كل ليلة. وفي أول ليلة، تدرت على الأجزاء الخاصة بها مرتين. وفي الليلة التالية، تدرت 4 مرات. وفي الليلة الثالثة، تدرت 6 مرات. في الليلة الحادية عشر، كم مرة تدرت على الأجزاء الخاصة بها؟ **132**

أوجد مجموع كل متسلسلة حسابية.

- 25. $\sum_{k=5}^{21} (3k - 2)$ **629**
- 26. $\sum_{k=0}^{10} (6k - 1)$ **319**
- 27. $\sum_{k=4}^{15} (-2k + 5)$ **-99**



دليل الدراسة والمراجعة 9

3- المتتاليات والمسلسلات الهندسية

أوجد الحد المشار إليه لكل متتالية هندسية.

28. $a_1 = 5, r = 2, n = 7$ **320**
 29. $a_1 = 11, r = 3, n = 3$ **99**
 30. $a_1 = 128, r = -\frac{1}{2}, n = 5$ **8**
 31. $\frac{2187}{8}$ و $\frac{9}{8} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{8}$ بالنسبة إلى $n = 3$

أوجد الأوساط الهندسية في كل متتالية.

32. 6, ..., 162 **18, 54**
 33. 8, ..., 648 **$\pm 24, 72, \pm 216$**
 34. -4, ..., 108 **12, -36**

35. المدفوعات لدى نجاة حساب ادخار يبلغ الرصيد به حالياً AED 1500 كم سيبلغ رصيد نجاة بعد 4 أعوام إذا حصل على نسبة فائدة بنسبة 5% سنوياً؟ **AED 1823.26**

أوجد S_n لكل متتالية هندسية.

36. $a_1 = 15, r = 2, n = 4$ **225**
 37. $a_1 = 9, r = 4, n = 6$ **12,285**
 38. ... + 20 + 10 + 5 إلى حدود 7 **215**
 39. ... + 27 + 81 + 243 إلى حدود 5 **363**

أوجد قيمة مجموع كل متسلسلة هندسية.

40. $\sum_{k=1}^7 3 \cdot (-2)^{k-1}$ **129** 41. $\sum_{k=1}^8 -1 \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$ **$-\frac{6305}{2187}$**

42. الإعلان تسلم قبيلة منشورات دعائية للترويج لاجتماع مجلس الطلاب التالي، وتسلم المنشورات لأربعة أشخاص. ثم يسلم هؤلاء الأشخاص الأربعة المنشورات إلى 4 أشخاص آخرين. ومن ثم يسلم هؤلاء الأشخاص الأربعة المنشورات الأربعة إلى 4 أشخاص جدد. إذا اعتبرنا أن قبيلة هي الجولة الأولى، كم عدد الأشخاص الذين حصلوا على منشورات حتى الجولة الرابعة؟ **85**

مثال 5

أوجد الحد السادس لمتتالية هندسية، والتي فيها $a_1 = 9$ و $r = 4$.

صيغة للحد $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$
 $a_6 = 9 \cdot 4^{6-1} \quad n = 6, a_1 = 9, r = 4$
 $a_6 = 9216$

الحد السادس هو 9216.

مثال 6

أوجد وسطين هندسيين بين 1 و 27.

صيغة الحد النوني $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$
 $a_4 = 1 \cdot r^{4-1} \quad n = 4, a_1 = 1$
 $27 = r^3 \quad a_4 = 27$
 $3 = r$ بسيط

الوسطان الهندسيان هما 3 أو 3K و 3K3 أو 9.

مثال 7

أوجد مجموع المتسلسلات الهندسية التي يكون فيها $a_1 = 3$ و $r = 5$ و $n = 11$.

صيغة المجموع $S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1 - r}$
 $S_{11} = \frac{3 - 3 \cdot 5^{11}}{1 - 5} \quad n = 11, a_1 = 3, r = 5$
 $S_{11} = 36,621,093$ استخدم الآلة الحاسبة.

مثال 8

أوجد قيمة $\sum_{k=1}^6 2 \cdot (4)^{k-1}$

$S_6 = \frac{2 - 2 \cdot 4^6}{1 - 4} \quad n = 6, a_1 = 2, r = 4$
 $= \frac{-8190}{-3}$ بسيط
 $= 2730$ بسيط

مصدر: دليل الدراسة والمراجعة، © مطبوع: 2017، وزارة التعليم، الإمارات العربية المتحدة

9-4 المتسلسلة الهندسية اللانهائية

مثال 9

أوجد مجموع المتسلسلات الهندسية اللانهائية التي فيها $r = \frac{1}{3}$ و $a_1 = 15$

صيغة المجموع

$$S = \frac{a_1}{1-r}$$

$$= \frac{15}{1-\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{15}{\frac{2}{3}} = 22.5$$

بسط

أوجد مجموع كل متسلسلة ∞ نهائية، إن وجد.

43. $a_1 = 8, r = \frac{3}{4}$ **32**

44. $\frac{5}{6} - \frac{20}{18} + \frac{80}{54} - \frac{320}{162} + \dots$ **يوجد ∞**

45. $\sum_{k=1}^{\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$ **6**

46. العلوم الفيزيائية أسقطت ميمون كرة من أعلى منس بمل ارتفاعه 20 متراً. وفي كل مرة نغز فيها الكرة، ترتد مرة أخرى إلى $\frac{2}{3}$ من الارتفاع السابق. إذا استمرت الكرة في اتباع هذا النمط، ما إجمالي المسافة التي قطعتها الكرة؟ **100 m**

9-5 التكرار والإعادة

مثال 10

أوجد أول خمسة حدود في المتتالية، حيث $a_1 = 1$ و $a_{n+1} = 3a_n + 2$

صيغة تكرارية

$a_{n+1} = 3a_n + 2$	$n = 1$
$a_{1+1} = 3a_1 + 2$	$a_1 = 1$
$a_2 = 3(1) + 2$ أو 5	$n = 2$
$a_{2+1} = 3a_2 + 2$	$a_2 = 5$
$a_3 = 3(5) + 2$ أو 17	$n = 3$
$a_{3+1} = 3a_3 + 2$	$a_3 = 17$
$a_4 = 3(17) + 2$ أو 53	$n = 4$
$a_{4+1} = 3a_4 + 2$	$a_4 = 53$
$a_5 = 3(53) + 2$ أو 161	

الحدود الخمسة الأولى للمتتالية هي 1 و 5 و 17 و 53 و 161.

مثال 11

أوجد التكرارات الثلاثة الأولى للذالة $f(x) = 3x - 2$ للنسبة $x_0 = 2$ للنسبة للقيمة الأولية لـ $x_0 = 2$

$x_1 = f(x_0)$	$x_2 = f(x_1)$	$x_3 = f(x_2)$
$= f(2)$	$= f(4)$	$= f(10)$
$= 3(2) - 2$	$= 3(4) - 2$	$= 3(10) - 2$
$= 4$	$= 10$	$= 28$

التكرارات الثلاثة الأولى هي 4 و 10 و 28.

أوجد الحدود الخمسة الأولى من كل متتالية.

47. $a_1 = -3, a_{n+1} = a_n + 4$ **-3, 1, 5, 9, 13**

48. $a_1 = 5, a_{n+1} = 2a_n - 5$ **5, 5, 5, 5, 5**

49. $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 5$ **1, 6, 11, 16, 21**

50. الهدويات لدى شيخة حساب ادخار يحتوي على رصيد بقيمة 12,000 AED ويتم إضافة نسبة مزايا 5% كل شهر. وتضيف شيخة كل شهر 500 AED إلى الرصيد. وتصف الحساب التكراري بعد مرور عدد n من الشهور. أوجد الرصيد الموجود في حساب شيخة بعد مرور 3 أشهر. قرب إجابتك إلى أقرب فلس. **AED 15,467.75**

أوجد التكرارات الثلاثة الأولى لكل دالة بالنسبة لتلقية الأولية المعطاة.

51. $f(x) = 2x + 1, x_0 = 3$ **7, 15, 31**

52. $f(x) = 5x - 4, x_0 = 1$ **1, 1, 1**

53. $f(x) = 6x - 1, x_0 = 2$ **11, 65, 389**

54. $f(x) = 3x + 1, x_0 = 4$ **13, 40, 121**



دليل الدراسة والمراجعة



9-6 نظرية ذات الحدين

فكك كل ذات حدين. 56-59. انظر الهامش.

فكك $(x - 3y)^4$.

$$(x - 3y)^4 = x^4 + 4C_1x^3(-3y) + 6C_2x^2(-3y)^2 + 4C_3x(-3y)^3 + (-3y)^4$$

$$= x^4 + 4C_1x^3(-3y) + \frac{6}{2!}x^2(-3y)^2 + \frac{4}{3!}x(-3y)^3 + (-3y)^4$$

$$= x^4 + -12x^3y + 54x^2y^2 + -108xy^3 + 81y^4$$

مثال 12

أوجد الحد الرابع لـ $(x + y)^8$.

استخدم نظرية ذات الحدين لكتابة المكوّن في الرمز سيجما.

$$(x + y)^8 = \sum_{k=0}^8 \frac{8!}{k!(8-k)!} x^k y^{8-k}$$

بالنسبة للحد الرابع، $k = 3$.

$$\frac{8!}{3!(8-3)!} x^3 y^{8-3} = \frac{8!}{3!5!} x^3 y^5 = 56x^3y^5$$

مثال 13

أوجد الحد الثالث لـ $(a + 2b)^8$.

60. $112a^4b^4$

61. الحد السادس لـ $(3x + 4y)^7$ $193,536x^2y^5$

62. الحد الثاني لـ $(4x - 5)^{10}$ $-13,107,200x^9$

أوجد الحد المشار إليه لكل تعبير.

9-7 البرهان بالاستقراء الرياضي

برهن صحة كل من العبارات التالية بالنسبة لجميع الأعداد الصحيحة الموجبة.

انظر الهامش. $63. 2 + 6 + 12 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

1.64. 7^n يقبل القسمة على 6

1.65. 5^n يقبل القسمة على 4

64, 65. انظر ملحق إجابات الوحدة 9.

أوجد متلا مضادا لكل عبارة.

1.1. $8^n + 3$ يقبل القسمة على 11، $n = 2$

1.17. $6^{n+1} - 2$ يقبل القسمة على 5، $n = 2$

1.2. $n^2 + 2n + 4$ هو عدد أولي، $n = 2$

1.69. $n + 19$ هو عدد أولي، $n = 1$

مثال 14

برهن أن $9^n + 3$ يقبل القسمة على 4.

عندما يكون $n = 1$ ، فإن $9^1 + 3 = 9 + 3 = 12$ يقبل القسمة على 4. حيث إن العدد 12 عند قسمته على 4 يسبق 3. فإن العبارة صحيحة بالنسبة لـ $n = 1$.

افترض أن $9^k + 3$ يقبل القسمة على 4 بالنسبة إلى العدد الصحيح الموجب k . هذا يعني أن $9^k + 3 = 4r$ لبعض r بالنسبة إلى العدد الصحيح r .

الخطوة 1

$$9^k + 3 = 4r$$

الخطوة 2

$$9^{k+1} + 3 = 36r - 27$$

الخطوة 3

$$9^{k+1} + 3 = 36r - 24$$

$$9^{k+1} + 3 = 4(9r - 6)$$

بما أن r عدد كلي، فإن $9r - 6$ عدد كلي. لذلك $9^{k+1} + 3$ يقبل القسمة على 4. إذا العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$ ولهذا، فإن $9^n + 3$ يقبل القسمة على 4 بالنسبة لكل الأعداد الصحيحة الموجبة n .

إجابات إضافية

56. $y^7 - 21y^6 + 189y^5 - 945y^4 + 2835y^3 - 5103y^2 + 5103y - 2187$
57. $-32z^5 + 240z^4 - 720z^3 + 1080z^2 - 810z + 243$
58. $256a^4 - 768a^3b + 864a^2b^2 - 432ab^3 + 81b^4$
59. $x^5 - \frac{5}{4}x^4 + \frac{5}{8}x^3 - \frac{5}{32}x^2 + \frac{5}{256}x - \frac{1}{1024}$
63. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة يساوي 2 وكذلك الطرف الأيمن للمعادلة يساوي 2. إذا، فالمعادلة صحيحة عند $n = 1$.
- الخطوة 2: افترض أن $2 + 6 + \dots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$ بالأعداد الصحيحة الموجبة k .
- الخطوة 3: $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + k(k+1) + (k+1)(k+2)$
- $$= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2)$$
- $$= \frac{k(k+1)(k+2) + 3(k+1)(k+2)}{3}$$
- $$= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$
- $$= \frac{(k+1)(k+1+1)(k+1+2)}{3}$$
- التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة الذي يجب إثباته. حيث $n = k + 1$ وبالتالي، تكون المعادلة صحيحة عندما $n = k + 1$. إذا، $2 + 6 + 12 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ لكل الأعداد الصحيحة الموجبة n .





تدريب على الاختبار المعياري

13. اكتب $0.\overline{65}$ في صورة كسر اعتيادي. $\frac{65}{99}$
 أوجد الحدود الخمسة الأولى من كل متتالية.

14. $a_1 = -1, a_n + 1 = 3a_n + 5$ -1, 2, 11, 38, 119
 15. $a_1 = 4, a_n + 1 = a_n + n$ 4, 5, 7, 10, 14

16. الاختيار من متعدد ما التكرارات الثلاثة الأولى للدالة $f(x) = -5x + 4$ بالنسبة للقيمة الأولية $x_0 = 3$ ؟
 A 3, -11, 59
 B -11, 59, -291
 C -1, -6, -11
 D 59, -291, 1459

17. حاك $(2a - 3b)^4$.
 $16a^4 - 96a^3b + 216a^2b^2 - 216ab^3 + 81b^4$
 18. ما معامل الحد الخامس لـ $(m + 3n)^6$ ؟ 1215
 19. أوجد الحد الرابع لمكوك $(c + d)^9$. $84c^6d^3$

برهن على أن كل عبارة صحيحة بالنسبة لجميع الأعداد الصحيحة الموجبة. 20, 21. انظر ملحق إجابات الوحدة 9.
 20. $1 + 6 + 36 + \dots + 6^{n-1} = \frac{1}{5}(6^n - 1)$.
 21. $11^n - 1$ يقبل القسمة على 10.
 22. أوجد مثلاً مضاداً للعبارة التالية.
 $n = 1, 4$ يقبل القسمة على $2^n + 4^n$

23. المدرسة يوجد في صف الأستاذ خالد التدريس العلوم عدداً متساوياً من الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً والطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً. ويريد اختيار 8 طلاب لتمثيل الفصل في معرض العلوم. ما مدى احتمال اختياره 5 طلاب من الذين يبلغون 15 عاماً؟ ما احتمال اختياره حوالي 21.9%
 24. البندول تآرجح ليلي البندول وتتأرجح المسافة التي يتقطعها البندول بمقدار 15% مع كل أرجحة. إذا قطع البندول في البداية 10 سنتيمترات، فأوجد إجمالي المسافة التي سيكون البندول قد قطعها عندما يستقر. حوالي 66.7 سنتيمتراً



603

1. أوجد الحدود الأربعة التالية للمتتالية الحسابية ... 81, 72, 63, ...
 54, 45, 36, 27
 2. أوجد الحد الخامس والعشرين لمتتالية حسابية فيها $a_1 = 9$ و $d = 5$ ؟
 129
 3. الاختيار من متعدد ما الحد الثامن في المتتالية الحسابية التي تبدأ بـ ... 118, 20.2, 22.4, 24.6, ...
 D
 A 26.8
 B 29
 C 31.2
 D 33.4

4. أوجد الأوساط الحسابية الأربعة بين -9 و 11 و -1, 3, 7, -5.
 5. أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية التي فيها $a_1 = 11$ و $a_n = 22$ و $n = 14$ ؟
 231

6. الاختيار من متعدد ما هو الحد التالي في المتتالية الهندسية التالية؟
 H
 $10, \frac{5}{2}, \frac{5}{8}, \frac{5}{32}, \dots$
 F $\frac{5}{8}$
 G $\frac{5}{32}$
 H $\frac{5}{128}$
 I $\frac{5}{256}$

7. أوجد الأوساط الهندسية الثلاثة التي تقع بين 6 و 1536.
 24, 96, 384
 8. أوجد مجموع المتسلمات الهندسية التي فيها $a_1 = 15$ و $r = \frac{2}{3}$ و $n = 5$ ؟
 $\frac{1055}{27}$

- أوجد مجموع كل متسلسلة، إن وجد.
 9. $\sum_{k=1}^{15} (3k - 1)$ 220
 10. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} (3^k)$ لا يوجد
 11. $45 + 37 + 29 + \dots - 11$ 136
 12. $\frac{1}{8} + \frac{2}{24} + \frac{4}{72} + \dots - \frac{3}{8}$

مركز التعليم الإلكتروني © جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



التحضير للاختبارات المعيارية

الوحدة 9 التحضير للاختبارات المعيارية

1 التركيز

الهدف استخدام إستراتيجية البحث عن النمط لحل مسائل الاختبار المعباري.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطرح السؤال التالي:

- ما نوع الأسئلة التي تعتقد أن إستراتيجية البحث عن النمط تناسبها بشكل أفضل؟ الإجابة المحتملة: أسئلة مثل: "ما الحد التالي في المتتالية؟" أو "ما التعبير الذي يمثل هذا النمط؟"
- كيف يمكنك إيجاد نمط؟ الإجابة المحتملة: أطلع كيفية ارتباط حدود النمط وأعثر على العمليات المشتركة التي تعتبر عن النمط.

البحث عن نمط

تتمثل إحدى أكثر إستراتيجيات حل المسائل شيوعاً في البحث عن نمط. فالقدرة على التعرف على الأنماط، وتشابها جبرياً، وتوسعتها تعد أداة قيمة لحل المسائل.

إستراتيجيات البحث عن نمط

الخطوة 1

حدد النمط.

- قارن بين الأعداد أو الأشكال أو التمثيلات البيانية في النمط.
- اسأل نفسك: ما مدى الصلة بين حدود النمط؟
- اسأل نفسك: هل هناك أي عمليات مشتركة تؤدي إلى الانتقال من أحد الحدود إلى الحد التالي؟

الخطوة 2

عمم النمط.

- اكتب قاعدة باستخدام الكلمات لوصف كيفية إنتاج حدود النمط.
- عين التعبيرات واكتب تعبيراً جبرياً لتمثيل النمط إن أمكن.

الخطوة 3

أوجد الحدود المفقودة. ووسع النمط. وأوجد حل المسألة.

- استخدم النمط الخاص بك أو قاعدةك لإيجاد الحدود المفقودة و/أو وسع النمط لحل المسألة.
- تحقق من إجابتك للتأكد من صحتها.



مثال على الاختبار المعباري

اقرأ المسألة وحدد ما تحتاج لمعرفته. ثم استخدم المعلومات المعطاة بالمسألة لحلها.

استخدم متتالية المربعات الموضحة. كم عدد المربعات اللازمة لعمل الشكل التاسع في المتتالية؟



604 | الوحدة 9 | التحضير للاختبارات المعيارية

604 | الوحدة 9 | التحضير للاختبارات المعيارية



472 / 95



الوحدة 9 التحضير للاختبارات المعيارية

مثال إضافي

تدريب على الاختبار المعياري

لدى عبد الله 2100 AED في حساب ادخاري. وفي نهاية كل شهر، يزداد الرصيد بمعدل 0.3% ما المبلغ الذي سيكون لدى عبد الله في حسابه الادخاري بحلول نهاية عام واحد؟ **B**

- A AED 2170.35
- B AED 2176.86
- C AED 2106.89
- D AED 2994.09

3 التقويم

استخدم التمرينين 1 و 2 لتقويم استيعاب الطلاب.

اقرأ المسألة بعناية. يتم إكمال ثلاث أشكال من متتالية ويتطلب منك إيجاد عدد المربعات اللازمة لعمل الشكل التاسع.

ابحث عن نمط في أشكال المربعات. وعد المربعات في كل شكل.



اكتب تعبيراً لتمثيل هذا النمط.

الشرح: عدد المربعات يساوي مربع رقم الشكل. **راند لا عدد.**

التفسير: لنفترض أن n شكل رقم الشكل.

المعادلة: $a_n = n^2 + 1$

استخدم التعبير الذي كتبت لتوسعة النمط وإيجاد عدد المربعات في الشكل التاسع.

$a_9 = 9^2 + 1 = 82$

إذا سيضمن الشكل التاسع 82 مربعاً. الإجابة الصحيحة هي D.

التدريبات

اقرأ المسألة. واستخدم النمط في حلها.

1. الأعداد أدناه تشكل متتالية رياضية شهيرة من الأعداد تعرف باسم متتالية فيبوناتشي. ما عدد فيبوناتشي التالي في المتتالية؟ **B**

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

- A 36
- B 34
- C 31
- D 29

2. ما العدد المجهول في الجدول؟ **H**

n	a_n
1	0
2	2
3	6
4	12
5	??
6	30

- F 17
- G 18
- H 20
- J 21





تدريب على الاختبار المعياري

تراكمي، الوحدات من 1 إلى 9

الوحدة 9 تدريب على الاختبار المعياري

تشخيص أخطاء الطلاب

اطلع على إجابات الطلاب وركز على كل عنصر. قد تشير الاتجاهات السائدة في الصف الدراسي إلى أخطاء شائعة ومفاهيم خاطئة.

- لم يجمع الفرق المشترك و 31 بشكل صحيح
 B صحيح
 C توصل بشكل خاطئ إلى أن 7 هي الفرق المشترك
 D توصل بشكل خاطئ إلى النمط بأن كل حد ثالث ينتهي بـ 9
- ختم F وضع تحذيراً واحداً فقط في الاعتبار
 G ضرب خطأ 4 في 2 بدلاً من تربيع 4
 H صحيح
 J صحيح
- ختم A قيم $k - 1$ فقط من أجل $k = 15$
 B وجد مجموع $k = 1$ إلى 14
 C أجاب إجابة صحيحة
 D وجد مجموع $k = 1$ إلى 16
- ختم F ختم G
 H اعتقد خطأً أن معامل x^2 يتسبب في جعل التمثيل البياني أضيّق
 J صحيح
- ختم A ختم B
 C غير موضع الثابت والأساس
 D نسي a_1
- ختم F التيس عليه الأمر في معاني المتغيرات
 G صحيح
 H لم يلاحظ المتتالية الهندسية
 J لم يلاحظ المتتالية الهندسية
- ختم A عثر على ملوثات تظل موجودة حتى بعد المرور مرتين عبر المرشح
 B عثر على ملوثات تظل موجودة حتى بعد المرور ثلاث مرات عبر المرشح
 C عثر على ملوثات تظل موجودة حتى بعد المرور أربع مرات عبر المرشح
 D صحيح
- ختم F غير موضع الإجمالي
 G طرح تكاليف المشروبات الغازية بدلاً من جمعها
 H صحيح
 J ختم

عدد الأشخاص	طول الخيبة (بالصبر)
7	2
28	5
39	6
67	8
147	12

6. بين الجدول أعلاه خيبة مربعة الشكل وعدد الأشخاص الذين يمكن أن تتسع لهم الخيبة. يفرض أن l يمثل طول الخيبة ويمثل n عدد الأشخاص الذين يمكن أن تتسع لهم الخيبة. حدد المعادلة التي تصف على أفضل نحو العلاقة بين طول الخيبة وعدد الأشخاص الذين تتسع لهم.

F $l = n^2 + 3$ H $l = 3n + 1$
 G $n = l^2 + 3$ J $n = 3l + 1$

7. يقال أن مرشح هواة معين يزيد 90% من الملوثات الموجودة في الهواء في كل مرة يمر فيها بالمرشح. فإذا تم تدوير نفس كمية الهواء عبر المرشح ثلاث مرات، فما النسبة المئوية للملوثات الأصلية التي ستزال من الهواء؟

- A 0.01% B 0.1% C 99.0% D 99.9%

8. في دار السينما، تبلغ تكلفة علبتين من العشار ومشروب غازي AED 34.50 وتبلغ تكلفة 3 علب من العشار و 4 مشروبات غازية AED 81.75. فأي زوج من المعادلات يمكن استخدامه لتحديد p وهو تكلفة علب العشار، و s وهو تكلفة المشروب الغازي؟

F $2p + s = 81.75$ H $2p + s = 34.50$
 $3p + 4s = 34.50$ $3p + 4s = 81.75$
 G $2p - s = 34.50$ J $p + s = 34.50$
 $3p - 4s = 81.75$ $p + 4 = 81.75$

9. أي من التسلسلات الهندسية التالية لا يتطابق من المجموع؟

A $\sum_{k=1}^{\infty} 4 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{k-1}$ C $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{7}{6} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$
 B $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{k-1}$ D $\sum_{k=1}^{\infty} (-2) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}$

نصيحة عند حل الاختبار
 السؤال 9 استوعب الحدود المستخدمة في الجبر. وكيفية تطبيقها. تكون التسلسلات الهندسية تقريبية إذا كان لدى النسبة المشتركة r قيمة مطلقة أقل من 1.

الاختبار من متعدد

اقرأ كل سؤال، ثم اكتب الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة التي يقدمها لك معلمك أو في أي ورقة أخرى.

1. أوجد الحد التالي للمتتالية الحسابية. B

7, 13, 19, 25, 31, ...

- A 36 C 38
 B 37 D 39

2. لحصل معا على تكبير لصورة بمقدار 10 استنشرت في 15 ستيكراً، بحيث تكون الصورة الجديدة ذات أبعاد أكبر 4 مرات من أصلها، فما مساحة التكبير مقارنة بمساحة الصورة الأصلية؟ J

- F المساحة أكبر بمرتين.
 G المساحة أكبر بأربع مرات.
 H المساحة أكبر بثماني مرات.
 J المساحة أكبر بست عشرة مرة.

3. أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{15} (8k - 1)$ C

- A 119 C 945
 B 826 D 1072

4. ما ذا يحدث للتمثيل البياني للمعادلة $y = 3x^2$ عند تغييرها إلى $y = 2x^2$ ؟ J

- F التمثيل البياني للمعادلة $y = 2x^2$ هو انعكاس للتمثيل البياني للمعادلة $y = 3x^2$ للمحور الأفقي y .
 G يدور التمثيل البياني بمقدار 90 درجة حول نقطة الأصل.

- H يقل عرض التمثيل البياني.
 J يزيد عرض التمثيل البياني.

5. اكتب الصيغة الخاصة بالحد n في المتتالية الهندسية الموضحة بالجدول. B

n	a_n
1	5
2	10
3	20
4	40
5	80

- A $a_n = (5)^n$
 B $a_n = 5(2)^{n-1}$
 C $a_n = 2(5)^{n-1}$
 D $a_n = 5(2)^n$

606 | الوحدة 9 | تدريب على الاختبار المعياري

- A. 9 ستكون القيمة المطلقة للنسبة المشتركة أقل من واحد
 B صحيح
 C ستكون القيمة المطلقة للنسبة المشتركة أقل من واحد
 D ستكون القيمة المطلقة للنسبة المشتركة أقل من واحد

606 | الوحدة 9 | تدريب على الاختبار المعياري



472 / 97





الوحدة 9 ترتيب على الاختيار العياري

إجابات إضافية

16. الإجابة النموذجية: افترض أن $2n + 1$ و $2k + 1$ يمثلان أي عددين فرديين صحيحين حيث n و k عدنان صحيحان. إذاً مجموعهما يساوي $(2n + 1) + (2k + 1)$. يمكن كتابة ذلك في صورة $2(n + k + 1)$ وهي ناتج ضرب 2 في عدد صحيح. $n + k + 1$. إذاً المجموع $2n + 2k + 2$ يساوي عدداً زوجياً.

17b. 5: نصف القطر هو المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها.

$$r = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (0 - (-4))^2}$$

$$= \sqrt{(-3)^2 + 4^2}$$

$$= 5$$

14. في مزرعة بكتيريا، نمو البكتيريا يعدل أسي مع مرور الوقت. كما هو موضح بالجدول.

الساعات	عدد البكتيريا
0	1000
1	2000
2	4000

اكتب معادلة للتعبير عن عدد البكتيريا، y بالنسبة للزمن، t .

$$y = (1000) \cdot (2)^t$$

15. الإجابة الشبكية ما ذبهد $f(g(6))$ إذا كان $f(x) = 2x + 4$ و $g(x) = x^2 + 5$ و 86

الإجابة الموسعة

دون إجاباتك على ورقة، واكتب الحل هنا.

16. برهن على أن مجموع أي عددين صحيحين فرديين هو عدد زوجي. **انظر الهاش.**
17. النقطتان الطرفيتان لقطر دائرة يكونان عند النقطتين $(-1, 0)$ و $(5, -8)$. $(2, -4)$ ، a : المركز هو نقطة منتصف **قطر الدائرة**.
- a. ما إحداثيات مركز الدائرة؟ اشرح طريقتك في إيجاد الإجابة.
- b. أوجد نصف قطر الدائرة. اشرح طريقتك في إيجاد الإجابة. **انظر الهاش.**
- c. اكتب معادلة للدائرة. $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 25$
18. تقطع دراجة المسافة من دبي إلى الشارقة خلال ساعتين ونصف. إذا زادت من سرعتها، فيمكنها تقطع نفس المسافة خلال ساعتين.
- a. هل يمثل هذا الموقف تغيراً طردياً أم تغيراً عكسياً؟ اشرح استنتاجك.
- b. إذا كانت الرحلة من دبي إلى الشارقة تستغرق ساعتين ونصف عند السير بسرعة 12 كيلومتراً في الساعة، ما السرعة التي ينبغي التغيير إليها لتقطع نفس المسافة خلال ساعتين؟ **15 km/h**
- 18a. **تغير عكسي؛ عند التحول إلى سرعة أقل، تزداد الفترة الزمنية لتقطع نفس المسافة.**

الإجابة التصورية/الإجابة الشبكية

اكتب الإجابات في ورقة الإجابة التي قدمها إليك المعلم أو ورقة أخرى.

10. ما أبعاد المسوفة التي تنتج عن عملية ضرب الموضحة 4×1 ؟

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

11. الإجابة الشبكية تأمل النمط أدناه إلى كم قطعة سيتم تقسيم الشكل السادس في النمط؟ **1024**




الشكل 1: قطعة واحدة
الشكل 2: 4 قطع
الشكل 3: 16 قطعة

12. استخدم نظرية ذات الحدين لتبسيط التعبير $(c + d)^6$.

$$c^6 + 6c^5d + 15c^4d^2 + 20c^3d^3 + 15c^2d^4 + 6cd^5 + d^6$$

13. الإجابة الشبكية تنتك سهلة وعاء أسطوانا نحتاج إلى ملءه بالترية حتى نتمكن من زرع بعض الزهور.



ما حجم الأسطوانة بالستيمترات المكعبة مقرباً إلى أقرب ستيمتر مكعب؟ **9048**


مركز البحث الوطني للبحوث والدراسات التربوية والتقنية






الدرس 9-1


39. -8, 32, -128




40. $\frac{16}{3}, \frac{32}{9}, \frac{64}{27}$




41. $27, \frac{81}{4}, \frac{243}{16}$




42. 192, 256, $\frac{1024}{3}$





43. 27, 81, 243




44. 0.0001, 0.00001, 0.000001




60. الإجابة النموذجية: عندما تكون قيمة r مضاعفة، فإن قيمة a_2 تكون مضاعفة، وتبلغ قيمة a_3 أربعة أضعاف، ويكون a_4 مضروباً في 8، و a_5 مضروباً في 2^4 أو 16. وهكذا. إذاً، الحدود الجديدة هي $a_n = a_n \cdot 2^{n-1}$. وعندما تكون قيمة r مقسومة على اثنين، تكون الحدود الجديدة $a_n = a_n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.




14. 40.5, 60.75, 91.125




15. 128, 256, 512




16. $\frac{2}{5}, \frac{2}{25}, \frac{2}{125}$




17. $\frac{1}{9}, \frac{-1}{27}, \frac{1}{81}$




25. 8, 11, 14, 17




26. -22, -30, -38, -46




27. -29, -35, -41, -47




28. 32, 49, 66, 83



29. $2, \frac{13}{5}, \frac{16}{5}, \frac{19}{5}$



30. $\frac{7}{3}, \frac{10}{3}, \frac{13}{3}, \frac{16}{3}$





80. الإجابة النموذجية: افترض أن الحد n من المتتالية

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_2 + d$$

$$a_3 = (a_1 + d) + d$$

$$a_3 = a_1 + 2d$$

$$a_3 = a_1 + (3 - 1)d$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

و $d =$ الفرق المشترك
تعريف الحد الثاني لمتتالية حسابية
تعريف الحد الثالث لمتتالية حسابية
التعويض
خاصية التجميع في الجمع
 $3 - 1 = 2$
 $n = 3$

81. $S_n = (a_1 + a_n) \cdot \left(\frac{n}{2}\right)$





$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$a_n - (n - 1)d = a_1$$

$$S_n = [a_n - (n - 1)d + a_n] \cdot \left(\frac{n}{2}\right)$$

$$S_n = [2a_n - (n - 1)d] \cdot \left(\frac{n}{2}\right)$$


صيغة المجموع العامة
صيغة الحد n من
اطرح $(n - 1)d$ من كلا الطرفين.
التعويض
بسط.



$R = \{f(x) \mid f(x) > 0\}$. $D =$ (جميع الأعداد الحقيقية).

607B

73.




الدرس 9-2


71a.

S_n	n
4	1
10	2
18	3
28	4
40	5
54	6
70	7
88	8
108	9
130	10

71b.



71c.






4	3	2	1	المستطيل
1	1	1	1	العرض
3	4	4	3	الارتفاع
3	4	4	3	المساحة

14 وحدة²، سيكون التقدير أكبر من المساحة الفعلية. لأن المستطيلات تمتد خارج المساحة أسفل المنحنى.

6. الإجابة النموذجية:

x	0	1	2	3	4
y	0	1	8	27	64




3	2	1	المستطيل
1	1	1	العرض
27	8	1	الارتفاع
27	8	1	المساحة

36 وحدة²، سيكون التقدير أقل من المساحة الفعلية. لأن المستطيلات موجودة داخل المنحنى تاركاً بعض المساحة مفقودة.


7. الإجابة النموذجية:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9




6	5	4	3	2	1	المستطيل
1	1	1	1	1	1	العرض
9	4	1	1	4	9	الارتفاع
9	4	1	1	4	9	المساحة

28 وحدة²، سيكون التقدير أكبر من المساحة الفعلية. لأن المستطيلات تمتد خارج المساحة أسفل المنحنى.



$R = \{f(x) \mid f(x) > 3\}$. (جميع الأعداد الحقيقية).



$R = \{f(x) \mid f(x) > -1\}$. (جميع الأعداد الحقيقية).

الدرس 9-3

67. الإجابة النموذجية: يجب تغيير $n - 1$ إلى n . ويجب تغيير 10 إلى 9 عند حدوث ذلك. ستكون حدود المتسلسلتين متطابقتين. (سيكون a_1 في المتسلسلة الأولى مساوياً لـ a_0 في المتسلسلة الثانية. وهكذا) وستكون المتسلسلتان متساويتين.


68. الإجابة النموذجية:

افترض أن $a_n =$ الحد النوني للمتتالية و $r =$ النسبة المشتركة.
 تعريف الحد الثاني
 لمتتالية هندسية
 تعريف الحد الثالث
 لمتتالية هندسية
 التعويض
 خاصية التجميع في الضرب
 $3 - 1 = 2$
 $n = 3$

الاستكشاف 9-4

5. الإجابة النموذجية:

x	-2	-1	0	1	2
y	0	3	4	3	0





وبذلك، $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ لجميع الأعداد الطبيعية n .

3c. الخطوة 1، إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $\frac{1(1+1)}{2}$ أو 1. والطرف الأيمن يساوي

الخطوة 2، افترض أن $1 + 3 + 6 + \dots + \frac{k(k+1)}{2} = \frac{k(k+1)(k+2)}{6}$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3، $1 + 3 + 6 + \dots + \frac{k(k+1)}{2} + \frac{(k+1)(k+1+1)}{2}$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{6} + \frac{(k+1)(k+1+1)}{2}$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{6} + \frac{3(k+1)(k+2)}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k+1+1)(k+1+2)}{6}$$

التعبير الأخير يساوي الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$ وبالتالي، فإن المعادلة صحيحة

بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً، $1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ بالنسبة لجميع الأعداد الطبيعية n .

4. الخطوة 1، $10^1 - 1 = 9$ ، العبارة الصحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2، افترض أن $10^k - 1 = 9r$ قابلة للتقسيم على 9 بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k ، هذا يعني أن $10^k - 1 = 9r$ لبعض الأعداد الطبيعية r .

الخطوة 3، $10^k - 1 = 9r$

$$10^k = 9r + 1$$

$$10^{k+1} = 90r + 10$$

$$10^{k+1} - 1 = 90r + 9$$

$$10^{k+1} - 1 = 9(10r + 1)$$

بما أن r عدد كلي، فإن $10r + 1$ عدد كلي، إذاً، $10^{k+1} - 1$ قابلة للتقسيم على 9 وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$ ولذلك، $10^n - 1$ قابلة للتقسيم على 9 لجميع الأعداد الطبيعية n .

5. الخطوة 1، $4^1 - 1 = 3$ ، العبارة الصحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2، افترض أن $4^k - 1 = 3r$ قابلة للتقسيم على 3 بالنسبة إلى بعض الأعداد الطبيعية k ، وهذا يعني أن $4^k - 1 = 3r$ لبعض الأعداد الكلية r .

$$4^k - 1 = 3r$$

$$4^k = 3r + 1$$

$$4^{k+1} = 12r + 4$$

$$4^{k+1} - 1 = 12r + 3$$

$$4^{k+1} - 1 = 3(4r + 1)$$

بما أن r عدد كلي، فإن $4r + 1$ عدد كلي، إذاً، $4^{k+1} - 1$ قابلة للتقسيم على 3 وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$ ولذلك، $4^n - 1$ قابلة للتقسيم على 3 بالنسبة لجميع الأعداد الطبيعية n .

الدرس 9-7 (تمرين موجه)

1. الخطوة 1، إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي 1^2 أو 1. ويكون الطرف الأيمن $\frac{1(1+1)(1+2)}{6}$ أو 1. إذاً، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2، افترض أن $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ بالنسبة إلى العدد الطبيعي k .

الخطوة 3، $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + \frac{6(k+1)^2}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k+1+1)(2(k+1)+1)}{6}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، إذاً، $n = k + 1$ وبالتالي، تكون المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$ ، إذاً، $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ بالنسبة إلى كل الأعداد الطبيعية n .

2. الخطوة 1، $7^1 - 1 = 6$ ، العبارة الصحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2، افترض أن $7^k - 1 = 6r$ قابلة للتقسيم على 6 بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k ، هذا يعني أن $7^k - 1 = 6r$ لبعض الأعداد الطبيعية r .

$$7^k - 1 = 6r$$

$$7^k = 6r + 1$$

$$7^{k+1} = 7(6r + 1)$$

$$7^{k+1} - 1 = 42r + 6$$

$$7^{k+1} - 1 = 6(7r + 1)$$

بما أن r عدد طبيعي، و $7r + 1$ عدد طبيعي، إذاً، $7^{k+1} - 1$ قابلة للتقسيم على 6 وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$ ولذلك، $7^n - 1$ قابلة للتقسيم على 6 لجميع الأعداد الطبيعية n .

الدرس 9-7

2. الخطوة 1، إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي 1. ويكون الطرف الأيمن $\frac{1(1+1)}{2}$ أو 1. وبالتالي المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2، افترض أن $1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3، $1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1)$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي ينبغي إثباتها، حيث $n = k + 1$ وبالتالي، فإن المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$.





الخطوة 3: $1 + 5 + 9 + \dots + (4k - 3) + [4(k + 1) - 3]$
 $= k(2k - 1) + [4(k + 1) - 3]$
 $= 2k^2 - k + 4k + 4 - 3$
 $= 2k^2 + 3k + 1$
 $= (k + 1)(2k + 1)$
 $= (k + 1)[2(k + 1) - 1]$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$.
 إذاً، $1 + 5 + 9 + \dots + (4n - 3) = n(2n - 1)$ لجميع الأعداد الطبيعية n .

12. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة

يساوي 1. ويساوي الطرف الأيمن من المعادلة $\frac{1(3(1) - 1)}{2}$ أو 1. إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $1 + 4 + 7 + \dots + (3k - 2) = \frac{k(3k - 1)}{2}$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $1 + 4 + 7 + \dots + (3k - 2) + [3(k + 1) - 2]$
 $= \frac{k(3k - 1)}{2} + [3(k + 1) - 2]$
 $= \frac{k(3k - 1)}{2} + 3k + 1$
 $= \frac{k(3k - 1) + 6k + 2}{2}$
 $= \frac{3k^2 + 5k + 2}{2}$
 $= \frac{(k + 1)(3k + 2)}{2}$
 $= \frac{(k + 1)(3(k + 1) - 1)}{2}$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً، $1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2) = \frac{n(3n - 1)}{2}$ لجميع الأعداد الطبيعية n .

13. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $1 - (1) = 0$ أو 0. ويساوي الطرف الأيمن من المعادلة $2(1)^2 + 1$ أو 3. إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $3 + 7 + 11 + \dots + (4k - 1) = 2k^2 + k$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $3 + 7 + 11 + \dots + (4k - 1) + [4(k + 1) - 1]$
 $= 2k^2 + k + [4(k + 1) - 1]$
 $= 2k^2 + k + 4k + 3$
 $= 2k^2 + 5k + 3$
 $= 2k^2 + 4k + 2 + k + 1$
 $= [2(k + 1)^2] + (k + 1)$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً، $3 + 7 + 11 + \dots + (4n - 1) = 2n^2 + n$ لجميع الأعداد الطبيعية n .

14. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر للمعادلة المعطاة يساوي $\frac{1}{1} = 1$ أو 1. والطرف الأيمن يساوي $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ أو 0.5.

الخطوة 2: افترض أن $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

8. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $\frac{1}{2}$. ويساوي الطرف الأيمن $1 - \frac{1}{2}$ أو $\frac{1}{2}$. إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}}$
 $= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}}$
 $= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}}$
 $= 1 - \frac{1}{2^{k+1}}$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً،

9. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي 2. ويساوي الطرف الأيمن من المعادلة $\frac{1(3(1) + 1)}{2}$ أو 2. إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) = \frac{k(3k + 1)}{2}$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + [3(k + 1) - 1]$
 $= \frac{k(3k + 1)}{2} + [3(k + 1) - 1]$
 $= \frac{k(3k + 1) + 2(3k + 1) - 1}{2}$
 $= \frac{3k^2 + k + 6k + 6 - 1}{2}$
 $= \frac{3k^2 + 7k + 5}{2}$
 $= \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2}$
 $= \frac{(k + 1)(3(k + 1) + 1)}{2}$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً،

10. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $1 - 2^1 = -1$ أو -1. إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{k-1} + 2^k - 1 + 1$
 $= 2^k - 1 + 2^k - 1 + 1$
 $= 2^k + 2^k - 1$
 $= 2(2^k) - 1$
 $= 2^{k+1} - 1$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً،

11. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ أو $2^1 - 1 = 1$ أو 1. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{k-1} + 2^k - 1 + 1$
 $= 2^k - 1 + 2^k - 1 + 1$
 $= 2^k + 2^k - 1$
 $= 2(2^k) - 1$
 $= 2^{k+1} - 1$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً،

12. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ أو $2^1 - 1 = 1$ أو 1. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{k-1} + 2^k - 1 + 1$
 $= 2^k - 1 + 2^k - 1 + 1$
 $= 2^k + 2^k - 1$
 $= 2(2^k) - 1$
 $= 2^{k+1} - 1$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها، حيث $n = k + 1$. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً،

13. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $1 + 5 + 9 + \dots + (4k - 3) = k(2k - 1) + [4(k + 1) - 3]$ أو $1 + 5 + 9 = 14$ أو 14. وبالتالي، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $1 + 5 + 9 + \dots + (4k - 3) = k(2k - 1) + [4(k + 1) - 3]$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .





17. الخطوة 1: $5^1 + 3 = 8$. القابلة للنسبة على 4. العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.
الخطوة 2: افترض أن $5^k + 3$ قابلة للنسبة على 4 لبعض الأعداد الطبيعية k . وهذا يعني أن $5^k + 3 = 4r$ لبعض الأعداد الطبيعية r .

$$\begin{aligned} 5^k + 3 &= 4r \\ 5^k &= 4r - 3 \\ 5^{k+1} &= 20r - 15 \\ 5^{k+1} + 3 &= 20r - 12 \\ 5^{k+1} + 3 &= 4(5r - 3) \end{aligned}$$

بما أن r عدد طبيعي، فإن $5r - 3$ عدد طبيعي. إذاً، $5^{k+1} + 3$ قابلة للنسبة على 4. وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. ولذلك، $5^n + 3$ قابلة للنسبة على 4 لجميع الأعداد الطبيعية n .

18. الخطوة 1: $9^1 - 1 = 8$. القابلة للنسبة على 8. تكون العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $9^k - 1$ قابلة للنسبة على 8 بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k . هذا يعني أن $9^k - 1 = 8r$ لبعض الأعداد الكلية r .

$$\begin{aligned} 9^k - 1 &= 8r \\ 9^k &= 8r + 1 \\ 9^{k+1} &= 72r + 9 \\ 9^{k+1} - 1 &= 72r + 8 \\ 9^{k+1} - 1 &= 8(9r + 1) \end{aligned}$$

بما أن r عدد كلي، فإن $9r + 1$ عدد كلي. إذاً، $9^{k+1} - 1$ قابلة للنسبة على 8. وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. ولذلك، $9^n - 1$ قابلة للنسبة على 8 لجميع الأعداد الطبيعية n .

19. الخطوة 1: $12^1 + 10 = 22$. القابلة للنسبة على 11. والعبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $12^k + 10$ قابلة للنسبة على 11 لبعض الأعداد الطبيعية k . وهذا يعني أن $12^k + 10 = 11r$ لبعض الأعداد الطبيعية r .

$$\begin{aligned} 12^k + 10 &= 11r \\ 12^k &= 11r - 10 \\ 12^{k+1} &= 132r - 120 \\ 12^{k+1} + 10 &= 132r - 110 \\ 12^{k+1} + 10 &= 11(12r - 10) \end{aligned}$$

بما أن r عدد طبيعي، فإن $12r - 10$ عدد طبيعي. وبالتالي، $12^{k+1} + 10$ قابلة للنسبة على 11. إذاً، العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. وبذلك، $12^n + 10$ قابلة للنسبة على 11 بالنسبة لكل الأعداد الطبيعية n .

20. الخطوة 1: $13^1 + 11 = 24$. القابلة للنسبة على 12. والعبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $13^k + 11$ قابلة للنسبة على 12 لبعض الأعداد الطبيعية k . وهذا يعني أن $13^k + 11 = 12r$ لبعض الأعداد الطبيعية r .

$$\begin{aligned} 13^k + 11 &= 12r \\ 13^k &= 12r - 11 \\ 13^{k+1} &= 156r - 143 \\ 13^{k+1} + 11 &= 156r - 132 \\ 13^{k+1} + 11 &= 12(13r - 11) \end{aligned}$$

بما أن r عدداً طبيعياً، فإن $13r - 11$ عدد طبيعي. وبالتالي، $13^{k+1} + 11$ قابلة للنسبة على 12. إذاً، العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. وبذلك، $13^n + 11$ قابلة للنسبة على 12 بالنسبة لكل الأعداد الطبيعية n .

الخطوة 3: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)}$

$$\begin{aligned} &= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k(k+2) + 1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k^2 + 2k + 1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{(k+1)(k+1)}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k+1}{k+2} \end{aligned}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$. وبالتالي، تكون المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً، $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ بالنسبة لجميع الأعداد الطبيعية n .

15. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$. فإن الطرف الأيسر للمعادلة المعطاة يساوي 1^2 أو 1. والطرف الأيمن يساوي $\frac{1}{3} [2(1) - 1] [2(1) + 1]$ أو 1.

الخطوة 2: افترض أن $(2k - 1)^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + 1^2$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

$$\begin{aligned} &= \frac{k(2k-1)(2k+1)}{3} \\ &= \frac{k(2k-1)(2k+1) + [2(k+1) - 1]^2}{3} \\ &= \frac{k(2k-1)(2k+1) + 3(2k+1)^2}{3} \\ &= \frac{(2k+1)[k(2k-1) + 3(2k+1)]}{3} \\ &= \frac{(2k+1)(2k^2 - k + 6k + 3)}{3} \\ &= \frac{(2k+1)(2k^2 + 5k + 3)}{3} \\ &= \frac{(2k+1)(k+1)(2k+3)}{3} \\ &= \frac{(k+1)[2(k+1) - 1][2(k+1) + 1]}{3} \end{aligned}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$. إذاً، المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. ومن ثم، $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n - 1)^2 = \frac{n(2n - 1)(2n + 1)}{3}$ بالنسبة لجميع الأعداد الطبيعية n .

16. الخطوة 1: إذا كان $n = 3$. $180(3 - 2) = 180$. وعندما يكون للمضلع 3 جوانب أو 3 رؤوس. فمجموع زواياه يساوي 180 درجة. وتكون العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 3$.

الخطوة 2: افترض أن العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n \geq 3$.
الخطوة 3: تأمل مضلعاً محدباً رؤوسه هي $n + 1$. وبما أن $n + 1 \geq 4$. فإذا أخذنا أحد الرؤوس X يكون هناك رأس آخر Y حيث يوجد رأس واحد بين X و Y في أحد الاتجاهات، و $n - 2$ في الاتجاه الآخر. صل X و Y بحافة جديدة. لتقسم المضلع الأصلي إلى مضلعين. تشكل الزوايا الداخلية للمضلعين الجديدين مغا مجموع الزوايا الداخلية للمضلع الأصلي. أحد المضلعات عبارة عن مثلث والآخر عبارة عن مضلع رؤوسه n (الكل باستثناء الرأس المعزول بين X و Y). مجموع زوايا المثلث الداخلية 180° . وباستخدام فرضية الاستقراء يكون مجموع الزوايا الداخلية للمضلع الآخر $180^\circ \cdot (n - 2)$ درجة. جمع كل ذلك، نحصل على $180^\circ \cdot (n - 2) + 180^\circ$. وهكذا تم إثبات النظرية.





التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$ وبالتالي تكون المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً $500 + 100 + 20 + \dots + 4 + 1 = 5^{k+1} - 1$.
 الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $\frac{1}{6}$ والطرف الأيمن يساوي $\frac{1}{4(1+1)(1+2)}$.
 الخطوة 2: افترض أن $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4(k+1)(k+2)}$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .
 الخطوة 3:

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{k(k+1)(k+2)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{1}{4(k+1)(k+2)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{k(k+3)(k+3) + 4}{4(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{k^3 + 6k^2 + 9k + 4}{4(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{(k+1)(k^2 + 5k + 4)}{4(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{(k+1)(k+4)}{4(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{(k+1)(k+1+3)}{4(k+1)(k+1+2)}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$ وبالتالي تكون المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4(n+1)(n+2)}$ بالنسبة لكل الأعداد الطبيعية n .

33. $n(n+1)$

الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $2(1)$ أو 2 والطرف الأيمن من المعادلة يساوي $1(1+1)$ أو 2 . إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.
 الخطوة 2: افترض أن $2 + 4 + 6 + \dots + 2k = k(k+1)$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .
 الخطوة 3: $2 + 4 + 6 + \dots + 2k + 2(k+1) = k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2) = (k+1)(k+1+1)$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$ وبالتالي تكون المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. إذاً $2 + 4 + 6 + \dots + n^2 = n(n+1)$ لكل الأعداد الطبيعية n .

36. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي 1^3 أو 1 والطرف الأيمن يساوي $\frac{1}{2} \left(\frac{1+1}{2} \right)^2$ أو 1 . إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.
 الخطوة 2: افترض أن $1 + 8 + 27 + \dots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2} \right)^2$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

26. الخطوة 1: $7^1 + 5 = 12$. القابلة للقسمة على 6. العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.
 الخطوة 2: افترض أن $7^k + 5$ قابلة للقسمة على 6 لبعض الأعداد الطبيعية k . وهذا يعني أن $7^k + 5 = 6r$ لبعض الأعداد الكلية r .
 الخطوة 3:

$$7^k + 5 = 6r$$

$$7^k = 6r - 5$$

$$7^{k+1} = 7(6r - 5)$$

$$7^{k+1} + 5 = 42r - 35$$

$$7^{k+1} + 5 = 42r - 30$$

$$7^{k+1} + 5 = 6(7r - 5)$$

بما أن r عدد طبيعي. فإن $7r - 5$ عدد طبيعي. إذاً $7^{k+1} + 5$ قابلة للقسمة على 6 وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$ وبذلك $7^n + 5$ قابلة للقسمة على 6 لكل الأعداد الطبيعية n .

27. الخطوة 1: $18^1 - 1 = 17$. القابلة للقسمة على 17. والعبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.
 الخطوة 2: افترض أن $18^k - 1$ قابلة للقسمة على 17 بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k . وهذا يعني أن $18^k - 1 = 17r$ لبعض الأعداد الطبيعية r .
 الخطوة 3:

$$18^k = 17r + 1$$

$$18^{k+1} = 18(17r + 1)$$

$$18^{k+1} = 306r + 18$$

$$18^{k+1} - 1 = 306r + 17$$

$$18^{k+1} - 1 = 17(18r + 1)$$

بما أن r عدد طبيعي. فإن $18r + 1$ عدد طبيعي. إذاً $18^{k+1} - 1$ قابلة للقسمة على 17 وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$ وبذلك $18^n - 1$ قابلة للقسمة على 17 لكل الأعداد الطبيعية n .

30. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $4 \cdot 5^1 - 1$ أو 19 والطرف الأيمن يساوي $625 \left(1 - \frac{1}{5} \right)$ أو 500 . إذاً المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.
 الخطوة 2: افترض أن $500 + 100 + 20 + \dots + 4 + 1 = 625 \left(1 - \frac{1}{5^k} \right)$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .
 الخطوة 3:

$$500 + 100 + 20 + \dots + 4 \cdot 5^k - k + 4 = 625 \left(1 - \frac{1}{5^k} \right) + 4 \cdot 5^{-(k+1)}$$

$$= 625 \left(\frac{5^k - 1}{5^k} \right) + 4 \cdot 5^{-k-1}$$

$$= 625 \left(\frac{5^k + 1 - 5}{5^k + 1} \right) + \frac{4 \cdot 5^4}{5^{k+1}}$$

$$= \frac{5^4(5^k + 1 - 5) + 4 \cdot 5^4}{5^{k+1}}$$

$$= \frac{5^4(5^k + 1 - 5 + 4)}{5^{k+1}}$$

$$= 625 \left(\frac{5^k + 1 - 1}{5^k + 1} \right)$$

$$= 625 \left(1 - \frac{1}{5^k + 1} \right)$$





بما أن r عدد كلي، فإن $7r + 1$ عدد كلي. إذا، $7^k + 1 - 1$ قابلة للقسمة على 6. وبالتالي العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. ولذلك، $7^n - 1$ قابلة للقسمة على 6 لجميع الأعداد الصحيحة الموجبة n .

65. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن $5^1 - 1 = 5 - 1 = 4$ أو $5^1 - 1 = 4$ ، بما أن ناتج قسمة 4 على 4 يساوي 1. فإن العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$. الخطوة 2: افترض أن $5^k - 1$ قابلة للقسمة على 4 بالنسبة لبعض الأعداد الصحيحة الموجبة k . وهذا يعني أن $5^k - 1 = 4r$ حيث r عدد كلي. وبالتالي، $5^k - 1 = 4r$

$$\begin{aligned} 5^k - 1 &= 4r \\ 5^k &= 4r + 1 \\ 5^{k+1} &= 20r + 5 \\ 5^{k+1} - 1 &= 20r + 5 - 1 \\ 5^{k+1} - 1 &= 20r + 4 \\ 5^{k+1} - 1 &= 4(5r + 1) \end{aligned}$$

بما أن r عدد كلي، فإن $5r + 1$ عدد كلي، وبالتالي، $5^{k+1} - 1$ قابلة للقسمة على 4. إذا العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. ولذلك، $5^n - 1$ قابلة للقسمة على 4 لجميع الأعداد الصحيحة الموجبة n .

تمرين على الاختبار

20. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي 1. ويساوي الطرف الأيمن 1 أيضًا. إذا المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $6^k - 1 = \frac{1}{5}(6^k - 1) + 6^k - 1$ بالنسبة لبعض الأعداد الصحيحة الموجبة k .

الخطوة 3: وضح أن المعادلة المعطاة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$

$$\begin{aligned} 1 + 6 + 36 + \dots + 6^{k-1} + 6^k + 1 - 1 &= \frac{1}{5}(6^k - 1) + 6^k + 1 - 1 \\ &= \frac{1}{5}(6^k - 1) + 6^k \\ &= \frac{1}{5} \cdot 6^k - \frac{1}{5} + 6^k \\ &= \frac{6}{5} \cdot 6^k - \frac{1}{5} \\ &= \frac{1}{5} \cdot 6^k + 1 - \frac{1}{5} \\ &= \frac{1}{5} \cdot (6^k + 1 - 1) \end{aligned}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$ ، إذا، $6^n - 1 = \frac{1}{5}(6^n - 1) + 6^n - 1$ بالنسبة لجميع الأعداد الصحيحة الموجبة n .

21. الخطوة 1: $11^1 - 1 = 10$. والقابلة للقسمة على 10. والعبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $11^k - 1$ قابلة للقسمة على 10 بالنسبة لبعض الأعداد الصحيحة الموجبة k . وهذا يعني أن $11^k - 1 = 10r$

الخطوة 3: $11^k - 1 = 10r$

$$\begin{aligned} 11^k &= 10r + 1 \\ 11(11^k) &= 11(10r + 1) \\ 11^{k+1} &= 110r + 11 \\ 11^{k+1} - 1 &= 110r + 11 - 1 \\ 11^{k+1} - 1 &= 110r + 10 \\ 11^{k+1} - 1 &= 10(11r + 1) \end{aligned}$$

بما أن r عدد كلي، فإن $11r + 1$ عدد كلي، وبالتالي، $11^{k+1} - 1$ قابلة للقسمة على 10. إذا العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = k + 1$. ولذلك، $11^n - 1$ قابلة للقسمة على 10 بالنسبة لجميع الأعداد الصحيحة الموجبة n .

607H

الخطوة 3: $1 + 8 + \dots + k^3 + (k + 1)^3 = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1)^3$

$$\begin{aligned} &= \frac{k^2(k-1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k-1)^2}{4} + \frac{4(k-1)^3}{4} \\ &= \frac{k^2(k-1)^2 + 4(k-1)^3}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2+4k+4)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$ ، وبالتالي، تكون المعادلة صحيحة بالنسبة

إلى $n = k + 1$. إذا، $1 + 8 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ بالنسبة لجميع الأعداد الطبيعية n .

38. الإجابة النموذجية: $6 + 10 + 14 + \dots$ تنتج المتتالية عن

$a_n = 4n + 2$. ومجموع المتتالية ممثل في $n(n + 2)$.

الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة يساوي $2 + 4(1) = 6$. والطرف الأيمن يساوي $2(1)(1 + 2) = 6$. إذا المعادلة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $2k(k + 2) = 2k(k + 2) + 4k + 2$ بالنسبة لبعض الأعداد الطبيعية k .

الخطوة 3: $2 + 4(k + 1) + 2 = 2k(k + 2) + 4k + 2$

$$\begin{aligned} &= 2k(k + 2) + 4k + 2 \\ &= 2k^2 + 4k + 4k + 2 \\ &= 2k^2 + 8k + 2 \\ &= 2(k + 1)(k + 3) \\ &= 2(k + 1)(k + 1 + 2) \end{aligned}$$

التعبير الأخير هو الطرف الأيمن من المعادلة التي يجب إثباتها. حيث $n = k + 1$ ، وبالتالي، تكون المعادلة صحيحة بالنسبة

إلى $n = k + 1$. إذا، $6 + 10 + 14 + \dots + 2n(n + 2)$ بالنسبة لكل الأعداد الطبيعية n .

44. $n^2 - n = n(n - 1)$: السطر 1: $1(1 - 1) = 0$ أو $1 - 1 = 0$

السطر 2: $2(2 - 1) = 2(1) = 2$ أو $2 - 2 = 0$

السطر 3: $3(3 - 1) = 3(2) = 6$ أو $3 - 3 = 0$

السطر 4: $4(4 - 1) = 4(3) = 12$ أو $4 - 4 = 0$

السطر 5: $5(5 - 1) = 5(4) = 20$ أو $5 - 5 = 0$

دليل الدراسة والمراجعة

64. الخطوة 1: إذا كان $n = 1$ ، فإن $7^1 - 1 = 7 - 1 = 6$ أو $7^1 - 1 = 6$.

بما أن ناتج قسمة 6 على 6 يساوي 1. فإن العبارة صحيحة بالنسبة إلى $n = 1$.

الخطوة 2: افترض أن $7^k - 1$ قابلة للقسمة على 6 لبعض الأعداد الصحيحة الموجبة k . وهذا يعني أن $7^k - 1 = 6r$ لبعض الأعداد الكلية r .

الخطوة 3:

$$\begin{aligned} 7^k - 1 &= 6r \\ 7^k &= 6r + 1 \\ 7^{k+1} &= 42r + 7 \\ 7^{k+1} - 1 &= 42r + 7 - 1 \\ 7^{k+1} - 1 &= 42r + 6 \\ 7^{k+1} - 1 &= 6(7r + 1) \end{aligned}$$

Copyright © 2011 by McGraw-Hill Education. All rights reserved.

