

## **المادة : الإحصاء (باللغة الإنجليزية)**

التاريخ : ٢٠١٧/٨/٢٢

زمن الإجابة : ساعة ونصف

عدد صفحات الورقة (٢٨) صفحة  
بخلاف الغلاف (٤) صفحات  
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة  
والتأكد من ذلك قبل تسليم الورقة

نموذج

**ب**

**مجموع الدرجات**

**٢٥**

الدرجة	الأستاذة ..... إلى ..... من	توقيع المراجع	المقدار

**رقم المراقبة**

مجموع الدرجات بالحروف :

إمضاءات المراجعين :

عدد صفحات الورقة (٢٨) صفحة  
بخلاف الغلاف (٤) صفحات  
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة  
والتأكد من ذلك قبل تسليم الورقة

وزارة التربية والتعليم والتربية الفنية  
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة  
للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦ - الدور الثاني  
**المادة : الإحصاء (باللغة الإنجليزية)**  
التاريخ : ٢٠١٧/٨/٢٢  
زمن الإجابة : ساعة ونصف

**رقم المراقبة**

اسم الطالب (رابعياً) /

المدرسة :

رقم الجلوس :

توقيع الملاحظين بصحة البيانات :  
ومطابقة عدد صفحات كراسة الإجابة  
عند استلامها من الطالب .

الادارة : .....  
المحافظة : .....  
.....  
.....

- ١

- ٢

1

If the regression line equation  $Y$  on  $X$  is:

$\hat{Y} - X = 9$ , then the correlation between the values of  $X$  and the value of  $Y$  is .....

- (a) nihilistic
- (b) Perfect direct
- (c) direct
- (d) inverse

إذا كانت معادلة خط انحدار ص على س هي  $\hat{Y} - X = 9$  فإن الارتباط بين قيم  $X$  ، قيم  $Y$  يكون .....

(أ) منعدماً (ب) طردياً تماماً

(ج) عكسيّاً (د) طردياً

2

2

If the mean for a random variable equals 4 and the coefficient of variation of it equals 79%, then its standard deviation = .....

- a 10
- b 100
- c 31.6
- d 3.16

إذا كان المتوسط الحسابي لمتغير عشوائي، يساوي ٤ وكان معامل الاختلاف له يساوي ٧٩% فإن الانحراف المعياري له = .....

- أ ١٠
- ب ١٠٠
- ج ٣١٦
- د ٣١,٦

3 If  $S$  is the sample space for a random experiment where

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ,  $A = \{1, 2, 4, 8\}$  and  
 $B = \{2, 5, 6, 7\}$ , then  $A$  and  $B$  are .....events.

- (a) mutually exclusive      (b) simple
- (c) independent                (d) dependent

إذا كان  $F$  هو فضاء العينة لتجربة عشوائية حيث

$F = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ,

$A = \{1, 2, 4, 8\}$ ,  $B = \{2, 5, 6, 7\}$  فإن  $A$  و  $B$  حدثان.....

- (أ) متنافيان      (ب) بسيطان
- (ج) مستقلان      (د) غير مستقلين

**4 Answer only two items from the items of this question :**

A 40- student classroom has 20 study French,  
15 study German and 5 study both languages.

A student is randomly chosen, Calculate the  
probability the student chosen studies:

(a) German if He (She) is already studying French.

(b) French if He (She) is already studying German.

(c) One language at least.

أجب في السؤال الآتي عن فقرتين فقط:  
فصل دراسي به ٤٠ طالباً، فإذا كان ٢٠ طالباً  
منهم يدرسون اللغة الفرنسية، ١٥ طالباً منهم  
يدرسون اللغة الألمانية ، ٥ طلاب منهم  
يدرسون اللغتين معًا، فإذا اختير طالب  
عشوائياً من هذا الفصل. احسب احتمال أن  
يكون الطالب المختار من يدرسون:

أ- اللغة الألمانية إذا كان دارساً للغة الفرنسية.

ب- اللغة الفرنسية إذا كان دارساً للغة الألمانية.

ج- إحدى اللغتين على الأقل.



5

If A and B are two independent events of a sample space S for a random experiment where :

$$P(A|B) = 0.6, P(B) = 0.3, \text{then}$$

$$P(A \cap B) = \dots \dots \dots$$

(a)

0.9

(c)

0.18

(b)

0.3

(d)

0.2

إذا كان A, B حدثين مستقلين من فضاء عينة تجريبية عشوائية،

وكان  $P(A|B) = 0.6, P(B) = 0.3$ , فإن  $P(A \cap B) = \dots \dots \dots$

(b)

0.9

(d)

0.2

(a)

0.18

(c)

0.3

إذا كان  $F = \{A, B, C\}$   
حيث  $A, B, C$  أحداث متنافية  
وكان  $P(A \cup B) = 0.6$   
فإن  $P(C) = \dots$

6 If  $S = \{A, B, C\}$  where  $A, B$  and  $C$  are mutually exclusive events and  $P(A \cup B) = 0.6$ , then  $P(C) = \dots$

- (a) 0.2  
(c) 0.4

- (b) 0.3  
(d) 0.6

- (A) 0.2  
(D) 0.6

.....

7

**Answer only one item from the items of this question:**

$$\text{If } \sum x = 48, \sum y = 45, \sum xy = 320,$$

$$\sum x^2 = 359, \sum y^2 = 303 \text{ and } n = 10$$

**Find :**

(a) Pearson's linear correlation coefficient between  $X$  and  $y$  and determine its type.

(b) The regression line equation of  $y$  on  $X$ .

أجب في السؤال الآتي عن فقرة واحدة فقط:

إذا كان  $\sum S = 48$  ،  $\sum C = 45$  ،

$\sum S^2 = 320$  ،  $\sum C^2 = 303$  ،  $n = 10$  ،

$\sum SC = 359$  ،  $\sum S^2 = 303$  ،  $n = 10$  =

**فأوجد :**

نسبة أولًا : معامل الارتباط الخطى بين المتغيرين ، س ، ص وحدد نوعه .

ثانيًا : معادلة خط انحدار ص على س .



**8** If  $X$  is a discrete random variable whose range is

$$\{0,1,2,3,4\}, P(X = 0) = \frac{1}{16}, P(X = 4) = \frac{1}{16},$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{4} \text{ and } P(X = 3) = \frac{1}{4},$$

Calculate :

First :  $P(X = 2)$

Second : The expectation and the standard deviation of the random variable  $X$

إذا كان سـه متغيراً عشوائياً متقطعاً مـاه { } وكان

$$\text{نـل (سـ = ٠) = } \frac{1}{16}, \text{ ل(سـ = ٤) = } \frac{1}{16}$$

$$\text{نـل (سـ = ١) = } \frac{1}{4}, \text{ ل(سـ = ٣) = } \frac{1}{4}$$

نـخـأـجـدـ: أـولـاـ: ل(سـ = ٢) ثـانـيـاـ: الـوـسـطـ الـحـاسـبـيـ وـالـانـحرـافـ

الـمـعـارـيـ لـلـمـتـغـيرـ سـهـ.



9

If  $X$  is a normal variable whose mean = 32 and its variance = 16 .

Find :

First :  $P(x < 25)$

Second :  $P(28 < x < 35)$

إذا كان سـ متغيراً عشوائياً طبيعياً

متوسطة مـ = ٣٢ وتبانـه = ١٦

فأوجـدـ أولاًـ لـ (سـ < ٢٥ـ )

ثانيـاًـ لـ (٢٨ـ < سـ < ٣٥ـ )



**10**

If  $Z$  is a standard normal variable,  
 $P(Z \geq k) = 0.156$ , then  $k = \dots\dots\dots$

- (a) 1.37  
 (c) 2.13

- (b) 0.97  
 (d) 1.2

إذا كان  $Z$  متغيراً عشوائياً طبيعياً  
 معيارياً وكان :  $P(Z \leq k) = 0.156$   
 فإن  $k = \dots\dots\dots$

- (أ) 1.37  
 (د) 2.13



**11**

If the marks of the students in an exam follow a normal distribution whose mean is 50 and its standard deviation is 2. If the standard normal value for the mark of a student equals 2 then his mark in this exam equals .....

(a) 102

(c) 46

(b) 98

(d) 54

إذا كانت درجات الطلاب في أحد الامتحانات موزعة توزيعاً طبيعياً = بمتوسط = ٥٠ وانحراف معياري = ٢ فإذا كانت الدرجة المعيارية لأحد الطلاب تساوي ٢ فإن درجته التي حصل عليها في هذا الامتحان تساوي .....

٩٨

٥٤

(b) ١٠٢

(d) ٤٦

(١)

(ج)

12

If  $x$  is a continuous random variable, its probability density function is :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{24}(x+k) & \text{when } 1 \leq x \leq 5 \\ \text{zero} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Find :

First : The value of  $k$

Second :  $P(2 \leq x \leq 4)$

إذا كان  $x$  متغيراً عشوائياً متصلأ دالة كثافة الاختلال له هي:

$$d(s) = \begin{cases} \frac{1}{24}(s+k) & s \geq 1 \\ 0 & \text{صفر} \end{cases}$$

فيما عدا ذلك

أوجد: أولاً: قيمة  $k$

$$\text{ثانياً: } P(2 \leq s \leq 4)$$



13

The next table shows the grades of six Students in Physics and Mathematics.

الجدول التالي يبين تقديرات ستة طلاب في مادتي الفيزياء والرياضيات :

Physics (x) تقديرات الفيزياء	Pass مقبول	good جيد	Very good جيد جداً	excellent ممتاز	good جيد	weak ضعيف
Mathematics(y) تقديرات الرياضيات	pass مقبول	Very good جيد جداً	excellent ممتاز	Very good جيد جداً	weak ضعيف	Pass مقبول

Calculate spearman's rank correlation coefficient between the grades of Physics and Mathematics and show its type

احسب معامل ارتباط الرتب لسييرمان بين تقديرات مادتي الفيزياء والرياضيات مبيناً نوعه.

**Table of areas under the standard normal distribution curve**

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2160	0.2224
0.6	0.2259	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3815	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998
<b>Z</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>

